

ایران توشه

- رانلور نمونه سوالات امتحانی

- رانلور گام به گام

- رانلور آزمون گام به گام و قلم چی و سنجش

- رانلور فیلم و مقاله آنلیزشی

- رانلور و مشاوره



IranTooshe.ir




@irantooshe



IranTooshe





۱۰۶- اگر تعداد الکترون‌های یون A^{3+} ، نصف تعداد نوترون‌های یون B^{-} باشد و تعداد نوترون‌های عنصر A برابر ۴۸ باشد، اختلاف تعداد الکترون‌های B^{-} و تعداد پروتون‌های عنصر A کدام است؟

- ۱۶ (۱) ۱۷ (۲) ۱۴ (۳) ۱۰ (۴)

۱۰۷- با توجه به بخشی از جدول دوره‌ای که به صورت زیر نمایش داده شده است، کدام گزینه نادرست است؟ (نماد عنصر فرضی است).


												X		A							
														B							

- (۱) عنصر X با عنصر Ge خواص شیمیایی مشابه دارد.
- (۲) در خانه مربوط به عنصر D، سه اتم با عدد جرمی و خواص فیزیکی وابسته به جرم متفاوت، می‌توانند قرار بگیرد.
- (۳) عنصر As با عنصر X، هم‌گروه و با عنصر Y، هم‌دوره است.
- (۴) در بین ۸ عنصر فراوان سازنده زمین و مشتری، تنها دو عنصر B و A مشترک هستند.

۱۰۸- درباره همه ایزوتوپ‌های طبیعی و ساختگی هیدروژن، کدام گزینه نادرست می‌باشد؟

- (۱) جرم یک نمونه طبیعی هیدروژن، همواره ثابت نیست.
- (۲) هر ایزوتوپ ساختگی، رادیوایزوتوپ است، ولی هر رادیوایزوتوپی ساختگی نیست.
- (۳) اگر در یون X^{2+} ، تفاوت شمار نوترون‌ها و الکترون‌ها برابر ۵ باشد، عنصر X در گروه دوم جدول دوره‌ای قرار دارد.
- (۴) در میان گازهای نجیب هلیوم، نئون و آرگون، با افزایش عدد اتمی، درصد فراوانی آن‌ها در سیاره مشتری کاهش می‌یابد.

پایداری



۱۰۹- کدام گزینه در ارتباط با ایزوتوپ‌های هیدروژن نادرست است؟

- (۱) نمودار روبه‌رو، به درستی میزان پایداری رادیوایزوتوپ‌های هیدروژن را با هم مقایسه می‌کند:
- (۲) در میان ایزوتوپ‌های هیدروژن، تنها یک رادیوایزوتوپ طبیعی وجود دارد.
- (۳) در یک نمونه طبیعی از هیدروژن، سنگین‌ترین ایزوتوپ، جرمی برابر فراوان‌ترین ایزوتوپ طبیعی لیتیم دارد.
- (۴) در ایزوتوپ پایدار و نوترون‌دار هیدروژن، نسبت شمار پروتون‌ها به نوترون‌ها برابر ۱ است.

۱۱۰- ۱۸۰ گرم از یک رادیوایزوتوپ فرضی در اختیار داریم که پس از گذشت ۸۰ ساعت، جرم آن به $5/625$ گرم می‌رسد. در این فاصله زمانی چند مرتبه جرم این ایزوتوپ نصف شده است و نیم‌عمر آن چند ساعت است؟ (به ترتیب از راست به چپ)

- ۲۰ - ۴ (۱) ۸ - ۱۰ (۲) ۱۶ - ۵ (۳) ۱۰ - ۸ (۴)

۱۰۱- ۲ نوع آب که هر کدام از ۲ نوع اتم هیدروژن با نیم‌عمر متفاوت ساخته شده‌اند، در اختیار داریم. این ۲ نوع آب در چند خاصیت زیر با یکدیگر تفاوت دارند؟

- جرم مولی
 - چگالی
 - مجموع نوترون‌ها
 - مجموع پروتون‌ها
 - واکنش‌پذیری
- ۱ (۱)
۲ (۲)
۳ (۳)
۴ (۴)

۱۰۲- دربارهٔ سیارهٔ مشتری و زمین، چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست است؟


- الف) چگالی سیارهٔ مشتری همانند دمای سطح آن، نسبت به زمین بیشتر است.
 - ب) درصد فراوانی عنصر اکسیژن در مشتری نسبت به زمین بیشتر است.
 - پ) اغلب عناصر تشکیل دهندهٔ مشتری، سنگین‌تر از زمین هستند.
 - ت) در بین عناصر سازندهٔ زمین، برخلاف مشتری عنصر نافلزی یافت نمی‌شود.
- ۱ (۱)
۲ (۲)
۳ (۳)
۴ (۴)

۱۰۳- کدام عبارت‌های زیر نادرست‌اند؟

الف) شناسنامه ارسالی وویجر (۱) و (۲) حاوی اطلاعاتی مانند نوع عنصرهای سازنده، ترکیب شیمیایی و ترکیب درصد این مواد در اتمسفر برخی سیاره‌ها است.

ب) تلاش علوم تجربی برای پاسخ به پرسش «پدیده‌های طبیعی چرا و چگونه رخ می‌دهند؟» دانش ما دربارهٔ جهان مادی را افزایش داده است.

پ) در شکل زیر که نشانگر روند تشکیل عناصر است، به جای A و B به ترتیب می‌توان دومین و سومین عنصر فراوان سیاره مشتری را قرار داد.



ت) در میان ایزوتوپ‌های فراوان‌ترین عنصر سازنده سیاره مشتری، پایداری ایزوتوبی که اختلاف شمار نوترون و پروتون برابر با ۳ دارد که از سایر ایزوتوپ‌های پرتوزای آن بیش‌تر است.

- ۱) الف و ب
۲) پ و ت
۳) ب و پ
۴) فقط ت

۱۰۴- چنانچه در یون $^{2+}X^{59}$ تفاوت تعداد نوترون‌ها و الکترون‌ها برابر با ۷ باشد، عنصر X در کدام گروه و دورهٔ جدول قرار دارد؟

- ۱) گروه ۹ دوره ۵
۲) گروه ۹ دوره ۴
۳) گروه ۵ دوره ۴
۴) گروه ۵ دوره ۵


۱۰۵- عنصر فرضی X که در دوره چهارم و گروه هفتم جدول دوره‌ای جای دارد را در نظر بگیرید. آنگاه چه تعداد از خانه‌های جدول زیر در ارتباط با $^{2+}X^{55}$ به نادرستی آمده است؟

ویژگی	شمار ذرات درون هسته	شمار ذرات باردار	اختلاف شمار ذرات باردار و بدون بار	A+2Z
	۵۹	۵۰	۲۰	۱۱۳

- ۱ (۱)
۲ (۲)
۳ (۳)
۴ (۴)

۹۶- چند مورد دربارهٔ عنصر تکنسیم نادرست است؟

- (الف) برای تصویربرداری غده تیروئید از تکنسیم استفاده می‌شود، زیرا یون یدید با یونی که حاوی تکنسیم است، اندازه مشابهی دارد.
 (ب) همه تکنسیم موجود در جهان باید به‌طور مصنوعی و با استفاده از واکنش‌های شیمیایی ساخته شود و نیم‌عمر آن نیز کم است و نمی‌توان مقادیر زیادی از این عنصر تهیه کرد.
 (پ) نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌ها در رادیوایزوتوپی از تکنسیم که در تصویربرداری غده تیروئید استفاده می‌شود، کمتر از ۱/۵ است.
 (ت) خانهٔ این عنصر در جدول تناوبی به صورت روبه‌رو می‌باشد.



- ۱ (۱)
 ۲ (۲)
 ۳ (۳)
 ۴ (۴)

۹۷- در ${}^{96}\text{M}^{3+}$ تعداد نوترون‌ها، ۴۰ درصد از تعداد پروتون‌ها بیشتر است. تفاوت شمار نوترون‌ها و الکترون‌ها در M^{+96} چند است؟

- ۱۶ (۱) ۱۷ (۲) ۱۸ (۳) ۱۹ (۴)

۹۸- کدام موارد از مطالب زیر درست است؟

- (الف) شیمی‌دان‌ها منیزیم را عنصر می‌دانند، زیرا از یک نوع اتم تشکیل شده است.
 (ب) اورانیم، شناخته‌شده‌ترین فلز پرتوزا است.
 (پ) در هر ایزوتوپ ناپایدار، شمار نوترون‌ها حداقل ۵۰٪ بیشتر از پروتون‌هاست.

(ت) دفع پسماندهای راکتورهای اتمی با وجود اینکه دیگر خاصیت پرتوزایی ندارند، اما همچنان چالش‌برانگیز است.

- ۱) الف و ب ۲) ب و پ ۳) ب و ت ۴) الف و ت

۹۹- چند مورد از جملات زیر درست است؟

(الف) عنصر منیزیم در طبیعت دارای ۳ ایزوتوپ با عددهای جرمی ۲۴، ۲۵ و ۲۶ می‌باشد.

(ب) اغلب هسته‌هایی که نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌های آن‌ها، برابر یا بیش‌تر از ۱/۵ است، ناپایدارند و با گذشت زمان متلاشی می‌شوند.

(پ) در یک نمونه طبیعی همواره ایزوتوپی با تعداد نوترون‌های بیش‌تر، ناپایدارتر است و درصد فراوانی کمتری دارد.

(ت) همواره در یک نمونه طبیعی از عنصری معین، اتم‌های سازنده جرم یکسانی ندارند.

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۱۰۰- چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

(الف) عنصر ${}^{99}\text{Tc}$ برخلاف ${}^{235}\text{U}$ پرتوزا می‌باشد.

(ب) شمار عنصرهای شناخته شده، حدود ۴/۵ برابر عنصرهای ساختگی است.

(پ) غنی‌سازی ایزوتوپی، فرایندی است که طی آن، نیم‌عمر یکی از ایزوتوپ‌های پرتوزای عنصر مورد نظر، افزایش می‌یابد.

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) صفر



۲۵ دقیقه

کیهان زادگاه نقبای هستی
صفحه‌های ۱ تا ۱۳

شیمی (۱) - موازی

سؤالات ویژه دانش‌آموزانی که از برنامه آزمون‌ها عقب‌تر هستند.

۹۱- چه تعداد از عبارتهای زیر درست است؟

(الف) با گذشت زمان و کاهش دما، گازهای هیدروژن و هلیوم، متراکم شده و سحابی را تشکیل دادند.

(ب) مرگ ستاره‌ها اغلب با از بین رفتن عناصر تشکیل دهنده آن‌ها همراه است.

(پ) انرژی گرمایی و نور خیره‌کننده خورشید به دلیل انجام واکنش‌های شیمیایی در دماهای بالاست.

(ت) قدمت عنصر کرین بیشتر از آهن است.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۹۲- اگر عنصر X از گروه ۱۵ با عنصر Y که عدد اتمی آن برابر ۳۱ است، هم‌دوره باشد، عدد اتمی عنصر X کدام است؟

۱ (۱) ۳۲ ۲ (۲) ۳۳ ۳ (۳) ۳۴ ۴ (۴) ۳۵

۹۳- کاربرد چه تعداد از گونه‌های زیر نادرست بیان شده است؟

(الف) ${}^1_1\text{H}$: درمان مشکلات تیروئیدی

(ب) گلوکز نشان‌دار: تشخیص توده‌های سرطانی

(پ) ${}^{235}\text{U}$: تولید انرژی الکتریکی(ت) ${}^{99}_{43}\text{Tc}$: تصویربرداری پزشکی

۱ (۱) ۴ ۲ (۲) ۳ ۳ (۳) ۲ ۴ (۴) ۱

۹۴- در جدول دورهای عناصر، ... گروه و ... دوره وجود دارد که عناصر گروه ... تمایل چندانی به انجام واکنش شیمیایی ندارند. (به ترتیب از

راست به چپ)

۱ (۱) ۱۷ - ۱۸ - ۷ ۲ (۲) ۱۸ - ۷ - ۱۸ ۳ (۳) ۱۷ - ۷ - ۱۸ ۴ (۴) ۱۷ - ۷ - ۱۸

۹۵- چه تعداد از عبارتهای زیر نادرست است؟

(الف) در پدیده مه‌بانگ انرژی عظیمی آزاد شده و ذره‌های زیراتمی مانند الکترون، پروتون و نوترون ایجاد شدند.

(ب) وویجر ۱ و ۲ مأموریت تهیه شناسنامه فیزیکی و شیمیایی سیاره‌های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون را با گذر از کنار آن‌ها داشتند.

(پ) با بررسی عناصر تشکیل دهنده دو سیاره زمین و مشتری و فراوانی آن‌ها، می‌توان گفت عنصرهای مختلف به صورت همگون در جهان

هستی پراکنده شده‌اند.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) صفر

۸۷- با توجه به بخشی از جدول دوره‌ای که به صورت زیر نمایش داده شده است، کدام گزینه نادرست است؟ (نماد عناصر فرضی هستند.)

(۱) جرم اتمی ایزوتوپی از عنصر X با شمار نوترون‌ها و پروتون‌های برابر دقیقاً برابر $17amu$ است.

(۲) در خانه مربوط به عنصر D، سه اتم با عدد جرمی و خواص فیزیکی وابسته به جرم متفاوت، می‌توانند قرار بگیرد.

(۳) عنصر $33As$ با عنصر X، هم‌گروه و با عنصر Y، هم‌دوره است.

(۴) در بین ۸ عنصر فراوان سازنده زمین و مشتری، تنها دو عنصر B و A مشترک هستند.

۸۸- کدام گزینه نادرست است؟ ($H=1, O=16, N=14, Mg=24, Ca=40, S=32 : g.mol^{-1}$)

(۱) مجموع جرم مولی گازهای نیتروژن و هیدروژن، کمتر از جرم مولی گاز اکسیژن است.


(۲) تعداد اتم‌ها در $4/8g$ منیزیم، ۴ برابر تعداد اتم‌ها در $2g$ کلسیم است.

(۳) اگر تعداد اتم‌ها در $2/8g$ فلز M برابر $3/01 \times 10^{23}$ باشد، جرم مولی عنصر M برابر $56g$ است.

(۴) در $10/2g$ گاز H_2S ، $1/2$ گرم هیدروژن وجود دارد.

۸۹- کدام گزینه در ارتباط با ایزوتوپ‌های هیدروژن نادرست است؟

(۱) نمودار زیر، به درستی میزان پایداری رادیوایزوتوپ‌های هیدروژن را با هم مقایسه می‌کند:



(۲) در میان ایزوتوپ‌های هیدروژن، تنها یک رادیوایزوتوپ طبیعی وجود دارد.

(۳) در یک نمونه طبیعی از هیدروژن، سنگین‌ترین ایزوتوپ، جرمی برابر فراوان‌ترین ایزوتوپ طبیعی لیتیم دارد.

(۴) در ایزوتوپ پایدار و نوترون‌دار هیدروژن، نسبت شمار پروتون‌ها به نوترون‌ها برابر با ۱ است.

۹۰- 180 گرم از یک رادیوایزوتوپ فرضی در اختیار داریم که پس از گذشت 80 ساعت، جرم آن به $5/625$ گرم می‌رسد. در این فاصله زمانی چند

مرتب‌ه جرم این ایزوتوپ نصف شده است و نیم‌عمر آن چند ساعت است؟ (به ترتیب از راست به چپ)

۱۰ - ۸ (۴)

۱۶ - ۵ (۳)

۸ - ۱۰ (۲)

۲۰ - ۴ (۱)



شیمی (۱) عادی

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس شیمی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید: از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟ عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

۲۵ دقیقه

کیهان زادگاه الشبای هستی
صفحه‌های ۱ تا ۱۹

۷۱- چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

(الف) با گذشت زمان و کاهش دما، گازهای هیدروژن و هلیم، متراکم شده و سحابی را تشکیل دادند.

(ب) مرگ ستاره‌ها اغلب با از بین رفتن عناصر تشکیل دهنده آن‌ها همراه است.

(پ) انرژی گرمایی و نور خیره‌کننده خورشید به دلیل انجام واکنش‌های شیمیایی در دماهای بالاست.

(ت) قدمت عنصر کربن بیشتر از آهن است.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۷۲- اگر عنصر X از گروه ۱۵ با عنصر Y که عدد اتمی آن برابر ۳۱ است، هم‌دوره باشد، عدد اتمی عنصر X کدام است؟

۱ (۱) ۲۲ (۲) ۳۳ (۳) ۳۴ (۴) ۳۵ (۴)

۷۳- کاربرد چه تعداد از گونه‌های زیر نادرست بیان شده است؟

(الف) ${}^3_1\text{H}$: درمان مشکلات تیروئیدی

(ب) گلوکز نشان‌دار: تشخیص توده‌های سرطانی

(پ) ${}^{235}\text{U}$: تولید انرژی الکتریکی

(ت) ${}^{99}_{43}\text{Te}$: تصویربرداری پزشکی

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۷۴- مخلوطی شامل جرم‌های برابری از اتم‌های ${}^80\text{Br}$ ، ${}^{16}\text{O}$ و ${}^{20}\text{Ne}$ است. چند درصد اتم‌های این مخلوط را ${}^{20}\text{Ne}$ تشکیل می‌دهد؟ (جرم

اتمی و عدد جرمی را تقریباً یکسان در نظر بگیرید)

۱۰ (۱) ۴۰ (۲) ۵۰ (۳) ۸۰ (۴)

۷۵- کدام گزینه درست می‌باشد؟

(۱) همواره در یک اتم، A بزرگتر از Z است.

(۲) یکای جرم اتمی (amu) برابر $\frac{1}{12}$ جرم اتمی میانگین عنصر کربن است.

(۳) عنصر X با عنصر Z، هم‌گروه و با عنصر Y، هم‌دوره است.

(۴) جرم اتمی ${}^1_1\text{H}$ اندکی از ۱ amu کمتر است.

۳۰ دقیقه
فیزیک و اندازه‌گیری
صفحه‌های ۱ تا ۲۲

فیزیک (۱)

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس فیزیک (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

۵۱- مایعی به چگالی $\frac{1}{2} \frac{g}{cm^3}$ و حجم $10^3 cm^3$ را با مایع دیگری به چگالی $1800 \frac{kg}{m^3}$ و جرم $27 kg$ به‌طور کامل مخلوط می‌کنیم. با فرض اینکه در اثر

اختلاط کاهش حجمی صورت نگیرد، چگالی مخلوط چند $\frac{kg}{m^3}$ است؟

(۲) $1/65 \times 10^3$

(۱) $1/2 \times 10^3$

(۴) $1/56 \times 10^3$

(۳) $1/8 \times 10^3$

۵۲- اندازه نیروی گرانشی بین دو جرم از رابطه $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ به‌دست می‌آید. اگر در این رابطه جرم‌ها برحسب کیلوگرم، فاصله برحسب متر و نیرو برحسب

نیوتون باشد، یکای اندازه‌گیری ثابت جهانی گرانش G در SI کدام گزینه است؟

(۲) $\frac{kg}{m^2 \cdot s^2}$

(۱) $\frac{m^2 \cdot s^2}{kg}$

(۴) $\frac{m^2}{kg \cdot s^2}$

(۳) $\frac{m^2}{kg \cdot s}$

۵۳- حاصل عبارت مقابل برحسب pF (پیکوفاراد) در کدام گزینه درست بیان شده است؟

$500nF + 20\mu F = ?$

(۲) $2/05 \times 10^7$

(۱) $20/5 \times 10^5$

(۴) $3/05 \times 10^9$

(۳) 205×10^8

۵۴- در سال نهم با کمیت گشتاور نیرو آشنا شده‌اید. یکای اندازه‌گیری این کمیت برحسب یکاهای اصلی، کدام گزینه است؟


(۲) $\frac{kg \cdot m^2}{s}$

(۱) $\frac{kg \cdot m}{s^2}$

(۴) $\frac{kg}{s^2 \cdot m^2}$

(۳) $\frac{kg \cdot m^2}{s^2}$

۵۵- مطابق شکل زیر، جسمی روی سطح شیب‌داری توسط نیروی \vec{F} رو به بالا کشیده شده و در حرکت است. کدام یک از فرضیات زیر برای مدل‌سازی این حرکت



الزاماً نادرست است؟

(۱) تغییر نیروی وزن در این حرکت ناچیز است.

(۲) مقاومت هوا ناچیز است.

(۳) زاویه θ کوچک و قابل صرف‌نظر کردن است.

(۴) می‌توان جسم را به‌صورت یک ذره در نظر گرفت.

۲۶- اگر مجموعه‌های A ، B و C به ترتیب متناهی، نامتناهی و نامتناهی باشند، کدام گزینه حتماً درست است؟

(۱) متناهی: $((A \cap B) \cap C)'$

(۲) $((A' \cup B) \cup C)'$ متناهی

(۳) متناهی: $(A \cup B)'$

(۴) نامتناهی: $((B \cup C) \cap A)'$

۲۷- مجموعه $(A - B)' \cap (A \cup B) \cap A'$ همواره برابر کدام است؟

(۱) $B - A$

(۲) B

(۳) A'

(۴) \emptyset

۲۸- اگر $n(A) = 5$ و $n(A \cup B) = n(A \cap B) + 1$ باشد، آنگاه $n(A \cup B)$ کدام است؟

(۱) ۵

(۲) ۶

(۳) ۵ یا ۶

(۴) ۷

۲۹- در صورتی که در مجموعه مرجع U که دارای ۳۰ عضو است، مجموعه‌های A و B به ترتیب ۱۷ و ۱۸ عضو داشته باشند، اختلاف کمترین و

بیشترین مقدار ممکن برای تعداد اعضای اشتراک دو مجموعه کدام است؟

(۱) ۵

(۲) ۱۲

(۳) ۷

(۴) ۱۷

۳۰- اگر $n(A \cup B) = 15$ باشد، ۱۰ عضو جدید به A اضافه می‌کنیم که به اشتراک آن‌ها ۵ عضو اضافه می‌شود و سپس ۷ عضو جدید به B اضافه

می‌کنیم که به اشتراک آن‌ها ۴ عضو اضافه می‌شود. اجتماع دو مجموعه جدید A و B چند عضو دارد؟

(۱) ۳۲

(۲) ۳۰

(۳) ۲۳

(۴) ۲۷

ریاضی (۱) - سوالات آشنا

۳۱- اگر $(-\infty, \frac{a}{3}] \cup [2a-1, +\infty) = \mathbb{R}$ ، آنگاه حدود a کدام است؟

(۱) $a \leq \frac{2}{3}$

(۲) $a \leq 1$

(۳) $a \geq 1$

(۴) $a \geq \frac{2}{3}$

۳۲- اگر اشتراک دو مجموعه $A = \{x | x \in \mathbb{R}, 2x - 1 < b\}$ و $B = \{x | x \in \mathbb{R}, 2x + 1 > a\}$ فقط شامل سه عدد صحیح ۳، ۲ و ۴ باشد، اختلاف

حداکثر مقدار ممکن برای b با حداقل مقدار ممکن برای a کدام است؟

(۱) ۳

(۲) ۴

(۳) ۵

(۴) ۶

ریاضی (۱) - موازی

سؤال‌های ویژه دانش‌آموزانی که از برنامه آزمون‌ها عقب‌تر هستند.

۳۵ دقیقه

مجموعه، الگو و دنباله
صفحه‌های ۱ تا ۱۳

۲۱- اگر اشتراک دو بازه $(-\infty, 2a+1)$ و $(4a-2, +\infty)$ برابر با (b, c) و نقطه $x = \frac{5}{4}$ از دو سر بازه (b, c) به یک فاصله باشد، آن‌گاه حاصل

$a+b-c$ برابر است با:

۲ (۲)

۱ (۱)

صفر (۴)

-۳ (۳)

۲۲- اگر تعداد اعداد صحیح موجود در بازه $[2n-1, m-3]$ از دو برابر تعداد اعداد صحیح موجود در بازه $(m+3, -7n+1)$ یکی بیشتر باشد و ۶ عدد

صحیح در بازه $[-n, m]$ قرار گیرد، چند عدد مربع کامل در بازه $[-5n, 2m]$ قرار دارد؟ $(n, m \in \mathbb{Z})$

۱ (۲)

صفر (۱)

۳ (۴)

۲ (۳)

۲۳- کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

(۲) مجموعه اعداد اول بین ۵۰ تا ۸۰۰۰ نامتناهی است.

(۱) مجموعه کسرهای مثبت با صورت یک، متناهی است.

(۴) مجموعه اعداد حقیقی بین صفر تا ۱۰، نامتناهی است.

(۳) مجموعه قطرهای یک دایره، متناهی است.

۲۴- کدام یک از مجموعه‌های زیر متناهی است؟

$$\{n \in \mathbb{N} \mid 0/1 < \frac{n+1}{n+2} < 1\} \quad (۲)$$

$$\{n \in \mathbb{Z} \mid 2^{n+4} = 5^{n+4}\} \quad (۱)$$

$$\{n \in \mathbb{Z} \mid (-1)^n = -1\} \quad (۴)$$

$$\{n \in \mathbb{N} \mid n^2 + n > 10\} \quad (۳)$$

۲۵- اگر اعداد طبیعی کوچکتر از ۵۰، مجموعه مرجع باشد و B اعداد طبیعی کمتر از ۱۰ و $A = \{1, 12, \dots, 49\}$ باشد، متمم مجموعه

$A \cup (B - A)$ چند عضو دارد؟


(۲) یک عضو

(۱) فاقد عضو

(۴) چهار عضو

(۳) دو عضو

۴۶- دو خط موازی L و L' و خط مورب N مطابق شکل مفروض اند. نیمسازهای دو زاویه $\hat{B}AD$ و $\hat{A}BC$ در نقطه E متقاطع اند. نسبت فاصله نقطه E از



خط L به فاصله آن از خط L' برابر کدام است؟

۱ (۲)

۲ (۱)

۴ (۳) بستگی به زاویه A و B دارد.

۳ (۱)

۴۷- دو نقطه A و B و خط d داده شده اند. می خواهیم مثلث متساوی الساقینی رسم کنیم که در آن رأس مثلث روی خط d و قاعده آن پاره خط AB باشد.

با توجه به اوضاع A و B و d نسبت به هم، تعداد جواب های ممکن برای رسم مثلث کدام نمی تواند باشد؟

۱ (۲)

صفر (۱)

۴ بی شمار

۲ (۳)

۴۸- دو رأس A و B از مثلث ABC ثابت هستند. در صورتی که اندازه ارتفاع وارد بر ضلع AB را بدانیم، رأس سوم می تواند ... روی ... باشد.


۲ (۲) یک نقطه - یک خط موازی با AB

۱ (۱) دو نقطه - یک خط موازی با AB

۴ (۴) بی شمار نقطه - یک خط موازی با AB

۳ (۳) بی شمار نقطه - دو خط موازی با AB

۴۹- در مثلث قائم الزاویه ABC به اضلاع $AC = ۸$ و $AB = ۶$ نیمساز است. فاصله نقطه D تا رأس B کدام است؟




۲ (۲) $\frac{2\sqrt{7}}{6}$

۱ (۱) $\frac{6\sqrt{7}}{7}$

۴ (۴) $\frac{\sqrt{7}}{7}$

۳ (۳) $\frac{7\sqrt{6}}{6}$

۵۰- در مثلث قائم الزاویه ABC ، با اضلاع قائم به طول های ۴ و ۶، DH موازی AB است. اگر طول نیمساز AD برابر $\frac{12}{5}\sqrt{2}$ باشد مساحت مثلث CDH کدام است؟



۳ (۲) $\frac{4}{32}$

۱ (۱) $\frac{1}{64}$

۴ (۴) $\frac{2}{4}$


۳ (۳) $\frac{2}{16}$

۸۲- کدام عبارت‌های زیر نادرست‌اند؟

الف) شناسنامه ارسالی وویجر (۱) و (۲) حاوی اطلاعاتی مانند نوع عنصرهای سازنده، ترکیب شیمیایی و ترکیب درصد این مواد در اتمسفر برخی سیاره‌ها است.

ب) تلاش علوم تجربی برای پاسخ به پرسش «پدیده‌های طبیعی چرا و چگونه رخ می‌دهند؟» دانش ما درباره جهان مادی را افزایش داده است.

پ) در شکل زیر که نشانگر روند تشکیل عناصر است، به جای A و B به ترتیب می‌توان دومیومین و سومین عنصر فراوان سیاره مشتری را قرار داد.



ت) در میان ایزوتوپ‌های فراوان‌ترین عنصر سازنده سیاره مشتری، پایداری ایزوتوبی که اختلاف شمار نوترون و پروتون برابر با ۳ دارد که از سایر ایزوتوپ‌های پرتوزای آن بیش‌تر است.

- (۱) الف و ب (۲) ب و ت (۳) ب و پ (۴) فقط ت

۸۴- چنانچه در یون ${}_{27}^{A}X^{2+}$ تفاوت تعداد نوترون‌ها و الکترون‌ها، برابر با ۷ باشد، جرم یک اتم آن برحسب گرم به تقریب کدام است؟

(1amu = $1/66 \times 10^{-24}$ g)

- (۱) $1/04 \times 10^{-22}$ (۲) $9/8 \times 10^{-22}$ (۳) $3/6 \times 10^{-22}$ (۴) $5/34 \times 10^{-22}$

۸۵- عنصر فرضی X که در دوره چهارم و گروه هفتم جدول دورهای جای دارد را در نظر بگیرید. آنگاه چه تعداد از خانه‌های جدول زیر در ارتباط

یا ${}_{55}^{X^{2+}}$ به نادرستی آمده است؟

ویژگی	شمار ذرات درون هسته	شمار ذرات باردار	اختلاف شمار ذرات باردار و بدون بار	$A+2Z$
	۵۹	۵۰	۲۰	۱۱۳

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴



۸۶- با توجه به شکل فرضی روبه‌رو، عبارت‌های مربوط به مقایسه مواد A و B را کامل نمایید.

الف) جرم مولی ... بیشتر است.

ب) تعداد اتم‌های موجود در یک مول A ... تعداد اتم‌های موجود در یک مول B است.





پ) تعداد اتم‌های موجود در یک گرم B ... تعداد اتم‌های موجود در یک گرم A است.

(۱) A - برابر - کمتر از (۲) B - بیش از - بیشتر

(۳) A - بیش از - برابر (۴) B - برابر - کمتر از

۸۰- اگر عنصری دارای دو ایزوتوپ فرضی به جرم‌های 10amu و 11amu و جرم اتمی میانگین $10/94\text{amu}$ باشد، کدام یک از نمودارهای زیر

نسبت فراوانی این دو ایزوتوپ را به درستی نشان می‌دهد؟



۸۱- نوع آب که هر کدام از ۲ نوع اتم هیدروژن با نیم‌عمر متفاوت ساخته شده‌اند، در اختیار داریم. این ۲ نوع آب در چند خاصیت زیر با

یکدیگر تفاوت دارند؟

• جرم مولی • چگالی

• مجموع نوترون‌ها • مجموع پروتون‌ها • واکنش پذیری

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۸۲- دربارهٔ سیاره‌های مشتری و زمین، چند مورد از عبارتهای زیر نا درست است؟

الف) چگالی سیارهٔ مشتری همانند دمای سطح آن، نسبت به زمین بیشتر است.

ب) درصد فراوانی عنصر اکسیژن در مشتری نسبت به زمین بیشتر است.

پ) اغلب عناصر تشکیل دهندهٔ مشتری، سنگین‌تر از زمین هستند.

ت) در بین عناصر سازندهٔ زمین، برخلاف مشتری عنصر نافلزی یافت نمی‌شود.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۶۱- در رابطه فیزیکی $v = \sqrt{Ax + B^2}$ در دستگاه اندازه گیری SI، اگر نمادهای v و x به ترتیب بیانگر کمیت‌های تندی و مکان باشند، یکای کمیت $\frac{A}{B}$ کدام است؟


(۲) s^{-1}

(۱) s

(۴) m^{-1}

(۳) m

۶۲- در شکل زیر، خط‌کش‌های الف و ب نشان داده شده‌اند. دقت اندازه‌گیری خط‌کش «الف» چند برابر دقت اندازه‌گیری خط‌کش «ب» است و کدام خط‌کش، دقیق‌تر است؟ (هر اینچ را 2.54 cm در نظر بگیرید).



(۱) 0.8 الف

(۲) 0.4 الف

(۳) 0.8 ب

(۴) 0.4 ب

۶۳- استخر یز از آبی به شکل مکعب مستطیل و به ابعاد $12 \text{ m} \times 10 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ ، به دلیل وجود نشتی، در هر ثانیه 50 سانتی‌متر مکعب آب از دست می‌دهد. در چندمین شبانه‌روز پس از شروع نشتی آب، آب موجود در استخر نصف می‌شود؟

(۲) ۵۵

(۱) ۵۴

(۴) ۵۷

(۳) ۵۶

۶۴- در کدام گزینه، یکای فرعی کمیت‌های «انرژی» و «فشار» به ترتیب از راست به چپ به‌درستی آمده است؟

(۴) $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$ ، $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$

(۳) $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$ ، $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$

(۲) $\frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$ ، $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$

(۱) $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$ ، $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3}$

۶۵- کدام یک از عبارتهای زیر درست است؟

(الف) در مدل‌سازی پرتاب توپ بسکتبال، می‌توان از تغییرات نیروی گرانشی زمین صرف‌نظر کرد.

(ب) امروزه فاصله میان دو خط نازک حک شده در دو سر میله‌ای از جنس پلاتین- ایریدیوم در دمای صفر درجه سلسیوس برابر یک متر است.

(پ) در ابتدا به $\frac{1}{86400}$ میانگین روز خورشیدی، یک ثانیه گفته می‌شد.

(ت) در تاریخچه نظریه اتمی، مدل‌های توپ بیلیارد و سیاره‌ای، به ترتیب توسط دالتون و رادرفورد ارائه شده‌اند.

(ث) تغییر و اصلاح نظریه‌های فیزیکی در گذر زمان، از نقاط ضعف دانش فیزیک محسوب می‌شود.


(۲) «الف» و «ت»

(۱) «ب» و «پ»

(۴) «ت» و «ث»

(۳) «الف» و «پ»

۱۰
ریاضی



اختصاصی
۱۰ ریاضی

● دفترچه سوال

۶ آبان ۱۴۰۱

ریاضی (۱) عادی

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس ریاضی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟ عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

۳۵ دقیقه

مجموعه، الگو و دنباله
صفحه‌های ۱ تا ۲۴

۱- اگر تعداد اعداد صحیح موجود در بازه $(m-3, 2n-1]$ از دو برابر تعداد اعداد صحیح موجود در بازه $(-7n+1, m+3)$ یکی بیشتر باشد و ۶ عدد

صحیح در بازه $[-n, m]$ قرار گیرد، چند عدد مربع کامل در بازه $[-5n, 2m]$ قرار دارد؟ $(n, m \in \mathbb{Z})$

(۱) صفر (۲) ۱

(۳) ۲ (۴) ۳

۲- کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

(۱) مجموعه کسره‌های مثبت با صورت یک، متناهی است. (۲) مجموعه اعداد اول بین ۵۰ تا ۸۰۰۰ نامتناهی است.

(۳) مجموعه قطرهای یک دایره، متناهی است. (۴) مجموعه اعداد حقیقی بین صفر تا ۱۰ نامتناهی است.

۳- مجموعه $(A-B)' \cap (A \cup B) \cap A'$ همواره برابر کدام است؟ (A و B زیرمجموعه، مجموعه مرجع U هستند.)

(۱) $B-A$ (۲) B

(۳) A' (۴) \emptyset

۴- در صورتی که در مجموعه مرجع U که دارای ۳۰ عضو است، مجموعه‌های A و B به ترتیب ۱۷ و ۱۸ عضو داشته باشند، اختلاف کمترین و

بیشترین مقدار ممکن برای تعداد اعضای اشتراک دو مجموعه کدام است؟

(۱) ۵ (۲) ۱۲

(۳) ۷ (۴) ۱۷

۵- اگر $n(A \cup B) = 15$ باشد، ۱۰ عضو جدید به A اضافه می‌کنیم که به اشتراک آن‌ها ۵ عضو اضافه می‌شود و سپس ۷ عضو جدید به B اضافه

می‌کنیم که به اشتراک آن‌ها ۴ عضو اضافه می‌شود. اجتماع دو مجموعه جدید A و B چند عضو دارد؟

(۱) ۳۲ (۲) ۳۰

(۳) ۲۳ (۴) ۲۷


۶- در دنباله $a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots$ داریم $a_2 = 5$ ؛ مجموع ارقام a_{17} کدام است؟

(۱) ۱۱ (۲) ۱۹

(۳) ۱۲ (۴) ۱۷



۷- با توجه به الگوی زیر، در شکل دهم چند دایره سفید داریم؟



۱۴۵ (۲)

۱۲۵ (۱)

۱۵۵ (۴)

۱۳۵ (۳)

۸- بین دو عدد $2a - 5$ و $7a + 15$ ، چهار واسطه حسابی درج کرده‌ایم، اگر اختلاف بین بزرگترین و کوچکترین واسطه برابر 60 باشد، مقدار a کدام

است؟ (جملة اول است.)

۱۶ (۲)

۸ (۱)

-۸ (۴)

-۱۶ (۳)

۹- در یک دنباله حسابی مجموع جمله دوم و چهارم $\sqrt{32} - \sqrt{16}$ می‌باشد. مجموع پنج جمله اول کدام است؟

 $10\sqrt{2} - 10$ (۴)

 $9\sqrt{2} - 6$ (۳)

 $9\sqrt{2} - 4$ (۲)

 $10\sqrt{2} - 2$ (۱)

۱۰- 3 عدد c ، 5 و a مفروض است. اگر به عدد a ، 4 واحد اضافه و از عدد c ، 3 واحد کم کنیم، اعداد حاصل تشکیل دنباله حسابی با قدرنسبت 3

می‌دهند. حاصل $\frac{c-1}{a}$ کدام است؟

 $-\frac{7}{2}$ (۴)

 $\frac{7}{2}$ (۳)

-۵ (۲)

۵ (۱)

ریاضی (۱) - سوالات آشنا

۱۱- اگر $\mathbb{R} = (-\infty, \frac{a}{3}] \cup [2a-1, +\infty)$ ، آنگاه حدود a کدام است؟

 $a \geq \frac{2}{3}$ (۴)

 $a \geq 1$ (۳)

 $a \leq 1$ (۲)

 $a \leq \frac{2}{3}$ (۱)

۱۲- اگر $A \subseteq B$ و B نامتناهی باشد، کدام گزینه درست است؟

(۲) مجموعه $A \cap B$ همواره متناهی است.

(۱) مجموعه $B - A$ همواره نامتناهی است.

(۴) مجموعه $A - B$ همواره نامتناهی است.

(۳) مجموعه $A \cup B$ همواره نامتناهی است.

۱۳- اگر $U = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$ را به عنوان مجموعه مرجع در نظر بگیریم و $A \subseteq U$ ، آنگاه A را کدام مجموعه زیر در نظر بگیریم تا مجموعه

A' تعداد اعضای بیشتری داشته باشد؟

- (۱) اعداد فرد (۲) مقسوم‌علیه‌های عدد ۳ (۳) اعداد اول (۴) اعداد مربع کامل

۱۴- اگر $A = \{a \mid -a \in \mathbb{N}\}$ ، $B = \{-b \mid -b \in \mathbb{W}\}$ باشد و مجموعه \mathbb{Z} را مجموعه مرجع فرض کنیم، مجموعه $A' \cap B'$ کدام است؟

- (۱) \mathbb{W} (۲) $\mathbb{Z} - \mathbb{N}$ (۳) $\{0\}$ (۴) \emptyset

۱۵- در یک کلاس ۳۰ نفری، اگر ۹ نفر در برنامه‌های پژوهشی و ۴ نفر هم در هر دو نوع برنامه‌ی پژوهشی و پرورشی شرکت کرده باشند و ۷ نفر در

هیچ کدام از برنامه‌ها شرکت نکرده باشند، چند نفر فقط در برنامه‌های پرورشی شرکت کرده‌اند؟

- (۱) ۱۴ (۲) ۱۳ (۳) ۱۰ (۴) ۱۵

۱۶- در الگوی خطی $t_n = (2+a)n^2 + an - b$ که جمله چهارم آن برابر با ۸ است، چند جمله نامنفی وجود دارد؟

- (۱) ۷ (۲) ۸ (۳) ۶ (۴) ۱۰

۱۷- در الگوی شکل زیر، تعداد دایره‌ها در شکل دهم، چه تعداد بیشتر از تعداد دایره‌ها در شکل نهم است؟



(۱) (۲) (۳)

(۱) ۱۰۰

(۲) ۵۱۲

(۳) ۱۰۰۰

(۴) ۱۰۲۴

۱۸- فرض کنید جمله‌ی صدم دنباله بازگشتی $a_{n+1} = \frac{1}{a_n} + 1$ با شرط $a_1 = 1$ ، برابر $\frac{k}{m}$ باشد. جمله نود و هشتم دنباله، کدام است؟

- (۱) $\frac{k-m}{2m-k}$ (۲) $\frac{k-2m}{k-m}$ (۳) $\frac{k-m}{k-2m}$ (۴) $\frac{2m-k}{k-m}$

۱۹- در دنباله حسابی a_n ، اگر $a_{k+8} = 0$ و $a_k = -16$ باشد، حاصل $a_7 + a_{13}$ بر حسب k کدام است؟

- (۱) $4k+8$ (۲) $-2k+4$ (۳) $-4k+8$ (۴) $2k+4$

۲۰- در دنباله‌های حسابی « $2, 9, 16, 23, \dots$ » و « $12, 17, 22, 27, \dots$ » چند عدد سه رقمی مشترک کوچکتر از ۳۰۰ موجود است؟

- (۱) ۵ (۲) ۶ (۳) ۷ (۴) ۸



۲۲- کدام مجموعه زیر نامتناهی نیست؟

- (۱) مجموعه خطوط مماس بر یک دایره
- (۲) مجموعه اعداد گویای بین دو عدد گویا
- (۳) بازه $(۰, ۴)$
- (۴) مجموعه اعداد حقیقی مثبت که با معکوس خود برابرند.

۲۴- اگر $A = [\frac{2m-1}{3}, +\infty)$ و $B = (-\infty, \frac{2-m}{6}]$ باشند، به ازای کدام محدوده برای m ، مجموعه $A \cap B$ متناهی است؟

- (۱) $m \geq 0/۸$
- (۲) $m \geq 0/۴$
- (۳) $-0/۸ \leq m \leq 0/۶$
- (۴) $m \leq 0/۸$

۲۵- اگر $A \subseteq B$ و B نامتناهی باشد، کدام گزینه درست است؟

- (۱) مجموعه $B - A$ همواره نامتناهی است.
- (۲) مجموعه $A \cap B$ همواره متناهی است.
- (۳) مجموعه $A \cup B$ همواره نامتناهی است.
- (۴) مجموعه $A - B$ همواره نامتناهی است.

۲۶- اگر $U = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$ را به عنوان مجموعه مرجع در نظر بگیریم و $A \subseteq U$ ، آنگاه A را کدام مجموعه زیر در نظر بگیریم تا مجموعه

A' تعداد اعضای بیشتری داشته باشد؟

- (۱) اعداد فرد
- (۲) مقسوم‌علیه‌های عدد ۳
- (۳) اعداد اول
- (۴) اعداد مربع کامل

۲۷- اگر $A = \{a | -a \in N\}$ ، $B = \{b | -b \in W\}$ باشد و مجموعه Z را مجموعه مرجع فرض کنیم، مجموعه $A' \cap B'$ کدام است؟

- (۱) W
- (۲) $Z - N$
- (۳) $\{0\}$
- (۴) \emptyset

۲۸- اگر متمم مجموعه $(A - B) \cup (B - A)$ برابر $A \cap B$ باشد، کدام عبارت درست است؟ (S مجموعه مرجع است.)

- (۱) $A \subseteq B$
- (۲) $A \subseteq B'$
- (۳) $A \cup B = S$
- (۴) $A = \emptyset$ یا $B = \emptyset$

۲۹- در یک کلاس ۳۰ نفری، اگر ۹ نفر در برنامه‌های پژوهشی و ۴ نفر هم در هر دو نوع برنامه‌ی پژوهشی و پرورشی شرکت کرده باشند و ۷ نفر در

هیچ کدام از برنامه‌ها شرکت نکرده باشند، چند نفر فقط در برنامه‌های پرورشی شرکت کرده‌اند؟

- (۱) ۱۴
- (۲) ۱۳
- (۳) ۱۰
- (۴) ۱۵

۴۰- مجموعه A دارای ۳۶ عضو و مجموعه B دارای ۲۸ عضو است. اشتراک آنها ۱۵ عضو دارد. اگر ۱۶ عضو از مجموعه A حذف شود، از اشتراک

آنها ۹ عضو حذف می‌شود، تعداد عضوهای اجتماع مجموعه‌ی جدید A با مجموعه B ، کدام است؟

- (۱) ۴۰
- (۲) ۴۱
- (۳) ۴۲
- (۴) ۴۵

هندسه (۱)

هدف گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سؤال

لطفاً قبل از شروع پاسخ گویی به سؤال های درس هندسه (۱)، هدف گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید: از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می توانید پاسخ صحیح بدهید؟ عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

چند از ۱۰ آزمون قبل	هدف گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

۱۵ دقیقه

ترسیم های هندسی و استدلال

صفحه های ۹ تا ۲۰

۴۱- کدام گزینه درست است؟

(۱) استدلال براساس مجموعه ای از مشاهدات استدلال استنتاجی است.

(۲) استدلال استقرایی از کل به جز رسیدن است.

(۳) با استدلال استقرایی نمی توان به درستی نتیجه گرفته شده مطمئن بود.

(۴) استدلال استنتاجی براساس واقعیت هایی است که درستی آن ها را نپذیرفته ایم.

۴۲- چه تعداد از استدلال های زیر استدلال استنتاجی نیستند؟

(الف) با توجه به اینکه توان دوم اعداد مثبت و منفی عددی مثبت می شود استدلال کنیم:

«توان زوج هر عدد حقیقی، عددی مثبت است.»

(ب) با توجه به اینکه در تمام چهارضلعی های مربع، مستطیل، لوزی و متوازی الاضلاع زاویه های مجاور مکمل یکدیگرند استدلال کنیم:

«مجموع زوایای داخلی هر چهارضلعی 360° است.»

(پ) با توجه به اینکه هر نقطه روی عمودمنصف یک پاره خط از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است استدلال کنیم:

«سه عمودمنصف اضلاع هر مثلث همسایه اند.»

۱ (۲)

(۱) صفر

۳ (۴)

(۳) ۲

۴۳- در مثلث قائم الزاویه ABC ($\hat{A} = 90^\circ$)، عمودمنصف وتر، ضلع AC را در نقطه M قطع می کند. اگر $\frac{AM}{MC} = \frac{3}{5}$ و $AB = 8$ ، آن گاه مساحت مثلث

ABC کدام است؟

۵۶ (۲)

(۱) ۶۰

۶۴ (۴)

(۳) ۳۲

۴۴- اندازه زوایای مثلثی با اعداد ۴، ۵ و ۹ متناسب می باشد. محل همرسی ارتفاع های این مثلث در کجا واقع شده است؟

(۲) وسط بزرگ ترین ضلع مثلث

(۱) داخل مثلث

(۴) روی یکی از رئوس مثلث

(۳) خارج مثلث

۴۵- رئوس یک مثلث دلخواه روی یک دایره قرار دارند مرکز این دایره بر کدام نقطه مثلث منطبق است؟

(۲) محل همرسی نیمسازها

(۱) محل همرسی میانه ها


(۴) محل همرسی ارتفاع ها

(۳) محل همرسی عمودمنصف ها

۵۶- کدام دسته از کمیت‌های زیر همگی جزء کمیت‌های اصلی SI هستند؟

- (۱) جرم، جریان الکتریکی، دما
 (۲) انرژی، دما، توان
 (۳) زمان، طول، بار الکتریکی
 (۴) سرعت، زمان، حجم

۵۷- با توجه به نمودار زیر، چگالی مایع A ... از چگالی مایع B بوده و مایع ... برای خاموش کردن بنزین شعله‌ور، مناسب‌تر است.



(۱) کمتر - A


(۲) کمتر - B

(۳) بیشتر - A

(۴) بیشتر - B

۵۸- در شکل زیر، یک خط‌کش و یک ابزار اندازه‌گیری طول دیگر نشان داده شده است.

نام این ابزار اندازه‌گیری ... بوده و دقت آن ... برابر دقت خط‌کش است.



(۱) کولیس، ۰/۰۵

(۲) ریزسنج، ۰/۰۵

(۳) کولیس، ۰/۰۱

(۴) ریزسنج، ۰/۰۱

۵۹- کدام یک از جملات زیر، صحیح نیست؟

(۱) در مدل‌سازی حرکت سیاره‌ها به دور خورشید، از حرکت سیاره‌ها به دور خودشان چشم‌پوشی می‌کنیم.

(۲) در مدل‌سازی سقوط یک کاغذ صاف و تا نخورده نمی‌توان از مقاومت هوا صرف‌نظر کرد.

(۳) اگر بخواهیم حرکت اتومبیلی را که با دیدن شخصی ترمز کرده، مدل‌سازی کنیم، نباید از نیروی اصطکاک صرف‌نظر کنیم.

(۴) برای مدل‌سازی پرتاب توپ بسکتبال از تغییر وزن توپ با تغییر فاصله از زمین و نیروی جاذبه زمین چشم‌پوشی می‌کنیم.

۶۰- در مخلوطی از آب و یخ در حال تعادل، مقداری یخ ذوب می‌شود و در طی این فرآیند، حجم مخلوط 25cm^3 کاهش می‌یابد. اگر جرم یخ ذوب نشده 200g باشد، جرم قطعه یخ اولیه چگونه گرم بوده است؟

$$\left(\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \text{ و } \rho_{\text{یخ}} = 0.9 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \right)$$

۴۲۵ (۲)

۴۰۰ (۱)

۳۹۷/۵ (۴)

۴۵۰ (۳)



۷۶- چند مورد دربارهٔ عنصر تکنسیم نادرست است؟

- (الف) برای تصویربرداری غده تیروئید از تکنسیم استفاده می‌شود، زیرا یون یدید با یونی که حاوی تکنسیم است، اندازه مشابهی دارد.
- (ب) همه تکنسیم موجود در جهان باید به‌طور مصنوعی و با استفاده از واکنش‌های شیمیایی ساخته شود و نیم‌عمر آن نیز کم است و نمی‌توان مقادیر زیادی از این عنصر را تهیه کرد.
- (پ) نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌ها در رادیوایزوتوپی از تکنسیم که در تصویربرداری غده تیروئید استفاده می‌شود، کمتر از ۱/۵ است.
- (ت) خانهٔ این عنصر در جدول تناوبی به صورت روبه‌رو می‌باشد.

۴۳
Tc
تکنسیم
۹۹/۰۰


- ۱ (۱)
۲ (۲)
۳ (۳)
۴ (۴)

۷۷- در ${}^{96}\text{M}^{3+}$ تعداد نوترون‌ها، ۴۰ درصد از تعداد پروتون‌ها بیشتر است. تفاوت شمار نوترون‌ها و الکترون‌ها در ${}^{96}\text{M}^{+}$ چند است؟

- ۱۶ (۱) ۱۷ (۲) ۱۸ (۳) ۱۹ (۴)

۷۸- شکل زیر یک نمونه طبیعی از مولکول‌های X_4 را نشان می‌دهد که از ۲ ایزوتوپ ${}^{32}\text{X}$ و ${}^{34}\text{X}$ تشکیل شده است. جرم اتمی میانگین X

به تقریب کدام است؟ (${}^{32}\text{X}$: \circ ، ${}^{34}\text{X}$: \bullet) (عدد جرمی و جرم اتمی را یکسان در نظر بگیرید).



- ۳۲/۲۵ (۱)
۳۲/۷۵ (۲)
۳۲/۵۶ (۳)
۳۲/۴۵ (۴)

۷۹- چند مورد از جملات زیر درست است؟

- (الف) عنصر منیزیم در طبیعت دارای ۳ ایزوتوپ با عددهای جرمی ۲۴، ۲۵ و ۲۶ می‌باشد.
- (ب) اغلب هسته‌هایی که نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌های آن‌ها برابر یا بیش‌تر از ۱/۵ است، ناپایدارند و با گذشت زمان متلاشی می‌شوند.
- (پ) در یک نمونه طبیعی، همواره ایزوتوپی با تعداد نوترون‌های بیش‌تر، ناپایدارتر است و درصد فراوانی کمتری دارد.
- (ت) همواره در یک نمونه طبیعی از عنصری معین، اتم‌های سازنده جرم یکسانی ندارند.

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۶۶- با توجه به جدول مقابل، کمیت‌های A، B و C به ترتیب از راست به چپ کدام می‌توانند باشند؟

نردهای	برداری	فرعی	اصلی	کمیت
A		✓		✓
B			✓	✓
C	✓	✓		

(۱) مقدار ماده - جرم - وزن

(۲) تندی - سرعت - انرژی

(۳) جرم - زمان - انرژی

(۴) تندی - شدت جریان الکتریکی - شتاب جاذبه زمین

۶۷- جرم جسمی را با یک ترازوی عددی به دفعات اندازه می‌گیریم و اعداد گزارش شده برای آن بر حسب گرم به صورت زیر می‌باشد.

۱۸/۴۸، ۱۸/۶۶، ۱۸/۷۶، ۱۲/۴۴، ۱۸/۶۰، ۱۸/۵۰، ۲۰/۳۶

دقت ترازو بر حسب گرم و جرم جسم بر حسب دسی‌گرم از راست به چپ کدام است؟

(۲) ۱۸۶/۰ و ۰/۰۱

(۱) ۱۷۹/۷ و ۰/۰۱

(۴) ۱۷۹/۷ و ۰/۰۲

(۳) ۱۸/۶۵ و ۰/۰۲

۶۸- عمق اقیانوس‌ها را گاهی با یکایی به نام فاتوم می‌سنجند که هر فاتوم معادل ۶ فوت است. فاصله‌ها در سطح اقیانوس‌ها، با یکایی به نام مایل دریایی سنجیده

می‌شود که تقریباً معادل ۶۰۰۰ فوت است. مربعی به ضلع ۱ مایل دریایی بر سطح اقیانوس در نظر می‌گیریم. اگر عمق آب زیر آن ۱۰ فاتوم باشد، حجم آب زیر

این مربع، بر حسب فوت مکعب و با استفاده از نمادگذاری علمی کدام است؟

(۲) $2/16 \times 10^7$


(۱) $21/6 \times 10^8$

(۴) $0/216 \times 10^{10}$

(۳) $2/16 \times 10^9$

۶۹- در استوانه مندرج شکل زیر، جرم مایع A، $1/5$ برابر جرم مایع B است. اگر اختلاف مقدار چگالی‌های این دو مایع $\frac{2}{8} \frac{g}{cm^3}$ باشد، جرم مایع A چند گرم

است؟



(۱) ۴۸

(۲) ۸۴

(۳) ۱۰۸

(۴) ۱۲۶

۷۰- یک ظرف پر از الکل درون کفه ترازو قرار دارد و ترازو 300 گرم را نشان می‌دهد. یک پوسته کروی از جنس طلا را به‌طور کامل درون ظرف قرار می‌دهیم

به‌طوری که 40 گرم الکل از ظرف خارج شده، ولی داخل کفه ترازو قرار می‌گیرد و در این حالت عددی که ترازو نشان می‌دهد، 360 g افزایش می‌یابد. قطر

داخلی پوسته طلایی چند سانتی‌متر است؟ (چگالی الکل $0/8 \text{ g/cm}^3$ ، چگالی طلا 20 g/cm^3 است و $\pi = 3$)

(۱) ۲

(۲) ۳

(۳) ۴

(۴) باید شعاع خارجی پوسته طلایی داده شود.