

ایران توشه

آزمون

- دانلود نمونه سوالات امتحانی
- دانلود گام به گام
- دانلود آزمون های حس و سنجش
- دانلود خلاصه آنلاین
- دانلود و مثال



IranTooshe.Ir




@irantoooshe



IranTooshe











سوالات مربوط به رسم تابع درجه سوم

۱- با استفاده از نمودار تابع $y = x^3$ ، نمودار توابع زیر را رسم کرده و دامنه و برد آن ها را مشخص کنید.





$$D_f = \mathbb{R}$$

$$R_f = \mathbb{R}$$











$$D_f = \mathbb{R}$$

$$R_f = \mathbb{R}$$




$$D_f = \mathbb{R}$$

$$R_f = \mathbb{R}$$






۷) $y = (x - 1)^3 - 1$




۸) $y = (x + 2)^3 - 2$




سوالات مربوط به صعودی و نزولی بودن


۱- مشخص کنید نوع زیر در چه بازه‌هایی اکیداً صعودی و در چه بازه‌هایی اکیداً نزولی هستند؟




صعودی



اکیداً صعودی




اکیداً نزولی → [0, +∞)




اکیداً صعودی



اکیداً صعودی




اکیداً نزولی → (-∞, 0]



اکیداً نزولی → (-∞, 0]

اکیداً نزولی → [0, +∞)




اکیداً نزولی → [-π/2, 0], [0, π/2]

اکیداً صعودی → [-π/2, π/2]

ایرانی ترای موفقیت


۲- نمودار توابع زیر را رسم کنید و مشخص کنید در چه بازه‌هایی صعودی و در چه بازه‌هایی نزولی هستند؟

(الف) $f(x) = \cos(x - \frac{\pi}{3})$

در بازه‌های $[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}]$ و $[\frac{4\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}]$ صعودی و در بازه $[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}]$ نزولی




$$g(x) = x + |x| \quad (\text{ب})$$



در R صعودی، در $x \geq 0$ آکیداً صعودی، در $x \leq 0$ ثابت (در کل کتاب تابع صعودی است)


$$t(x) = -x^3 - 1 \quad (\text{ب})$$




آکیداً نزولی

۳- نمودار تابع زیر را رسم کنید و بازه‌هایی را که در آن‌ها تابع صعودی، نزولی یا ثابت است، مشخص کنید:

$$f(x) = \begin{cases} -2x - 3 & x < -4 \\ 3 & -4 \leq x < 2 \\ 3x - 2 & x \geq 2 \end{cases}$$



۴- با استفاده از نمودار تابع زیر مشخص کنید این تابع در چه بازه‌هایی صعودی، نزولی یا ثابت است؟



صعودی $x \in (-\infty, 0] \cup [4, 6]$


نزولی $x \in [2, 4] \cup [6, 8]$

ثابت $x \in [0, 2]$




۵- تابع نمایی $y = 2^x - 2$ و تابع لگاریتمی $y = -\log_2^x + 2$ را رسم کنید، یکنواختی آنها را مشخص کنید.

$y = -\log_2^x + 2$ اکیداً نزولی




$y = 2^x - 2$ اکیداً صعودی



۶- تابع $y = x^r |x|$ در بازه $[a, \infty)$ نزولی است. حداقل مقدار a چقدر است؟

$$y = \begin{cases} x^r & x \geq 0 \\ -x^r & x < 0 \end{cases}$$



صفر

۷- تابعی مثال بزنید که در دامنه خود اکیداً صعودی و تابعی مثال بزرگنماید که در دامنه خود اکیداً نزولی باشد.

$$\begin{cases} y = 3^x & \text{اکیداً صعودی} \\ y = x^3 & \text{اکیداً نزولی} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = (\frac{1}{2})^x & \text{اکیداً نزولی} \\ y = -x^3 & \text{اکیداً صعودی} \end{cases}$$

سوالات مربوط به ترکیب توابع

۱- با توجه به جدول‌های زیر، مقادیر خواسته شده را در صورت امکان بدست آورید.

x	$f(x)$
-3	-7
-2	-5
-1	-3
0	-1
1	3
2	5
3	5

x	$g(x)$
-3	8
-2	3
-1	0
0	-1
1	0
2	3
3	8

$$\text{الف) } fog(1) = f(g(1)) = f(0) = -1$$

$$\text{ب) } fog(-1) = f(g(-1)) = f(0) = -1$$

$$\text{ب) } gof(0) = g(f(0)) = g(-1) = 0$$

$$\text{ت) } gog(-2) = g(g(-2)) = g(3) = 8$$

$$\text{ث) } gof(2) = g(g(2)) = g(5) = 8 \quad \text{و همود ندارد}$$

$$\text{ج) } fof(1) = f(f(1)) = f(3) = 5$$

۲- اگر $f(x) = \sqrt{x-1}$ و $g(x) = 2x^3 - 1$ ، دامنه و ضابطه توابع fog و gof را بدست آورید.

$$D_g = \mathbb{R}, D_f = [1, +\infty)$$

$$D_{gof} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\} = \{x \in [1, +\infty) \mid \sqrt{x-1} \in \mathbb{R}\} = [1, +\infty)$$

$$gof(x) = g(f(x)) = 2f^3(x) - 1 = 2x(\sqrt{x-1})^3 - 1 = 2(x-1) - 1 = 2x - 3$$

$$D_{fog} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 2x^3 - 1 \geq 1\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x^3 \geq 1\} = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$$

$$fog(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)-1} = \sqrt{2x^3 - 1 - 1} = \sqrt{2x^3 - 2}$$



۳-۱-۳ اگر $f(x) = \frac{2}{x}$ و $g(x) = \frac{3}{x-1}$ دامنه و ضابطه توابع fog و fof را بدست آورید.

$$fog(x) = f(g(x)) = \frac{2}{\frac{3}{x-1}} = \frac{2}{\frac{3-x}{x}} = \frac{2x}{3-x}$$

$$D_f = \mathbb{R} - \{0\}, D_g = \mathbb{R} - \{1\}$$

$$D_{fog(x)} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\} = \{x \in \mathbb{R} - \{1\} \mid \frac{3}{x-1} \in \mathbb{R} - \{0\}\} = \mathbb{R} - \{0, 3\}$$

$$fof(x) = f(f(x)) = \frac{2}{\frac{2}{x-1}} = \frac{2}{\frac{2-x+1}{x-1}} = \frac{2x-2}{3-x}$$

$$D_{fof(x)} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_f\} = \{x \in \mathbb{R} - \{0\} \mid \frac{2}{x-2} \in \mathbb{R} - \{0\}\} = \mathbb{R} - \{1, 3\}$$

۴-۱-۴ اگر $g = \{(5, 7), (3, 5), (7, 9), (9, 11)\}$ و $f = \{(7, 8), (5, 3), (9, 8), (11, 4)\}$ توابع fog و gof را بدست آورید.

$$\begin{array}{c} fog \\ \downarrow \\ 5 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \\ 3 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \\ 7 \rightarrow 9 \rightarrow 8 \\ 9 \rightarrow 11 \rightarrow 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} gof \\ \downarrow \\ 7 \rightarrow 8 \rightarrow 8 \\ 5 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \\ 9 \rightarrow 8 \rightarrow 8 \\ 11 \rightarrow 4 \rightarrow 4 \end{array}$$



۵- در هر قسمت موارد خواسته شده را در صورت امکان بدست آورید.

(الف) $f(x) = x^2 - 5, g(x) = \sqrt{x+6} \quad D_{fog}, (fog)(x)$

$$D_f = \mathbb{R}, D_g = [-6, +\infty) \Rightarrow D_{fog} = [x \in D_g \mid g(x) \in D_f] \Rightarrow$$

$$D_{fog} = \{x \in [-6, +\infty) \mid \sqrt{x+6} \in \mathbb{R}\} = [-6, +\infty)$$


$$f(g(x)) = (\sqrt{x+6})^2 - 5 = x + 1$$

(ب) $f(x) = \sqrt{3-2x}, g(x) = \frac{6}{3x-5} \quad D_{fog}, fog(x)$

$$D_f = (-\infty, \frac{3}{2}], D_g = \mathbb{R} - \{\frac{5}{3}\}$$

$$D_{fog} = \{x \in \mathbb{R} - \{\frac{5}{3}\} \mid \underbrace{\frac{6}{3x-5}}_I \in (-\infty, \frac{3}{2}]\} = (-\infty, \frac{5}{3}] \cup [\frac{3}{2}, +\infty)$$

$$I \rightarrow \frac{6}{3x-5} \leq \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{6}{3x-5} - \frac{3}{2} \leq 0 \Rightarrow \frac{12-9x+15}{2(3x-5)} \leq 0 \Rightarrow \frac{-9x+27}{2(3x-5)} \leq 0.$$



$$fog(x) = f(g(x)) = \sqrt{3 - 2\left(\frac{6}{3x-5}\right)} = \sqrt{\frac{9x-27}{3x-5}}$$

پ) $f(x) = \sqrt{x+2}, g(x) = \sqrt{x^2-16} \quad D_{gof}, gof(x)$

$$D_f = [-2, +\infty), D_g = x^2 - 16 \geq 0 \rightarrow x^2 \geq 16 \rightarrow |x| \geq 4 \rightarrow D_g = (-\infty, -4] \cup [4, +\infty)$$

$$D_{gof} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\} = \{x \in [-2, +\infty) \mid \sqrt{x+2} \in (-\infty, -4] \cup [4, +\infty)\} = [14, +\infty)$$

$$I \rightarrow \begin{cases} \sqrt{x+2} \leq -4 & \text{غیر قابل قبول} \\ \sqrt{x+2} \geq 4 & \xrightarrow{\text{تواب}} x+2 \geq 16 \rightarrow x \geq 14 \end{cases} \rightarrow x \in [14, +\infty)$$

$$gof(x) = g(f(x)) = \sqrt{(\sqrt{x+2})^2 - 16} = \sqrt{x-14}$$

ت) $f(x) = \sin x, g(x) = \sqrt{x} \quad D_{gof}, gof(x)$

$$D_f = R, D_g = [0, +\infty)$$

$$D_{gof} = \{x \in R \mid \underbrace{\sin x \in [0, +\infty)}_I\} = [2k\pi, 2k\pi + \pi]$$

$$I \rightarrow \sin x \geq 0 \xrightarrow{\text{نایاب اول و دو}} x \in [2k\pi, 2k\pi + \pi]$$

$$g(f(x)) = \sqrt{\sin x}$$

۶- اگر $14 \leq x \leq 4$ و $f(x) = 3x + 4$ و $g(x) = 3x^2 - 6x + 14$ ، ضابطه $f(g(x)) = 3x^2 - 6x + 14$ را بدست آورید.

$$f(g(x)) = 3x^2 - 6x + 14$$

$$f(x) = 3x - 4$$

$$f(g(x)) = 3g(x) - 4$$

$$\Rightarrow 3g(x) - 4 = 3x^2 - 6x + 14 \rightarrow 3g(x) = 3x^2 - 6x + 18 \rightarrow g(x) = x^2 - 2x + 6$$

۷- مشخص کنید کدام یک از جملات زیر درست و کدام یک نادرست است؟

الف) $fog(5) = -25$ و $f(x) = x^2 - 4$

بايد حاصل $fog(5)$ را بدست آوريم:

$$f(g(5)) = f(\sqrt{21}) = (\sqrt{21})^2 - 4 = 17$$

$$g(5) = \sqrt{5^2 - 4} = \sqrt{21}$$

مشاهده می‌کنیم $fog(5) = 17$ می‌باشد پس قسمت الف نادرست است.

ب) برای دو تابع f و g که $f \neq g$ ، تساوی $(fog)_{(x)} = (gof)_{(x)}$ هیچ وقت برقرار نیست.

$fog(x) = gof(x)$ مشاهده می‌کنیم که $f(x) = x$ و $g(x) = -x$ درست، اگر $f(x) = -x$ و $g(x) = x$ نادرست است.

$$f(g(x)) = (-x) = -x, g(f(x)) = -(x) = -x$$

پ) اگر $5 = f(7)$ و $g(4) = 5$ آنگاه $f(4) = 7$ و $g(5) = 5$ درست است

$$f(g(4)) \xrightarrow{g(4)=5} f(5) = 5$$



-۸- تابع $h(x) = (3x^3 - 4x + 1)^{\Delta}$ ترکیب کدام تابع زیر است؟

(الف) $f(x) = \sqrt[3]{x}, g(x) = 3x^3 - 4x + 1$

$$f(g(x)) = \sqrt[3]{3x^3 - 4x + 1} \neq h(x)$$

$$g(f(x)) = 3(\sqrt[3]{x})^3 - 4(\sqrt[3]{x}) + 1 \neq h(x)$$

(ب) $f(x) = x^{\Delta}, g(x) = 3x^3 - 4x + 1$

$$f(g(x)) = (3x^3 - 4x + 1)^{\Delta} = h(x)$$


$$g(f(x)) = 3(x^{\Delta})^3 - 4x^{\Delta} + 1 \neq h(x)$$

-۹- هر یک از توابع زیر را به ورت ترکیب دو تابع بنویسید.

(الف) $h(x) = \sqrt[3]{x^2 + 1} \Rightarrow \begin{cases} f(x) = \sqrt[3]{x} \\ g(x) = x^2 + 1 \end{cases} \rightarrow f(g(x)) = \sqrt[3]{x^2 + 1}$

(ب) $L(x) = \sqrt{x^2 + 5} \Rightarrow \begin{cases} f(x) = \sqrt{x} \\ g(x) = x^2 + 5 \end{cases} \rightarrow f(g(x)) = \sqrt{x^2 + 5}$

-۱۰- با توجه به نمودارهای توابع f و g ، مقادیر زیر را در صورت وجود بیاید.



(الف) $f \circ g(-1) = f(g(-1)) = f(-3) = 1$

(ب) $g \circ f(0) = g(f(0)) = g(2) = -4$

(پ) $f \circ g(1) = f(g(1)) = f(-5) = 3$

(ت) $g \circ f(-1) = g(f(-1)) = g(1) = -5$

-۱۱- با توجه به ضابطه‌های توابع f و g ، معادلات مورد نظر را تشکیل داده و آنها را حل کنید.

(الف) $f(x) = 2x - 5, g(x) = x^3 - 3x + 8, f \circ g(x) = 7$

$$f(g(x)) = 2(x^3 - 3x + 8) - 5 = 2x^3 - 6x + 16 - 5 = 7 \rightarrow 2x^3 - 6x + 4 = 0$$

$$\frac{a+b+c=0}{\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = \frac{c}{a} = 2 \end{cases}}$$

(ب) $f(x) = 3x^3 + x - 1, g(x) = 1 - 2x, g \circ f(x) = -5$

$$g(f(x)) = 1 - 2(3x^3 + x - 1) = -5 \rightarrow -6x^3 - 2x + 3 = 0$$

$$\frac{a+b+c=0}{\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = \frac{c}{a} = -\frac{4}{3} \end{cases}}$$


برای عضویت در کانال یازدهمی‌ها و دوازدهمی‌ها
روی لینک کلیک کنید
[Telegram.me/Yazdahomiy](https://t.me/Yazdahomiy)




سوالات مربوط به تبدیل توابع

۱- نمودار تابع $f(x) = |x - 2|$ را در بازه $[-2, 3]$ رسم کنید و به کمک آن نمودار تابع $g(x) = -|x - 2|$ و $k(x) = -\frac{1}{3}|2 - x|$ را رسم کنید.


$$f(x) = |x - 2|$$




$$g(x) = -|x - 2|$$



$$h(x) = \frac{1}{3}|x - 2|$$





$$k(x) = -\frac{1}{3}|2 - x|$$




۲- نمودار تابع $y = |x^2 - 1|$ را رسم کنید.


می‌دانیم اگر کل عبارت داخل قدر مطلق باشد، ابتدا نمودار را بدون در نظر گرفتن قدر مطلق رسم می‌کنیم و سپس قسمت پایین محور x را به بالا منتقل می‌شود



۳- نمودار توابع $y = \sqrt{-x}$ و $y = -\sqrt{-x}$ را به کمک نمودار $y = \sqrt{x}$ و $y = -\sqrt{x}$ را رسم کنید.




۴- نمودار تابع f با دامنه $[-4, 4]$ به صورت زیر رسم شده است. نمودار تابع $y = f\left(\frac{1}{2}x\right)$ را رسم کنید.




برای تعیین دامنه $y = f\left(\frac{1}{2}x\right)$ به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$-4 \leq \frac{1}{2}x \leq 4 \Rightarrow -8 \leq x \leq 8$$

x	-8	-4	0	4	8
$f\left(\frac{1}{2}x\right)$	•	4	•	-2	•



۵- با استفاده از نمودار تابع f ، نمودار های خواسته شده را رسم کنید:



$$y = \frac{1}{2}f(2x) - 1$$

$$y = f(2x)$$

$$y = \frac{1}{2}f(2x)$$

$$y = \frac{1}{2}f(2x) - 1$$

$$y = -f(-x) + 2$$



$$y = f(-x)$$

$$y = -f(-x)$$

$$y = -f(-x) + 2$$


$$y = 2f(x-1) - 3$$

$$y = f(x-1)$$







$$y = 2f\left(\frac{1}{2}x\right)$$




۶- توابع ۱- تابع $y = \sin x$ در بازه $[-\pi, \pi]$ رسم کنید.



الف) $y = -\sin 2x - 1$



ب) $y = 2\sin(-\frac{1}{3}x)$



توشه‌ای برای موفقیت

برای دانلود رایگان نمونه سوالات نوبت دوم روی اینجا بزنید




-۷ با استفاده از نمودار $y = \cos x$ توابع زیر رسم شده است. ضابطه هر نمودار را مشخص کنید.

(الف) $-\frac{1}{2} \cos(-\frac{1}{2}x)$

(ب) $y = 2 \cos 2x$

(پ) $y = \cos(\frac{1}{2}x)$

(ت) $y = -\cos 2x$



سوالات مربوط به تابع وارون

۱- ضابطه هی تابع وارون توابع زیر را در صورت وجود بدست آورید.

(الف) $f(x) = -\frac{1}{2}x + 3$

$D_f = \mathbb{R}$ $R_f = \mathbb{R}$

$$f(x) = -\frac{1}{2}x + 3 \xrightarrow{x \leftrightarrow y} x = -\frac{1}{2}y + 3 \rightarrow -\frac{1}{2}y = x - 3 \rightarrow$$

$$y = -2x + 6 \rightarrow f^{-1}(x) = -2x + 6$$

(ب) $D_{f^{-1}} = \mathbb{R}$ $R_{f^{-1}} = \mathbb{R}$

(پ) $g(x) = 1 + \sqrt{x-2}$

$D_g = [2, +\infty)$ $R(g) = [1, +\infty)$

$$g(x) = 1 + \sqrt{x-2} \xrightarrow{x \leftrightarrow y} x = 1 + \sqrt{y-2} \rightarrow \sqrt{y-2} = x-1 \rightarrow$$

$$y-2 = (x-1)^2 \rightarrow g^{-1}(x) = (x-1)^2 + 2$$

$D_{g^{-1}} = [1, +\infty)$ $R_{g^{-1}} = [2, +\infty)$

(ب) $h(x) = x^3 + 1$

$D_h = [-\infty, +\infty)$ $R_h = [-\infty, +\infty)$

$$h(x) = x^3 + 1 \xrightarrow{x \leftrightarrow y} x = y^3 + 1 \rightarrow y^3 = x - 1 \rightarrow y = \sqrt[3]{x-1} \rightarrow h^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$$

$D_{h^{-1}} = [-\infty, +\infty)$ $R_{h^{-1}} = [-\infty, +\infty)$



۲- ضابطه‌ی تابع وارون توابع یک به یک زیر را بدست آورید.

(الف) $f(x) = \frac{-8x + 3}{2}$

$$f(x) = \frac{-8x + 3}{2} \xrightarrow{x \leftrightarrow y} x = \frac{-8y + 3}{2} \rightarrow -8y = 2x - 3$$

$$\rightarrow y = \frac{-2x + 3}{8} \rightarrow f^{-1}(x) = \frac{-2x + 3}{8}$$

(ب) $g(x) = -5 - \sqrt{3x + 1}$

$$g(x) = -5 - \sqrt{3x + 1} \xrightarrow{x \leftrightarrow y} x = -5 - \sqrt{3y + 1} \rightarrow$$

$$-\sqrt{3y + 1} = x + 5 \rightarrow 3y + 1 = (x + 5)^2 \rightarrow 3y = (x + 5)^2 - 1$$

$$\rightarrow y = \frac{(x + 5)^2 - 1}{3} \rightarrow g^{-1}(x) = \frac{(x + 5)^2 - 1}{3}$$

۳- در مورد هر یک از قسمت‌های زیر نشان دهید که f و g وارون یکدیگرند.

(الف) $f(x) = \frac{-7}{2}x - 3$ ، $g(x) = -\frac{2x + 6}{7}$

$$fog(x) = f(g(x)) = -\frac{7}{2}\left(-\frac{2x + 6}{7}\right) - 3 = x + 3 - 3 = x$$

$$gof(x) = g(f(x)) = -\frac{2\left(-\frac{7}{2}x - 3\right) + 6}{7} = \frac{7x - 6 + 6}{7} = x$$

(ب) $f(x) = -\sqrt{x - 8}$ ، $g(x) = 8 + x^2 : x \leq 0$

$$fog(x) = f(g(x)) = -\sqrt{8 + x^2 - 8} = -\sqrt{x^2} = -|x| \xrightarrow{x \leq 0} -(-x) = x$$

ص $gof(x) = g(f(x)) = 8 + (-\sqrt{x - 8})^2 = 8 + x - 8 = x$

۴- رابطه‌ی بین درجه‌ی سانتی‌گراد و فارنهایت که برای اندازه‌گیری دما استفاده می‌شوند به صورت ۳۲

است که در آن x میزان درجه‌ی سانتی‌گراد و $f(x)$ میزان درجه‌ی فارنهایت است. $f^{-1}(x)$ را بدست آورده و توضیح دهید چه چیزی را نشان می‌دهد؟

$$f(x) = \frac{9}{5}x + 32 \xrightarrow{y \leftrightarrow x} x = \frac{9}{5}y + 32 \rightarrow 5x = 9y + 160 \rightarrow$$

$$9y = 5x - 160 \rightarrow y = \frac{5}{9}x - \frac{160}{9} \rightarrow f^{-1}(x) = \frac{5}{9}x - \frac{160}{9}$$

میزان تغییرات درجه نسبت به فارنهایت را نشان می‌دهد.

۵- توابع زیر یک به یک نیستند. با محدود کردن دامنه‌ی آنها توابعی یک به یک بسازید:


(الف) $f(x) = |x|$ $x \geq 0$

(ب) $g(x) = -x^2$ $x \leq 0$

(ب) $h(x) = (x + 2)^2 - 1$ $x \geq 0$



۶- از نمودار تابع f برای تکمیل جدول استفاده کنید.



۷- با محدود کردن دامنهٔ تابع $f(x) = x^3 - 4x + 5$ ، یک تابع یک به یک بدست آورده و دامنه و برد f و وارون آن را بنویسید و این دو تابع را درسم کنید.

$$f(x) = x^3 - 4x + 5 = (x-2)^3 + 1$$

$$D_f = [2, +\infty)$$


$$R_f = [1, +\infty)$$

$$y = (x-2)^3 + 1 \rightarrow y-1 = (x-2)^3 \rightarrow x-2 = \pm\sqrt[3]{y-1} \Rightarrow$$

$$x = \pm\sqrt[3]{y-1} + 2 \xrightarrow{x \geq 2} f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1} + 2$$

$$D_{f^{-1}} = [1, +\infty)$$

$$R_{f^{-1}} = [2, +\infty)$$



۸- اگر $g(x) = x^3$ و $f(x) = \frac{1}{\lambda}x - 3$ ، مقادیر زیر را بدست آورید:

(الف) $(fog)^{-1}(5)$

$$fog(x) = f(x^3) = \frac{1}{\lambda}x^3 - 3 \rightarrow y+3 = \frac{1}{\lambda}x^3 \rightarrow$$

$$x^3 = \lambda y + 24 \rightarrow x = \sqrt[3]{\lambda y + 24}$$

$$(fog)^{-1}(x) = \sqrt[3]{\lambda x + 24}$$

$$(fog)^{-1}(5) = \sqrt[3]{\lambda \times 5 + 24} = \sqrt[3]{54} = 4$$


(ب) $(f^{-1} of^{-1})(6) = f^{-1}(\underbrace{f^{-1}(6)}_{\lambda(6+3)=72}) = f^{-1}(6) = \lambda(72+3) = 600$

(پ) $(g^{-1} of^{-1})(5) = g^{-1}(\underbrace{f^{-1}(5)}_{\lambda(5+3)=64}) = g^{-1}(64) = \sqrt[3]{64} = 4$

سوالات مربوط به دوره تناوب، ماکزیمم، مینیمم و قانزانت

فصل دوم

۱- در نمودارهای زیر مقدار ماکزیمم، مینیمم و دوره تناوب را مشخص کنید:



۲- دوره تناوب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم هر یک از توابع زیر را مشخص کنید:

الف) $y = 3 \sin(2x) - 2$

$$\max = |3| - 2 = 1$$

$$\min = -|3| - 2 = -5$$

$$T = \frac{2\pi}{|b|} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

ب) $y = -\frac{1}{4} \cos(\pi x)$

$$\max = -\left| -\frac{1}{4} \right| = \frac{1}{4}$$

$$\min = -\left| -\frac{1}{4} \right| = -\frac{1}{4}$$

$$T = \frac{2\pi}{|b|} = \frac{2\pi}{\pi} = 2$$


ب) $y = \pi \sin(-x) + 1$

$$\max = |\pi| + 1 = \pi + 1$$

$$\min = -|\pi| + 1 = 1 - \pi$$

$$T = \frac{2\pi}{|b|} = \frac{2\pi}{|-1|} = 2\pi$$

۳- هر یک از نمودارهای داده شده در زیر مربوط به تابعی با ضابطه‌ای $f(x) = a \cos bx + c$ یا $f(x) = a \sin bx + c$ است. مقدار ماکزیمم و مینیمم و دوره تناوب و ضابطه‌ی تابع را مشخص کنید.




با توجه به نمودار خابطه‌ی تابع به صورت زیر است:

$$y = a \sin bx + c$$

و با توجه به مقادیر ماکزیمم و مینیمم و دوره تناوب از روی نمودار، $a = -\frac{1}{2}$ و $b = 3$ و $c = 0$ بدهست می‌آید که در آن علامت a منفی و علامت b مثبت است. بنابراین داریم:

$$y = -\frac{1}{2} \sin 3x$$

(ب)



با توجه به نمودار، خابطه‌ی تابع مورد نظر می‌تواند به صورت $y = a \cos bx + c$ باشد و ماکزیمم و مینیمم آن برابر ۵ و ۱ و طول دوره‌ی

تناوب برابر 4π است. بنابراین $a = 2$ و $b = \frac{1}{3}$ و $c = 3$. بنابراین داریم:

۴- دوره‌ی تناوب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم هر یک از توابع زیر را بدست آورید:

الف) $y = 1 + 2 \sin 7x$

$$\begin{array}{l} y = a \sin bx + c \quad T = \frac{\pi}{|b|} \\ \max = |a| + c, \min = -|a| + c \end{array} \rightarrow T = \frac{2\pi}{|7|} = \frac{2\pi}{7} \quad \max = |2| + 1 = 3 \quad \min = -|2| + 1 = -1$$

(ب) $\sqrt{3} - \cos \frac{\pi}{4} x$

$$\begin{array}{l} y = a \cos bx + c \quad T = \frac{\pi}{|b|} \\ \max = |a| + c, \min = -|a| + c \end{array} \rightarrow T = \frac{2\pi}{|\frac{\pi}{4}|} = 8 \quad \max = |-1| + \sqrt{3} = 1 + \sqrt{3} \quad \min = -|-1| + \sqrt{3} = -1 + \sqrt{3}$$

(پ) $-\pi \sin(\frac{x}{4}) - 2$

$$\begin{array}{l} y = a \sin bx + c \quad T = \frac{\pi}{|b|} \\ \max = |a| + c, \min = -|a| + c \end{array} \rightarrow T = \frac{2\pi}{|\frac{1}{4}|} = 8\pi \quad \max = |-\pi| - 2 = \pi - 2 \quad \min = -|-\pi| - 2 = -\pi - 2$$

(ت) $-\frac{3}{4} \cos 3x$

$$\begin{array}{l} y = a \cos bx + c \quad T = \frac{\pi}{|b|} \\ \max = |a| + c, \min = -|a| + c \end{array} \rightarrow T = \frac{2\pi}{|3|} = \frac{2}{3}\pi \quad \max = |-\frac{3}{4}| = \frac{3}{4} \quad \min = -|-\frac{3}{4}| = -\frac{3}{4}$$

۵- هر یک از توابع داده شده را با نمودارهای زیر نظیر کنید.


ت) $y = 1 - \cos 2x$




پ) $y = \sin 2x$

ب) $y = 2 - \cos \frac{1}{2}x$

الف) $y = \sin \pi x$

۱۱)





۶- در هر مورد ضابطه‌ی تابع مثلثاتی با دوره‌ی تناوب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم داده شده بنویسید:

(الف) $T = \pi, \max = 3, \min = -3$

$$y = a \sin bx + c, \max = |a| + c, \min = -|a| + c$$

$$a = \frac{3 - (-3)}{2} = 3 \quad c = \frac{3 + (-3)}{2} = 0 \quad \pi = \frac{2\pi}{|b|} \Rightarrow b = 2 \Rightarrow y = 3 \sin 2x$$

(ب) $T = \pi, \max = 1, \min = -1$

$$y = a \sin bx + c, \max = |a| + c, \min = -|a| + c$$

$$a = \frac{1 - (-1)}{2} = 1 \quad c = \frac{1 + (-1)}{2} = 0 \quad \pi = \frac{2\pi}{|b|} \Rightarrow b = \frac{2}{\pi} \Rightarrow y = \sin \frac{2\pi}{\pi} x + 0$$

(پ) $T = 4\pi, \max = -1, \min = -7$

$$y = a \sin bx + c, \max = |a| + c, \min = -|a| + c$$


$$a = \frac{-1 - (-7)}{2} = 3 \quad c = \frac{-1 + (-7)}{2} = -4 \quad 4\pi = \frac{2\pi}{|b|} \Rightarrow b = \frac{1}{2} \Rightarrow y = 3 \sin(\frac{1}{2}x) - 4$$

(ت) $T = \frac{\pi}{2}, \max = 1, \min = -1$

$$y = a \sin bx + c, \max = |a| + c, \min = -|a| + c$$

$$a = \frac{1 - (-1)}{2} = 1 \quad c = \frac{1 + (-1)}{2} = 0 \quad \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{|b|} \Rightarrow b = 4 \Rightarrow y = \sin(4x)$$


۷- ضابطه‌ی مربوط به هر یک از نمودارهای داده شده را بنویسید:



$$\max = 3, \min = -1, T = 4\pi$$

$$C = \frac{3+(-1)}{2} = 1, a = \frac{3-(-1)}{2} = 2, |b| = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$$

$$y = \sin\left(\frac{1}{2}x\right) + 1$$




$$\max = 2, \min = -2, T = \pi$$

$$C = \frac{2+(-2)}{2} = 0, a = \frac{2-(-2)}{2} = 2, |b| = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\pi} = 2$$

$$y = 2\cos(2x) - 1$$

۸- صعودی یا نزولی بودن تابع $y = \tan x$ را در بازه $[0, 2\pi]$ بررسی کنید.



تابع در دامنه‌ی فور همواره صعودی است.

۹- کدام یک از جملات زیر درست و کدام نادرست است؟

الف) تابع تانژانت در دامنه‌اش صعودی است. نادرست

ب) می‌توان بازه‌ای یافت که تابع تانژانت در آن نزولی باشد. نادرست


پ) می‌توان بازه‌ای یافت که تابع تانژانت در آن غیر صعودی باشد. نادرست

ت) تابع تانژانت در هر بازه که در آن تعریف شده باشد، صعودی است. درست

۱۰- با توجه به محورهای سینوس و تانژانت، در موارد زیر مقادیر $\sin \alpha$ و $\tan \alpha$ را باهم مقایسه کنید.

الف) $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$


در ربع اول هم سینوس و هم تانژانت صعودی است.





$$\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi \quad (\text{ب})$$

در ربع چهارم هم سینوس و هم تانژانت صعودی است.



سوالات مریوط به نسبت‌های مثلثاتی 2α

۱- مقدار $\sin 15^\circ, \cos 15^\circ$ را بباید.

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$$

$$\cos 30^\circ = 1 - 2\sin^2 15^\circ \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = 1 - 2\sin^2 15^\circ \rightarrow \sin^2 15^\circ = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - 1}{-2} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4} \Rightarrow \sin 15^\circ = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}$$

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cdot \cos \alpha \Rightarrow \sin 30^\circ = 2\sin 15^\circ \cdot \cos 15^\circ$$

$$\frac{1}{2} = 2 \times \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} \times \cos 15^\circ \rightarrow \cos 15^\circ = \frac{1}{2\sqrt{2 - \sqrt{3}}}$$

۲- فرض کنید $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ و α زاویه‌ای حاده باشد. حاصل عبارت زیر را بدست آورید.
الف) $\cos 2\alpha$

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

$$\cos 2\alpha = 2 \times \left(\frac{5}{13}\right)^2 - 1 = 2 \times \frac{25}{169} - 1 = \frac{50}{169} - 1 = \frac{-119}{169}$$

ب) $\sin 2\alpha$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \rightarrow \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2$$

$$\Rightarrow \sin^2 \alpha = \frac{144}{169} \quad \text{در تابع اول } \alpha \rightarrow \sin \alpha = \frac{12}{13} \Rightarrow \sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cdot \cos \alpha = 2 \times \frac{12}{13} \times \frac{5}{13} = \frac{120}{169}$$

۳- نسبت‌های مثلثاتی سینوس و کسینوس را برای زاویه $22/5^\circ$ بدست آورید.

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha \Rightarrow \cos 45^\circ = 1 - 2\sin^2(22/5^\circ) \Rightarrow \sin^2(22/5^\circ) = \frac{1 - \cos 45^\circ}{2}$$

$$\Rightarrow \sin^2(22/5^\circ) = \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4} \rightarrow \sin(22/5^\circ) = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$$

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 \rightarrow \cos 45^\circ = 2\cos^2(22/5^\circ) - 1$$

$$\rightarrow \cos^2(22/5^\circ) = \frac{1 + \cos 45^\circ}{2} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4} \rightarrow \cos(22/5^\circ) = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$$



سوالات مربوط به معادلات مثلثاتی

تیپ اول سینوس‌ها:

۱- معادله $\sin x = -\frac{1}{2}$ را حل کنید.

$$\sin x = -\frac{1}{2} \Rightarrow \sin x = \sin(-\frac{\pi}{6})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + (-\frac{\pi}{6}) = 2k\pi - \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z} \\ x = 2k\pi + (\pi + \frac{\pi}{6}) = 2k\pi + \frac{7\pi}{6}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

۲- معادلات زیر را حل کنید.

(الف) $2\sin x - \sqrt{3} = 0$

$$2\sin x - \sqrt{3} = 0 \rightarrow \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \sin x = \sin(\frac{\pi}{3})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \\ x = 2k\pi + (\pi - \frac{\pi}{3}) = 2k\pi + \frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

(ب) $4\sin x + \sqrt{2} = 0$

$$4\sin x + \sqrt{2} = 0 \rightarrow \sin x = \frac{-\sqrt{2}}{4} = \frac{-2\sqrt{2}}{4} = \frac{-\sqrt{2}}{2} \rightarrow \sin x = \sin(-\frac{\pi}{4})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + (-\frac{\pi}{4}) = 2k\pi - \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z} \\ x = 2k\pi + (\pi - (-\frac{\pi}{4})) = 2k\pi + \pi + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

۳- معادله $\sin 2x = \sin 3x$ را حل کنید.

$\sin 2x = \sin 3x$

$$\begin{cases} 2x = 2k\pi + 3x \Rightarrow x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ 2x = (2k+1)\pi - 3x \rightarrow x = \frac{(2k+1)\pi}{5}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

۴- معادله $2\sin 3x - \sqrt{2} = 0$ را حل کنید.

$$2\sin 3x - \sqrt{2} = 0 \rightarrow \sin 3x = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \sin 3x = \sin(\frac{\pi}{4})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3x = 2k\pi + \frac{\pi}{4} \rightarrow x = \frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{12}, k \in \mathbb{Z} \\ 3x = (2k+1)\pi - \frac{\pi}{4} \rightarrow x = \frac{(2k+1)\pi}{3} - \frac{\pi}{12} \end{cases}$$

۵- جواب معادله $\sin x \cdot \cos x = \frac{\sqrt{3}}{4}$ را بدست آورید.

ابتدا طرفین معادله را در عدد ۲ ضرب می‌کنیم:

$$2\sin x \cdot \cos x = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \rightarrow 2\sin x \cdot \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow \sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow \sin 2x = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x = 2k\pi + \frac{\pi}{3} \rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z} \\ 2x = (2k+1)\pi - \frac{\pi}{3} \rightarrow x = \frac{(2k+1)\pi}{2} - \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

۶- معادلات زیر را حل کنید.

(الف) $\sin \frac{\pi}{2} = \sin 3x$

$$3x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \rightarrow x = \frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}$$

(ب) $\cos 2x - \sin x + 1 = 1$

$$1 - 2\sin^2 x - \sin x = 0 \Rightarrow 2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0 \xrightarrow{\sin x = t} 2t^2 + t - 1 = 0 \xrightarrow{b=a+c} \begin{cases} t = -1 \\ t = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin x = -1 \rightarrow \sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow x = 2k\pi + \frac{-\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \\ \sin x = \frac{1}{2} \rightarrow \sin x = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + \frac{\pi}{6} \\ x = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{6} \end{cases} \end{cases}$$

(ب) $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$

$$\xrightarrow{\sin x = t} 2t^2 + t - 1 = 0 \xrightarrow{b=a+c} \begin{cases} t = -1 \\ t = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin x = -1 \rightarrow \sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \rightarrow x = 2k\pi + \frac{-\pi}{2} \\ \sin x = \frac{1}{2} \rightarrow \sin x = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + \frac{\pi}{6} \\ x = 2k\pi + \left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) \end{cases} \end{cases}$$

(ت) $\cos^2 x - \sin x = \frac{1}{4}$

$$1 - \sin^2 x - \sin x = \frac{1}{4} \rightarrow \sin^2 x + \sin x - \frac{3}{4} = 0 \xrightarrow{\sin x = t} \rightarrow$$



$$t^2 + t - \frac{3}{4} = 0 \Rightarrow \Delta = b^2 - 4ac = (1)^2 - 4(1)(-\frac{3}{4}) = 4 \Rightarrow \begin{cases} t_1 = \frac{-1+2}{2} = \frac{1}{2} \\ t_2 = \frac{-1-2}{2} = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin x = \sin \frac{\pi}{6} \Rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z} \\ x = 2k\pi + \frac{5\pi}{6}, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \\ \sin x = -\frac{3}{2} \text{ غیر ممکن} \end{cases}$$

ث) $\sin x - \cos 2x = 0$

$$\sin x - (1 - 2\sin^2 x) = 0 \rightarrow 2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0 \rightarrow (\sin x + 1)(2\sin x - 1) = 0$$

$$\begin{cases} \sin x + 1 = 0 \rightarrow \sin x = -1 \rightarrow x = 2k\pi + \frac{3\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \\ 2\sin x - 1 = 0 \rightarrow \sin x = \frac{1}{2} \rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z} \\ x = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \end{cases}$$


→ ۷- یک بازیکن هندبال توپ را با سرعت $\frac{m}{s}$ برای هم تیمی خود که در $12/8$ متری او قرار دارد پرتاب می‌کند. اگر رابطه بین سرعت توپ V (برحسب ثانیه)، مسافت طی شده افقی d (برحسب متر) و زاویه پرتاب θ به صورت زیر باشد. آنگاه زاویه پرتاب توپ چقدر بوده است؟

$$d = \frac{V^2 \sin 2\theta}{10}$$

$$12/8 = \frac{(16)^2 \sin 2\theta}{10} \rightarrow \sin 2\theta = \frac{12/8 \times 10}{256} = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} 2\theta = 2k\pi + \frac{\pi}{6} \\ 2\theta = (2k+1)\pi - \frac{\pi}{6} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \theta = k\pi + \frac{\pi}{12} \\ \theta = \frac{(2k+1)\pi}{2} - \frac{\pi}{12} \end{cases}$$

→ ۸- مثلثی با مساحت ۳ سانتی‌مترمربع مفروض است. اگر اندازه دو ضلع آن به ترتیب ۲ و ۶ سانتی‌متر باشند، آنگاه چند مثلث با این خاصیت‌ها می‌توان ساخت؟



$$S = \frac{1}{2} \times AB \times AC \times \sin \hat{A}$$

$$3 = \frac{1}{2} \times 2 \times 6 \times \sin \hat{A} \rightarrow \sin \hat{A} = \frac{1}{2} \rightarrow \sin \hat{A} = \sin \frac{\pi}{6}$$



$$\Rightarrow \begin{cases} \hat{A} = 2k\pi + \frac{\pi}{6} & k \in \mathbb{Z} \\ \hat{A} = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{6} & k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

فقط می‌توان $\hat{A} = \frac{5\pi}{6}$ و $A = \frac{\pi}{2}$ نظر گرفت پس دو مثلث می‌توان ساخت.

تیپ دوم کسینوس‌ها:

۱- معادله $\cos x(2\cos x - 1) = 0$ را حل کنید:

$$\cos x(2\cos x - 1) = 0 \rightarrow 2\cos^2 x - \cos x - 0 = 0 \xrightarrow{\cos x = t}$$

$$2t^2 - 1t - 0 = 0 \rightarrow (2t - 1)(t + 0) = 0 \rightarrow \begin{cases} t = -\frac{1}{2} \\ t = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos x = -\frac{1}{2} \rightarrow \cos x = \cos \frac{2\pi}{3} \rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \\ \cos x = 0 \rightarrow \text{غیر قابل قبول} \end{cases}$$

۲- معادله $\sin x + \cos x = 1$ را در بازه $0 \leq x \leq 2\pi$ حل کنید. (ویژه ریاضی)

$$\sin x + \cos x = 1 \rightarrow \sin x = 1 - \cos x \xrightarrow{\text{توان}} \sin^2 x = (1 - \cos x)^2$$

$$\rightarrow \sin^2 x = 1 - 2\cos x + \cos^2 x \xrightarrow{\sin^2 x = 1 - \cos^2 x} 1 - \cos^2 x = 1 - 2\cos x + \cos^2 x \rightarrow 2\cos^2 x - 2\cos x = 0$$

$$\rightarrow 2\cos x(\cos x - 1) = 0 \rightarrow \begin{cases} 2\cos x = 0 \rightarrow \cos x = 0 \rightarrow x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \\ \cos x - 1 = 0 \rightarrow \cos x = 1 \rightarrow x = 0, 2\pi \end{cases}$$

۳- معادلات زیر را حل کنید:

(الف) $\cos 2x - \cos x + 1 = 0$

$$\Rightarrow 2\cos^2 x - 1 - \cos x + 1 = 0 \Rightarrow 2\cos^2 x - \cos x = 0 \Rightarrow \cos x(2\cos x - 1) = 0$$

$$\begin{cases} \cos x = 0 \rightarrow \cos x = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \rightarrow x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos x = \frac{1}{2} \rightarrow \cos x = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

(ب) $\cos x = \cos 2x$

$$\Rightarrow x = 2k\pi \pm 2x$$

$$\begin{cases} x = 2k\pi + 2x \rightarrow x = -2k\pi \\ x = 2k\pi - 2x \rightarrow x = \frac{2k\pi}{3} \end{cases}$$



سوالات مربوط به بخش پذیری

۱- چند جمله‌ای $x+1$ بخش پذیر است؟ با انجام تقسیم درستی ادعای خود را بررسی کنید.

$$\begin{array}{r} 2x^3 + x^2 + 1 \\ \underline{- (2x^3 + 2x^2)} \\ -x^2 + 1 \\ \underline{- (x^2 - x)} \\ +x + 1 \\ \underline{- (x + 1)} \\ 0 \end{array} \Rightarrow g(x) = (x+1)(2x^2 - x + 1)$$

راه دو^م: برای بدست آوردن باقی‌مانده در یک تقسیم می‌توانیم ریشه مقسوم علیه را در مقسوم قرار دهیم.

$$x+1=0 \rightarrow x=-1$$

$$\Rightarrow g(-1) = 2(-1)^3 + (-1)^2 + 1 = 0$$

پون باقی‌مانده برابر صفر شده پس $g(x)$ بر $x+1$ بخش پذیر است.

۲- نشان دهید چند جمله‌ای $-10 - 3x - 2x^2$ بخش پذیر است؟

$$x+2=0 \rightarrow x=-2$$

$$\Rightarrow f(-2) = 2(-2)^3 + 5(-2)^2 - 3(-2) - 10 = -16 + 20 + 6 - 10 = 0$$

باقی‌مانده = ۰

پس $f(x)$ بر $x+2$ بخش پذیر است.

۳- نشان دهید چند جمله‌ای $x+1$ $f(x) = 2x^3 + x^2 + 1$ بخش پذیر است.

$$x+1=0 \rightarrow x=-1$$

$$\Rightarrow f(-1) = 2(-1)^3 + (-1)^2 + 1 = -2 + 1 + 1 = 0$$

سوالات مربوط به حد توابع کسری (حالت $\frac{0}{0}$)

۱- حد تابع $g(x) = \frac{2-\sqrt{x-1}}{x-5}$ را در نقطه به طول $x=5$ بدست آورید.

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{2-\sqrt{x-1}}{x-5} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2-\sqrt{x-1}}{x-5} \times \frac{2+\sqrt{x-1}}{2+\sqrt{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{4-(x-1)}{(x-5)(2+\sqrt{x-1})}$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\cancel{5-x}}{(x-5)(2+\sqrt{x-1})} = \frac{-1}{2+2} = -\frac{1}{4}$$

۲- حد های زیر را در صورت وجود محاسبه کنید.

(الف) $\lim_{x \rightarrow (-3)} \frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow (-3)} \frac{(x-3)(x+3)}{x(x+3)} = \lim_{x \rightarrow (-3)} \frac{x-3}{x} = \frac{-6}{-3} = +2$



$$\text{ب) } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{4x^2 - 4x + 1}{2x^2 + x - 1} = \overset{\circ}{=} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{(x - \frac{1}{2})(4x - 2)}{(x - \frac{1}{2})(2x + 2)} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{4x - 2}{2x + 2} = \overset{\circ}{=} = 0.$$

$$\text{ب) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 5x + 6}{2x^3 - 13x^2 + 24x - 9} = \overset{\circ}{=}$$

مخرج را بر عامل صفر شونده یعنی $(x - 3)$ تقسیم می‌کنیم.

$$\begin{array}{r} 2x^3 - 13x^2 + 24x - 9 \\ \underline{- (2x^3 - 6x^2)} \\ -7x^2 + 24x - 9 \\ \underline{- (-7x^2 + 21x)} \\ +3x - 9 \\ \underline{- (+3x - 9)} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{c} | x - 3 \\ | \\ 2x^3 - 7x^2 + 3 \\ | \end{array} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x - 2)}{(x - 3)(2x^2 - 7x + 3)} = \overset{\circ}{=} 1$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{(x - 2)}{2x^2 - 7x + 3} = \overset{\circ}{=} \frac{1}{+} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{(x - 2)}{2x^2 - 7x + 3} = \overset{\circ}{=} \frac{1}{-} = -\infty \end{cases}$$

$$\text{ت) } \lim_{x \rightarrow (-1)} \frac{x^2 - 1}{x + \sqrt{2x + 3}} = \overset{\circ}{=}$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)} \frac{(x-1)(x+1)}{x + \sqrt{2x+3}} \times \frac{x - \sqrt{2x+3}}{x - \sqrt{2x+3}} = \lim_{x \rightarrow (-1)} \frac{(x-1)(x+1)(x - \sqrt{2x+3})}{x^2 - (2x+3)} =$$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)} \frac{(x-1)(x+1)(x - \sqrt{2x+3})}{(x+1)(x-3)} = \frac{(-1)(-1)}{(-1)} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$\text{ث) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{x}}{x^2 + x - 2} = \overset{\circ}{=} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{x}}{x^2 + x - 2} \times \frac{x + \sqrt{x}}{x + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x}{(x-1)(x+2)(x + \sqrt{x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)}{(x-1)(x+2)(x + \sqrt{x})} = \frac{1}{(1)(2)} = \frac{1}{2}$$

$$\text{ج) } \lim_{x \rightarrow (-1)} \frac{\sqrt[3]{x+1}}{x^2 + 3x + 2} \times \frac{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x+1}}{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x+1}} = \lim_{x \rightarrow (-1)} \frac{(x-1)}{(x+1)(x+2)(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x+1})} = \overset{\circ}{=} \frac{1}{3}$$

۳- حد های زیر را در صورت وجود بیابید.

$$\text{الف) } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2x^2 - x}{4x^2 - 1} = \overset{\circ}{=} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{x(2x-1)}{(2x-1)(2x+1)} = \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{ب) } \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 4x^2 - 4x - 5}{x^2 - 25} = \overset{\circ}{=}$$

عامل صفر کنید $(5-x)$ می باشد پس با بر حساب را بر $x-5$ تقسیم کنیم:

$$\begin{array}{r} x^3 - 4x^2 - 4x - 5 \\ -(x^3 - 5x^2) \quad | \quad x-5 \\ \hline x^2 - 4x - 5 \\ -(x^2 - 5x) \\ \hline x - 5 \\ -(x - 5) \\ \hline \end{array}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-5)(x^2 + x + 1)}{(x-5)(x+5)} = \frac{25+5+1}{5+5} = \frac{31}{10}$$

ب) $\lim_{x \rightarrow (-4)} \frac{x^3 + 3x - 4}{x^3 + 4x^2 + x + 4} = \lim_{x \rightarrow (-4)} \frac{(x+4)(x-1)}{x^2(x+4) + x + 4} = \lim_{x \rightarrow (-4)} \frac{(x+4)(x-1)}{(x+4)(x^2 + 1)} = \frac{-5}{17}$

۴- حد های زیر را در صورت وجود بیابید.

(الف) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{2x-1}}{x^2 - x} = \dots \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - \sqrt{2x-1}}{x(x-1)} \times \frac{x + \sqrt{2x-1}}{x + \sqrt{2x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - (2x-1)}{x(x-1)(x + \sqrt{2x-1})}$
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{x(x-1)(x + \sqrt{2x-1})} = \dots$

(ب) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{2 - \sqrt{x+1}} = \dots \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{2 - \sqrt{x+1}} \times \frac{2 + \sqrt{x+1}}{2 + \sqrt{x+1}} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)(2 + \sqrt{x+1})}{4 - (x+1)}$
 $= -(6)(2+2) = -24$

(ج) $\lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt[3]{x+2}}{\sqrt[3]{x+2}} = \dots \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt[3]{x+2}}{\sqrt[3]{x+2}} \times \frac{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x+4}}{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x+4}}$
 $\lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt[3]{x+2}(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x+4})}{(x+2)} = \frac{2(4+2 \times 2+4)}{(-8+2)} = 24$

سوالات مربوط به حد های نامتناهی

۱- حد های زیر را بدست آورید.

(الف) $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{2x}{x-5} = \frac{+10}{\dots^-} = -\infty$

(ب) $\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{2x}{x-5} = \frac{+10}{\dots^+} = +\infty$

(ج) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow \infty^+} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{(\infty^+)^2} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow \infty^-} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{(\infty^-)^2} = +\infty \end{cases}$



$$(ت) \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2}{|x-3|} \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2}{|x-3|} = \frac{2}{\left| \underset{+}{\circ} \right|} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2}{|x-3|} = \frac{2}{\left| \underset{-}{\circ} \right|} = +\infty \end{cases}$$

$$(ث) \lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{3})} \frac{[x]}{|3x+1|} \xrightarrow{\left[\frac{-1}{3} \right] = -1} \lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{3})} \frac{-1}{|3x+1|} = \frac{-1}{\left| \underset{-}{\circ} \right|} = -\infty$$

$$(ج) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{\sin^2 x} \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+1}{\sin^2 x} = \frac{+1}{(\underset{+}{\circ})^2} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x+1}{\sin^2 x} = \frac{+1}{(\underset{-}{\circ})^2} = +\infty \end{cases}$$

۲- حاصل حد های زیر را بدست آورید.

$$(الف) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{\underset{+}{\circ}} = +\infty$$

$$(ب) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x|} \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{|x|} = \frac{1}{\left| \underset{+}{\circ} \right|} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{|x|} = \frac{1}{\left| \underset{-}{\circ} \right|} = +\infty \end{cases}$$

$$(ت) \lim_{x \rightarrow (-6)} \frac{9}{(x+6)^2} \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow (-6)^+} \frac{9}{(x+6)^2} = \frac{9}{(\underset{+}{\circ})^2} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow (-6)^-} \frac{9}{(x+6)^2} = \frac{9}{(\underset{-}{\circ})^2} = +\infty \end{cases}$$

$$(ث) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-1}{(x-3)^4} \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{-1}{(x-3)^4} = \frac{-1}{(\underset{+}{\circ})^4} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{-1}{(x-3)^4} = \frac{-1}{(\underset{-}{\circ})^4} = -\infty \end{cases}$$

$$(ج) \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{4x+1}{(2x+1)^2} \Rightarrow \frac{-1}{(\underset{-}{\circ})^2} = \frac{-1}{\underset{+}{\circ}} = -\infty$$

$$(د) \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1-5x}{x^2-9} = \frac{-14}{\underset{+}{\circ}} = -\infty$$

$$(ز) \lim_{x \rightarrow (-2)^-} \frac{-3x}{x^2-4} = \frac{+6}{\underset{+}{\circ}} = +\infty$$

$$(خ) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{1}{\cos x} \xrightarrow{(cos x < 0) \rightarrow \text{رجوع}} \frac{1}{\underset{-}{\circ}} = -\infty$$



د) $\tan x$ $\xrightarrow{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-}$ تا پایه اول است
 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$ پس $\tan x > 0$

ذ) $\tan x$ $\xrightarrow{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+}$ تا پایه دو است
 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+$ پس $\tan x < 0$

در) $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{[x] - 3}{x - 3}$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{[x] - 3}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2 - 3}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{-1}{x - 3} = \frac{-1}{0^-} = +\infty$$


۳-الف) عبارت $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$ به چه معناست؟

هر تابع $f(x)$ وقتی که x از مقادیر کوچکتر از ۲ به عدد ۲ نزدیک می‌شود از هر عدد مثبت دلخواهی بزرگتر است.

ب) عبارت $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$ به چه معناست؟

هر تابع $f(x)$ وقتی که x از مقادیر بزرگتر از ۲ به عدد ۲ نزدیک می‌شود از هر عدد منفی دلخواهی کوچکتر است.

پ) نمودار تابعی مانند f را رسم کنید که در هر دو شرط بالا صدق کند.



سوالات مربوط به حد در بی‌نهایت

۱- مقدار حدهای زیر را بدست آورید.

الف) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{3x+2}{x}}{\frac{x-1}{x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3 + \frac{2}{x}}{1 - \frac{1}{x}} = \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} 3 + \lim_{x \rightarrow -\infty} (\frac{2}{x})}{\lim_{x \rightarrow -\infty} 1 - \lim_{x \rightarrow -\infty} (\frac{1}{x})} = \frac{3+0}{1-0} = 3+$


ب) $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{1-\Delta t^2}{t^2 + 3t} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1-\Delta t^2}{t^2}}{\frac{t^2 + 3t}{t^2}} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{t^2} - \frac{\Delta t^2}{t^2}}{1 + \frac{3t}{t^2}} = \frac{\lim_{t \rightarrow -\infty} (\frac{1}{t^2}) - \lim_{t \rightarrow -\infty} (\Delta t^2)}{\lim_{t \rightarrow -\infty} (1) + \lim_{t \rightarrow -\infty} (\frac{3t}{t^2})} = \frac{0 - \Delta}{1 + 0} = -\Delta$

پ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2-3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{2-3x}{x}} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}}{\lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{2}{x}) - \lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{3x}{x})} = \frac{0}{0-3} = 0$




۲- با توجه به نمودار هر تابع طرف دوم تساوی های زیر را بنویسید.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x+1) = +\infty$$




$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x+1) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \infty$$


$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \infty$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$$

۳- نمودار هر یک از توابع زیر را رسم کنید و سپس حدود خواسته شده را بدست آورید.

الف) $f(x) = \frac{1}{x}$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$




$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \infty & \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= -\infty & \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= -\infty \end{aligned}$$

ب) $g(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$




$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -1, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$$




۴- با توجه به نمودار توابع، حدود خواسته شده را بنویسید.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$




$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$




$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = -\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} h(x) = +\infty$$



۵- نمودار تابع f به شکل زیر است. حدود خواسته شده را بنویسید.

$$1) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$2) \lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = +\infty$$

$$3) \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

$$6) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

توشهای برای موفقیت

۶- حدود زیر را محاسبه کنید:

$$1) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(4 + \frac{y}{x^r} \right) = 4 + 0 = 4$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2}x^r + 4x^r - 6 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2}x^r \right) = -\infty$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{4x - 3} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{4x} \right) = 0$$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^r + \frac{1}{x^r}}{\frac{4}{x} - 5} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^r + \frac{1}{x^r})}{\lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{4}{x} - 5)} = \frac{r}{-5} = \frac{-r}{5}$$



$$5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x-1}{3x+1} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x}{3x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x}{x} \right) = \frac{2}{3}$$

$$6) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x^r - 3x + 1}{x^r + 5x - 3} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x^r}{x^r} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2) = 2$$

$$7) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x^5 - 6x^3 - x}{x^r - 5x + 1} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x^5}{x^r} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^5) = -\infty$$

$$8) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^r + x}{3-x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^r) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x) = -\infty$$


$$9) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-6x^r + 7x - 9}{2x^r - 4x^r + x} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-6x^r}{2x^r} \right) = \frac{-6}{2} = -3$$

7- الف) هر یک از رابطه‌های $-1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ به چه معناست؟

اگر x به اندازه کافی بزرگ انتقال پیدا کند، تابع $f(x)$ را به هر اندازه دلخواه می‌توان به -1 نزدیک کرد.

اگر x به اندازه کافی کوچک انتقال پیدا کند، تابع $f(x)$ را به هر اندازه دلخواه می‌توان به 2 نزدیک کرد.

ب) نمودار تابعی مانند f را در میان دو ویژگی الف را داشته باشد.



ایران توسل

توشه‌ای برای موفقیت



تمرین‌های فصل چهارم: مشتق
تیپ اول: تعریف حدی مشتق

۱- معادله خط مماس بر منحنی تابع $y = x^3 + 3$ را در نقطه‌ای به طول (-۲) بنویسید.

پاسخ: می‌دانیم شیب خط مماس بر منحنی f در نقطه $(\alpha, f(\alpha))$ به صورت زیر است:

$$\text{شیب خط مماس بر منحنی} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$$

$$f(-2) = (-2)^3 + 3 = -5, \quad f(-2+h) = (-2+h)^3 + 3 = -8 - 12h + h^3 + 3 = -5 - 12h + h^3$$

$$f'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2+h) - f(-2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-5 - 12h + h^3 - (-5)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-12h + h^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(-12 + h^2)}{h} = -12$$

۲- اگر $f(x) = x^3$ ، $f'(3)$ را به دو روش به دست آورید.

پاسخ: روش اول:

$$f(3) = 27$$

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(h+3)^3 - 27}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 + 9h^2 + 27h - 27}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h^2 + 9h + 27)}{h} = 27$$

$$f'(\alpha) = \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha}$$

$$f'(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x^2 + 3x + 27)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 3x + 27) = 27$$

۳- برای تابع $x^3 + 10x$ ، $f'(\lambda)$ را به دو روش حساب کنید.

$$f(\lambda) = -(\lambda)^3 + 10\lambda = -\lambda^3 + 10\lambda = 16$$

روش اول:

$$f'(\lambda) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\lambda+h) - f(\lambda)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(\lambda+h)^3 + 10(\lambda+h) - 16}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(\lambda^3 + h^3 + 3\lambda h^2 + 3\lambda^2 h) + 10\lambda + 10h - 16}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h^3 - 3\lambda h^2 + 10h}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h(h^2 + 3\lambda h + 10)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (-h^2 - 3\lambda h + 10) = -10$$

روش دوم:

$$f'(\lambda) = \lim_{x \rightarrow \lambda} \frac{f(x) - f(\lambda)}{x - \lambda} = \lim_{x \rightarrow \lambda} \frac{-x^3 + 10x - 16}{x - \lambda} = \lim_{x \rightarrow \lambda} \frac{-(x-\lambda)(x^2 + x\lambda + \lambda^2)}{x - \lambda} = -10$$

۴- اگر $f(x) = 3x^3 - 2x + 1$ را به دست آورید و معادله خط مماس بر منحنی f را در نقطه‌ای به طول ۲ واقع بر آن بنویسید.

پاسخ: ابتدا شیب خط مماس را به کمک فرمول هری مشتق به دست می‌آوریم:

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \xrightarrow{f(2) = 1} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^3 - 2x + 1 - 1}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(3x^2 + 4x + 4)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 + 4x + 4) = 20$$

$$\begin{cases} (2, 1) \\ m = 20 \end{cases} \Rightarrow y - 1 = 20(x - 2) \Rightarrow y = 20x - 39$$



۵- اگر $f(x) = x^3 - 2$ را به کمک تعریف مشتق به دست آورید.
پاسخ:


$$f(-1) = (-1)^3 - 2 = -3$$

$$f'(-1) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 2 - (-3)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2 - x + 1)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - x + 1) = 3$$

تیپ دوم: محاسبه شیب از روی نمودار

۶- برای نمودار $y = f(x)$ در شکل زیر شیب‌های داده شده از (الف) تا (ج) را از کوچک‌ترین به بزرگ‌ترین مرتب کنید.



پاسخ: m_1

پاسخ: m_2

پاسخ: m_3

پاسخ: m_4

پاسخ: $m_5 = 0$

پاسخ: $m_6 = 1$

الف) شیب نمودار در نقطه A :

ب) شیب نمودار در نقطه B :

پ) شیب نمودار در نقطه C :

ت) شیب خط AB :


ث) شیب خط 2 :

ج) شیب خط $x = y$:

با توجه به نمودار شیب در نقطه A پیشتر از سایر نقاط می‌باشد و ترتیب قرارگیری به صورت زیر است:
 $m_1 > m_6 > m_4 > m_2 > m_3 > m_5$

۷- نقاط داده شده روی منحنی زیر را با شیب‌های ارائه شده در جدول نظیر کنید.

شیب	نقطه
-۳	F
-۱	C
۰	E
$\frac{1}{2}$	A
۱	B
۲	D




پاسخ: با توجه به نمودار شیب در نقطه D از شیب در نقطه B تند است پس عدد ۲ را برای D انتقال می‌کنیم. همچنین در نقطه F با سرعت بیشتری نسبت به نقطه C در حال نزول هستیم.



۸- با در نظر گرفتن نمودار F در شکل زیر، نقاط به طول‌های a, b, c, d و e را با مشتق‌های داده شده در جدول نظری کنید.

x	$f'(x)$
d	۰
b	$۰/۵$
c	۲
a	$-۰/۵$
e	-۲



پاسخ: با توجه به نمودار مشاهده می‌کنیم خط مماس در نقطه d موازی محور x است پس مشتق در آن نقطه برابر صفر است و شیب خط مماس در نقطه c تندتر از شیب در نقطه b می‌باشد و هم‌چنین در نقطه e با شیب تندتری در حال نزول هستیم.

→ ۹- نقاطی مانند A, E, D, C, B, F و G را روی نمودار $y = f(x) = f(x)$ مشخص کنید. به طوری که:

الف) A ، نقطه‌ای روی نمودار است که شیب خط مماس بر نمودار در آن منفی است.

ب) B نقطه‌ای روی نمودار است که مقدار تابع و مقدار مشتق در آن نقطه منفی است.


پ) C نقطه‌ای روی نمودار است که مقدار تابع در آن جا صفر است ولی مقدار مشتق در آن نقطه مثبت است.

ت) D نقطه‌ای روی منحنی است که مشتق در آن جا صفر است.

ث) نقاط E و F نقاط متفاوتی روی نمودار هستند که مشتق یکسان دارند.

ج) G نقطه‌ای روی منحنی است که مقدار تابع در آن جا مثبت ولی مقدار مشتق منفی است.

پاسخ:



→ ۱۰- نقاط A, E, D, C, B, F را روی منحنی زیر در نظر می‌گیریم. در مورد شیب منحنی در این نقاط کدام گزاره درست و کدام یک نادرست است؟

الف) شیب منحنی در همه نقاط مثبت است.

پاسخ: نادرست - (شیب در نقاط D, C و F منفی است).

ب) $m_A < m_B$

پاسخ: نادرست - (شیب در نقطه A از نقطه B تندتر است).

پاسخ: درست $m_E < m_B < m_A$


پاسخ: درست (شیب منفی در نقاط F, D و C منفی است).

پاسخ: درست $m_F < m_D < m_C$

پاسخ: (شیب در نقطه D کندتر از نقطه C است).


پاسخ: درست $m_C < m_D < m_F < m_E < m_B < m_A$

پاسخ: درست





۱۱- برای تابع f در شکل زیر داریم: $f(4) = 25$, $f'(4) = 1/5$, با توجه به شکل مختصات نقاط A , B و C را بیابید.



پاسخ: با توجه به شکل مشاهده می‌کنیم شیب خطی که از نقاط A , B و C عبور می‌کند برابر است. مشتق در نقطه $x = 4$ یعنی $f'(4)$.


$$m = f'(4) = 1/5 = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \Rightarrow \frac{y_B - 25}{5 - 4} = 1/5 \rightarrow y_B = 26/5 \rightarrow B(5, 26/5)$$

$$1/5 = \frac{y_A - y_C}{x_A - x_C} \Rightarrow \frac{25 - y_C}{4 - 3} = 1/5 \rightarrow y_C = 23/5 \rightarrow C(3, 23/5)$$

تیپ سوم: مشتق پذیری و پیوستگی

۱۲- تابع g (شکل زیر) را به صورت $g(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 1 \\ x+1 & x > 1 \end{cases}$ در نظر می‌گیریم. چرا (1) g' موجود نیست.

پاسخ: با توجه به نمودار مشاهده می‌کنیم که هر دو قطعه تابع پذیر هستند، اما در نقطه $x = 1$ با هم برابر نیستند. پس تابع پیوسته نیست و مشتق هم ندارد.



۱۳- نشان دهید مشتق تابع $|x^3 - 1|$ در نقطه $x = -1$ موجود نیست.

پاسخ:

$$f'(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{|x^3 - 1| - 0}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{|x^3 - 1|}{x + 1}$$

$$\text{هر راست: } \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{x^3 - 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{(x+1)(x^2 - x + 1)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} (x^2 - x + 1) = -2$$

$$\text{هر چپ: } \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{-(x^3 - 1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{-(x-1)(x^2 + x + 1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} -(x-1) = +2$$

مشاهده می‌کنیم مشتق‌های چپ و راست با هم برابر نیستند پس (-1) f' موجود نیست.

۱۴- مشتق پذیری روی بازه‌های $[a, b]$ و (a, b) را به طور مشابه تعریف کنید.


پاسخ: تابع f روی بازه $[a, b]$ مشتق پذیر است. هرگاه f روی بازه (a, b) مشتق پذیر باشد و در نقطه a مشتق راست داشته باشد. تابع f روی بازه (a, b) مشتق پذیر است، هرگاه f روی بازه (a, b) مشتق پذیر باشد و در نقطه b مشتق چپ داشته باشد.

۱۵- تابع $f(x) = \begin{cases} x^3 & -2 \leq x \leq 1 \\ x+1 & x > 1 \end{cases}$ در نظر می‌گیریم. چرا تابع f در بازه $[1, 2]$ مشتق پذیر نیست؟

پاسخ: زیرا با این‌که روی بازه $(1, 2)$ مشتق پذیر است، اما در $x = 1$ پیوستگی راست ندارد. (هر راست با مقدار تابع برابر نیست)، پس $x = 1$ مشتق راست ندارد.



[−۲, ۰] در بازه های [−۱, ۱], [۲, ۵) و [۰, ۵] را روی بازه های $f(x)$ نمودار f را رسم کنید و مشتق پذیر f را در بازه های $[−۱, ۱]$, $[۲, ۵)$ و $[۰, ۵]$ بررسی کنید.




$$f(x) = \begin{cases} 2x + 4 & x < -1 \\ x^2 - 1 & -1 \leq x < 2 \\ -x + 5 & 2 < x < 5 \end{cases}$$

پاسخ: تابع در بازه $[-2, 0]$ مشتق پذیر نیست. زیرا در $x = -1$ تپوسته است.

تابع در بازه $(2, 5)$ مشتق پذیر است.

تابع در بازه $[0, 1]$ مشتق پذیر است.



الف) نمودار تابع f را رسم کنید.

پاسخ:

ب) نشان دهید که $f'(0)$ و $f'(3)$ وجود ندارند.

پاسخ:

$$f(0) = 0$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \Rightarrow$$

پیوسته نیست

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5x - 4 - 0}{x - 0} = \frac{-4}{0} = +\infty$$

$$f(3) = 9$$

$$f'_+(3) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x + 6 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x - 3}{x - 3} = 1$$

مشتق پهپ و راست با هم برابر نیست.

$$f'_-(3) = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x+3) = 6$$


پ) ضابطه تابع مشتق را بنویسید.

پاسخ: می‌دانیم در $x = 0$ و $x = 3$ مشتق پذیر نیست.

$$f'(x) = \begin{cases} 5 & x < 0 \\ 2x & 0 < x < 3 \\ 1 & x > 3 \end{cases}$$

ت) نمودار تابع مشتق را رسم کنید.

پاسخ:






۱۷- نمودار تابعی را درسم کنید که مشتق آن:

الف) در یک نقطه برابر صفر شود.

پاسخ:





$$y = x^2$$

$$\begin{aligned}f(x) &= x^2 - x \\f'(x) &= 2x - 1 \\f'(2) &= 2(2) - 1 = 3\end{aligned}$$

ب) در $x = 2$ برابر ۳ شود.


پاسخ:



$$y = x^3$$

پ) در تمام نقاط مثبت شود.


پاسخ:



$$y = x$$

ت) در تمام نقاط یکسان شود.

پاسخ:



$$y = -x^3$$

ث) در تمام نقاط منفی شود.

پاسخ:

ایران تو شهای برای موفقیت

۱۸- مشتق‌پذیری تابع $f(x) \begin{cases} x^2 + 3 & x \geq 1 \\ 2x & x < 1 \end{cases}$ در نقطه $x = 1$ ببررسی کنید.

پاسخ:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + 3) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x) = 2$$

هر چه و راست در نقطه $x = 1$ برابر نیست. پس پیوسته نیست و مشتق هم در $x = 1$ ندارد.۱۹- اگر $f(x) = |x^2 - 4|$ ، به کمک تعریف مشتق، مشتق‌پذیر f را در نقطه $x = -2$ ببررسی کنید.

$$f'_+(-2) = \lim_{x \rightarrow (-2)^+} \frac{-(x^2 - 4) - 0}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow (-2)^+} \frac{-(x - 2)(x + 2)}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow (-2)^+} -(x - 2) = +4$$


پاسخ:

$$f'_-(-2) = \lim_{x \rightarrow (-2)^-} \frac{(x^2 - 4) - 0}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow (-2)^-} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x + 2} = -4$$




مشاهده می‌کنیم مشتق چپ و راست با هم برابر نیست پس تابع f در $x = -2$ مشتق ندارد.
۲۰- در شکل‌های زیر مشخص کنید که هر تابع در کدام نقطه یا نقاط مشخص شده، مشتق‌پذیر نیست.


پاسخ:




در x_2 مشتق‌پذیر نیست.
نقاط گوشه




در x_2 و x_3 مشتق‌پذیر نیست.
نقاط تاپوسته




در x_1 و x_3 مشتق‌پذیر نیست.
نقاط گوشه‌ای



در x_3 مشتق‌پذیر نیست.
(نقشه تاپوستگی)




در x_3 مشتق‌پذیر نیست.
(مشتق تامتاهی)



در x_2 مشتق‌پذیر نیست.
مشتق تامتاهی

۲۱- با محاسبه مشتق راست و مشتق چپ توابع داده شده در نقطه A ، نشان دهید که این توابع در نقطه A مشتق‌پذیر نیستند.


پاسخ:



$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases} \rightarrow f'(x) = \begin{cases} 2x & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$


$$\begin{cases} f'_+(0) = 0 \\ f'_-(0) = -1 \end{cases} \quad f'_+(0) \neq f'_-(0)$$

توشه‌ای برای موفقیت



$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 1 \\ \frac{1}{x} & x < 1 \end{cases} \rightarrow f'(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x^2} & x > 1 \\ 0 & x < 1 \end{cases}$$

$$f'_+(1) = -1, \quad f'_-(1) = 0 \rightarrow f'_+(1) \neq f'_-(1)$$




$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \geq 4 \\ \sqrt{x} & x < 4 \end{cases} \rightarrow f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & x > 4 \\ \frac{1}{2\sqrt{x}} & x < 4 \end{cases}$$



$$f'_+(t) = \frac{1}{t}, f'_-(t) = \frac{1}{t} \rightarrow f'_+(t) \neq f'_-(t)$$

۲۲- نمودار توابع f , g , h و t را به نمودار مشتق آن‌ها نظیر کنید.

پاسخ:



(۱) اگر نمودار تابع اصلی صعودی باشد، نمودار مشتق آن بالای معمور x ها قرار می‌گیرد.

(۲) اگر نمودار تابع اصلی نزولی باشد، نمودار مشتق آن پایین معمور x ها قرار می‌گیرد.

(۳) اگر نمودار تابع اصلی قله یا دره داشته باشد، در نمودار مشتق، آن نقاط مطل ببرفورد با معمور x ها می‌شود.

تیپ چهارم: محاسبه مشتق توابع

۲۳- مشتق تابع زیر را محاسبه کنید.

$$1) f(x) = x^5 + 4x^3 - \sqrt{2}x + 1$$

$$f'(x) = 5x^4 + 12x^2 - \sqrt{2}$$

$$2) f(x) = (2x^3 + 1)(-x^2 + 7x - 2)$$

$$f'(x) = (6x^2)(-x^2 + 7x - 2) + (2x^3 + 1)(-2x + 7)$$

ایران‌جی
توشه‌ای برای موفقیت

$$3) f(x) = \frac{x^2 - 4}{3x + 1}$$

$$f'(x) = \frac{(2x)(3x+1) - (3)(x^2 - 4)}{(3x+1)^2} = \frac{3x^2 + 2x + 12}{(3x+1)^2}$$

$$4) f(x) = \frac{1}{x-4}$$

$$f'(x) = \frac{0(x-4) - (1)(1)}{(x-4)^2} = \frac{-1}{(x-4)^2}$$

$$5) f(x) = \left(\frac{-3x-1}{x^2+5}\right)^4$$

$$f'(x) = 4\left(\frac{-3(x^2+5) - (2x)(-3x-1)}{(x^2+5)^2}\right)\left(\frac{-3x-1}{x^2+5}\right)^3$$



$$6) f(x) = \frac{x}{2x^2 + x - 1}$$

$$f'(x) = \frac{(1)(2x^2 + x - 1) - (4x + 1)(x)}{(2x^2 + x - 1)^2}$$

$$7) f(x) = (3x^2 - 4)(2x - 5)^2$$

$$f'(x) = (6x)(2x - 5)^2 + (3x^2 - 4)(2(2)(2x - 5)) = (2x - 5)(24x^2 - 30x - 16)$$

$$8) f(x) = (\sqrt{3x+2})(x^2 + 1)$$

$$f'(x) = \left(\frac{3}{2\sqrt{3x+2}}\right)(x^2 + 1) + (\sqrt{3x+2})(3x^2)$$

$$9) f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{-3x + 2}$$

$$f'(x) = \frac{(2x - 3)(-3x + 2) - (-3)(x^2 - 3x + 1)}{(-3x + 2)^2} = \frac{-3x^2 + 4x - 3}{(-3x + 2)^2}$$

$$10) f(x) = \frac{4x - 2}{\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} \times (4x - 2)}{(\sqrt{x})^2}$$

۲۴- اگر f و g توابع مشتقپذیر باشند و 3 مقدار $(fg)'(2)$ و $g(2) = 8$ و $f(2) = 5$ ، $f'(2) = 6$ و $g'(2) = -6$ باشند آورید.

پاسخ:


$$(f \cdot g)'(2) = f'(2)g(2) + f(2)g'(2) = 5 \times 8 + 3 \times (-6) = 40 - 18 = 22$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(2) = \frac{f'(2) \cdot g(2) - g'(2) \cdot f(2)}{(g(2))^2} = \frac{5 \times 8 - 3 \times (-6)}{8^2} = \frac{40 + 18}{64} = \frac{29}{32}$$

۲۵- اگر $f'(1) = 3$ و $g'(1) = 5$ و $(3f + 2g)'(1)$ مطلوب است، پاسخ:

$$(f + g)'(1) = f'(1) + g'(1) = 3 + 5 = 8$$

$$(3f + 2g)'(1) = 3f'(1) + 2g'(1) = 3(3) + 2(5) = 9 + 10 = 19$$



- ۲۶- نمودار توابع f و g را در شکل زیر در نظر بگیرید.

الف) اگر $h(x) = f(x) - g(x)$ مطلوب است ($1 \leq x \leq 4$)، $h'(x)$ مطلوب است ($1 \leq x \leq 4$)

ب) اگر $k(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ مطلوب است ($1 \leq x \leq 4$)، $k'(x)$ مطلوب است ($1 \leq x \leq 4$)

پاسخ:

ابتدا ضابطه توابع f و g را می‌نویسیم:

$$[2, 4]: \text{ضابطه تابع } f \text{ برای بازه } [2, 4] \text{ است: } mf = \frac{4-0}{4-2} = -2 = f'(x), y - 0 = (-2)(x - 2) \Rightarrow y = -2x + 4$$

$$[0, 2]: \text{ضابطه تابع } f \text{ برای بازه } [0, 2] \text{ است: } mf = \frac{2-0}{2-0} = 2 = f'(x) \Rightarrow y - 0 = 2(x - 0) \Rightarrow y = 2x$$

$$g: \text{ضابطه تابع } g \text{ است: } mg = \frac{0-4}{4-0} = -1 \rightarrow y - 4 = (-1)(x - 4) \Rightarrow y = -x + 4$$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} -2x + 4 & 2 \leq x \leq 4 \\ 2x & 0 \leq x \leq 2 \end{cases}, \quad g(x) = -x + 4$$

$$f(0) = 0 \quad f'(0) = 2 \quad g(0) = 4 \quad g'(0) = -1$$

$$f(2) = 4 \quad f'_+(2) = -2, \quad f'_-(2) = 2 \quad g(2) = 2 \quad g'(2) = -1$$

$$f(4) = 0 \quad f'(4) = -2 \quad g(4) = 0 \quad g'(4) = -1$$

$$h'(0) = f'(0).g(0) + f(0).g'(0) = 2 \times 4 + (-1) \times 2 = 4$$

$$h'(2) = \begin{cases} f'_+(2).g(2) + f(2).g'(2) = (-2) \times 2 + 4(-1) = -8 \\ f'_-(2).g(2) + f(2).g'(2) = 2 \times 2 + 4(-1) = 0 \end{cases}$$

$x = 2$ مشتق پذیر نیست

$$h'(4) = f'(4).g(4) + f(4).g'(4) = (-2) \times 0 + 0(-1) = 0$$

$$k'(0) = \frac{f'(0).g(0) - g'(0)f(0)}{g^2(0)} = \frac{2 \times 4 - 2 \times (-1)}{4^2} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$$

$$k'_+(2) = \frac{f'_+(2).g(2) - g'(2)f(2)}{g^2(2)} = \frac{-2 \times 2 - 4(-1)}{4^2} = \frac{0}{16} = 0$$

$$k'_-(2) = \frac{f'_-(2).g(2) - g'(2).f(2)}{g^2(2)} = \frac{2 \times 2 - 4(-1)}{4^2} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$$

$$k'(4) = \frac{f'(4).g(4) - g'(4).f(4)}{g^2(4)} = \frac{-2 \times 0 - 0(-1)}{16} = 0$$



تیپ پنجم: آهنگ تغییر

۲۷- با توجه بهتابع رشد $f(x) = \sqrt{50 + 7x}$ به سوالات زیر پاسخ دهید:الف) آهنگ متوسط رشد، در بازه زمانی $[0, 25]$ چقدر است؟

پاسخ:

$$f(25) = \sqrt{50 + 7 \cdot 25} = \sqrt{175} = 5\sqrt{7} \quad f(0) = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$\frac{f(25) - f(0)}{25 - 0} = \frac{5\sqrt{7} - 5\sqrt{2}}{25} = \frac{5(\sqrt{7} - \sqrt{2})}{25} = \frac{\sqrt{7} - \sqrt{2}}{5}$$

ب) آهنگ لحظه‌ای تغییر قد کودک را در ۲۵ ماهگی و ۴۹ ماهگی، با هم مقایسه کنید. کدام یک بیشتر است؟

پاسخ: برای به دست آوردن آهنگ لحظه‌ای باید از تابع مشتق بگیریم:

$$f'(x) = \frac{d}{dx} (\sqrt{50 + 7x}) = \frac{7}{2\sqrt{50 + 7x}} \Rightarrow f'(25) = \frac{7}{2\sqrt{175}} = \frac{7}{10}, \quad f'(49) = \frac{7}{2\sqrt{243}} = \frac{7}{18} = \frac{5}{10}$$

آهنگ لحظه‌ای تغییر در $x = 25$ بیشتر است.۲۸- ارتفاع یک جسم از سطح زمین از معادله $h(t) = -5t^2 + 40t$ به دست می‌آید.

الف) سرعت جسم هنگام پرتاب و هنگام برخورد به زمین را به دست آورید.

پاسخ: ابتدا زمان برخورد به زمین را به دست می‌آوریم:

$$h(t) = 0 \Rightarrow -5t^2 + 40t = 0 \Rightarrow -5t(t - 8) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 8 \end{cases}$$

برای به دست آوردن معارله سرعت، کافی است از معارله $h(t)$ نسبت به t مشتق بگیریم:

$$V(t) = -10t + 40 \Rightarrow \begin{cases} V(0) = -10(0) + 40 = 40 \\ V(8) = -10(8) + 40 = -40 \end{cases}$$

ب) لحظاتی را معلوم کنید که سرعت جسم $\frac{m}{s}$ و $\frac{35}{s}$ است.

پاسخ:

$$V = -10t + 40 \Rightarrow \begin{cases} -10t + 40 = 35 \rightarrow -10t = -5 \rightarrow t = \frac{1}{2} \\ -10t + 40 = -35 \rightarrow -10t = -75 \rightarrow t = 7.5 \end{cases}$$

۲۹- جدول زیر درجه حرارت T (سانتی‌گراد) را در شهری از ساعت ۸ تا ۱۸ در یک روز نشان می‌دهد.

ساعت	h	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
T درجه حرارت	۱۱	۱۲	۱۴	۱۷	۱۹	۱۸	۱۷	۱۵	۱۳	۱۰	۹	

آهنگ تغییر متوسط درجه حرارت نسبت به زمان را:

الف) از ساعت ۸ تا ساعت ۱۲ به دست آورید.

پاسخ:

$$T(8) = 11, \quad T(12) = 19 \Rightarrow \frac{19 - 11}{12 - 8} = \frac{8}{4} = 2$$

ب) از ساعت ۱۲ تا ساعت ۱۸ به دست آورید.

پاسخ:


$$T(12) = 19, \quad T(18) = 9 \Rightarrow \frac{9 - 19}{18 - 12} = \frac{-10}{6} = -\frac{5}{3}$$

مشاهده می‌کنیم از ساعت ۸ تا ۱۲ به طور متوسط هوا کمتر می‌شود. از ساعت ۱۲ تا ۱۸ به طور متوسط هوا سردرم می‌شود.



۳۰- کسری از جمعیت یک شهر که به وسیله یک ویروس آلوده شده‌اند بر حسب زمان (هفته) در نمودار زیر نشان داده شده است.

الف) شیب‌های خطوط L و d چه چیزی را نشان می‌دهند؟



پاسخ: در هفته سوم آهنگ آلوده شدن از هفته ششم بیشتر است. یعنی هر چه زمان بیشتر گزشته شود، جمعیت کمتری از شهر آلوده شدن.

ب) گسترش آلودگی در کدامیک از زمان‌های $t = 1$ و $t = 2$ یا $t = 3$ بیشتر است؟


پاسخ: در $t = 3$ شیب فقط مماس بیشتر است.

پ) قسمت (ب) را برای $t = 4$, $t = 5$ و $t = 6$ بررسی کنید.

پاسخ: در $t = 6$ از همه کمتر است.

۳۱- نمودار رویه‌رو نمایش فروش تعداد نوعی کالا (N) پس از ضرب t میلیون تومان هزینه برای تبلیغ است.

الف) آهنگ تغییر N بر حسب t را وقتی t از صفر تا ۱، ۲، ۳ و ۴ تا ۴ تغییر می‌کند به دست آورید.



پاسخ:

$$\frac{N(1) - N(0)}{1 - 0} = \frac{300 - 0}{1} = 300, \quad \frac{N(2) - N(1)}{2 - 1} = \frac{480 - 300}{1} = 180$$

$$\frac{N(3) - N(2)}{3 - 2} = \frac{600 - 480}{1} = 120, \quad \frac{N(4) - N(3)}{4 - 3} = \frac{720 - 600}{1} = 120$$

ب) به نظر شما چرا آهنگ تغییرات، وقتی که مقادیر t افزایش می‌یابند، در حال کاهش است؟

پاسخ: پهن شب مماس‌ها کم می‌شود. (پهن آهنگ لحظه‌ای در حال کاهش است) (تعقر روی به پایین است).

۳۲- معادله حرکت متخرکی به صورت $f(t) = t^2 - t + 10$ بر حسب متر در بازه زمانی $[0, 5]$ (t بر حسب ثانیه) داده شده است. در کدام لحظه سرعت لحظه‌ای با سرعت متوسط در بازه زمانی $[0, 5]$ با هم برابرند؟

پاسخ:

$$\Rightarrow \begin{cases} f(0) = 10 \\ f(5) = 5^2 - 5 + 10 = 30 \end{cases} \Rightarrow \text{سرعت متوسط} = \frac{30 - 10}{5 - 0} = 4$$

سرعت لحظه‌ای = سرعت متوسط $\Rightarrow f'(t) = 2t - 1$: سرعت لحظه‌ای

$$2t - 1 = 4 \rightarrow t = \frac{5}{2} = 2.5$$



۳۳- توپی از یک پل به ارتفاع ۱۱ متر به هوا پرتاب می‌شود. $f(t)$ نشان‌دهنده فاصله توپ از سطح زمین در زمان t است. برخی از مقادیر $f(t)$ در جدول رو به رو نمایش داده شده است. براساس جدول کدام‌یک از مقادیر زیر می‌تواند سرعت توپ را هنگامی که در ارتفاع نظیر زمان ۴/۰ ثانیه است، نشان دهد؟

ثانیه t	۰	۰/۱	۰/۲	۰/۳	۰/۴	۰/۵	۰/۶
$f(t) \text{ متر}$	۱۱	۱۲/۴	۱۳/۸	۱۵/۱	۱۶/۳	۱۷/۴	۱۸/۴

الف) ۱/۲۳

ب) ۱۴/۹۱

پ) ۱۱/۵

ت) ۱۶/۰۳

پاسخ: برای اینکه سرعت توپ را در ۰/۴ = t به دست آوریم میانگین سرعت را در بازه‌های [۰/۳, ۰/۴] و [۰/۴, ۰/۵] به دست آوریم.

$$1) \frac{f(0/5) - f(0/4)}{0/5 - 0/4} = \frac{17/4 - 16/3}{0/1} = \frac{1/1}{0/1} = 11$$

$$2) \frac{f(0/4) - f(0/3)}{0/4 - 0/3} = \frac{16/3 - 15/1}{0/1} = \frac{1/2}{0/1} = 12$$

$$\frac{11+12}{2} = 11/5 = \text{میانگین}$$

۳۴- کدام‌یک از عبارات زیر درست و کدام‌یک نادرست است؟

الف) آهنگ تغییر متوسط تابعی مانند f در بازه [۰, ۱] همیشه کم‌تر از شیب منحنی در نقطه است.

پاسخ: نادرست است. زیرا تابع $y = x^3$ و از (۰, ۰) و (۱, ۱) می‌گذرد.

$$\frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{1 - 0}{1 - 0} = 1 = \text{آهنگ تغییر متوسط}$$

$$f'(x) = 3x^2 \rightarrow f'(0) = 0$$

ب) اگر تابعی صعودی باشد، آهنگ تغییر متوسط آن، همواره صعودی است.

پاسخ: نادرست است. تابعی مانند $y = \sqrt{x}$ تابعی صعودی است و آهنگ تغییر متوسطش همواره نزولی است. (تعریش رو به پایین است).

پ) تابعی وجود ندارد که برای آن هم $f(\alpha) = f'(\alpha) = 0$ و $f''(\alpha) < 0$.

پاسخ: نادرست است. تابع $y = x^3$ در نظر بگیرید.

$$f(0) = 0$$

$$f'(x) = 3x^2 \rightarrow f'(0) = 0$$

۳۵- یک توده باکتری پس از t ساعت دارای جرم $m(t) = \sqrt{t} + 2t^3$ گرم است.

الف) جرم این توده باکتری در بازه زمانی $4 \leq t \leq 3$ چند گرم افزایش می‌یابد؟

پاسخ:

$$m(4) = \sqrt{4} + 2 \times 4^3 = 13 \Rightarrow 130 - 55/2 = 74/3$$

$$m(3) = \sqrt{3} + 2 \times 3^3 = 55/2$$

ب) آهنگ رشد جرم توده باکتری در لحظه $t = 3$ چه قدر است؟

پاسخ:

$$m'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} + 6t^2 \rightarrow m'(3) = \frac{1}{2\sqrt{3}} + 6(3)^2 = \frac{1}{2\sqrt{3}} + 54$$



۳۶- گنجایش ظرفی 40° لیتر است. در لحظه $t = 0$ سوراخی در ظرف ایجاد می‌شود. اگر حجم مایع باقی‌مانده در ظرف پس

$$\text{از } t \text{ ثانیه از رابطه } V = 40(1 - \frac{t}{100})^2 \text{ به دست می‌آید:}$$

الف) آهنگ تغییر متوسط حجم مایع در بازه زمانی $[1, 10]$ چه قدر است؟

پاسخ:

$$V(0) = 40\left(1 - \frac{0}{100}\right)^2 = 40, \quad V(10) = 40\left(1 - \frac{10}{100}\right)^2 = 39/204 \Rightarrow \bar{V} = \frac{39/204 - 40}{10} = -0.796$$

ب) در چه زمانی، آهنگ تغییر لحظه‌ای حجم برابر آهنگ تغییر متوسط آن در بازه $[10, 100]$ می‌شود؟

پاسخ:

$$V' = 40 \times 2\left(1 - \frac{t}{100}\right) \times \left(-\frac{1}{100}\right) = \frac{-8}{10} \left(1 - \frac{t}{100}\right)$$


$$\begin{cases} V(0) = 40 \\ V(100) = 40 \times \left(1 - \frac{100}{100}\right)^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \bar{V} = \frac{0 - 40}{100 - 0} = -\frac{4}{10}$$

$$\Rightarrow \frac{-8}{10} + \frac{0/8t}{100} = -\frac{4}{10} \Rightarrow \frac{8t}{1000} = \frac{4}{10} \Rightarrow t = 50$$

ایران توشه
توشه‌ای برای موفقیت



۱- با توجه به نمودار مقابل جاهای خالی را پر کنید.



(الف) در بازه $(1, 7)$ که تابع f اکیداً صعودی است، شیب خطهای مماس بر نمودار f ، مثبت است. بنابراین در این بازه علامت f' مشتق است.

(ب) در بازه‌ی $(7, 12)$ که تابع اکیداً نزولی است، شیب خطهای مماس بر نمودار f منفی است. بنابراین در این بازه علامت f' منفی است.

(پ) در بازه $(12, +\infty)$ که تابع، مقدار ثابت دارد، مقدار f' صفر است.

۲- به کمک مشتق بیان کنید تابع $f(x) = 3x^3 - 3x$ در چه بازه‌های اکیداً صعودی و در کدام بازه‌ها اکیداً نزولی است.

پاسخ:

کافی است مشتق تابع f را تعیین علامت کنیم:

$$f'(x) = 3x^2 - 3 \quad \frac{f'(x)=0}{\rightarrow 3x^2 - 3x = 0 \rightarrow x = +1, x = -1}$$

x	-1	+1
علامت f'	+	-
یکنواختی تابع	اکیدا نزولی	اکیدا صعودی

در بازه $(-\infty, -1)$ و $(1, +\infty)$ اکیداً صعودی و در بازه $(-1, 1)$ اکیداً نزولی است.

پاسخ:

برای هل سوال کافی است نامعادله $0 < f'(x) = 3x^2 - 12x + 4$ را حل کنیم:

$$f'(x) = 3x^2 - 12 \quad \frac{f'(x)=0}{\rightarrow 3x^2 - 12 = 0 \rightarrow x^2 = 4 \rightarrow x = -2, x = +2}$$

تابع f در بازه $(-2, 2)$ نزولی اکید است.

x	$-\infty$	-2	+2	$+\infty$
f'	+	-	+	
f	اکیدا صعودی	اکیدا نزولی	اکیدا نزولی	اکیدا صعودی

۴- با تشکیل جدول تغییرات تابع $g(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ ، مشخص کنید تابع f در چه بازه‌هایی صعودی اکید و در کدام بازه‌ها نزولی است؟


$$g'(x) = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2} \quad \frac{g'(x)=0}{\rightarrow -2x = 0 \rightarrow x = 0}$$

تابع در بازه‌های $(-\infty, 0)$ صعودی اکید و در بازه‌ی $(0, +\infty)$ نزولی اکید است.


x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	صعودی	نیمه نزولی	نزولی




۵- نوع اکسٹرمم‌های نسبی هر یک از توابع زیر را در نقاط مشخص شده تعیین کنید و جدول‌ها را کامل کنید.



نقطه	نوع اکسٹرمم نسبی	مقدار اکسٹرمم نسبی	مقدار مشتق
A	نقطه اکسٹرمم نسبی نیست	-	-
B	نسبی max	-1	$f'(0)$ برابر صفر است
C	نقطه اکسٹرم نسبی نیست	-	-



نقطه	نوع اکسٹرمم نسبی	مقدار اکسٹرمم نسبی	مقدار مشتق
A	نسبی min و نه max	-	-
B	نسبی min	0	$f'(-2)$ موجود نیست
C	نسبی max	2	$f'(-2)$ موجود نیست
D	نسبی min	0	$f'(2)$ موجود نیست
E	نہ max و نه min	-	-



۶- با رسم نمودار تابع $f(x) = |x - 2|$, نشان دهید که $x = 2$ مینیمم دارد.

$$f(x) = |x - 2| \Rightarrow f(x) = \begin{cases} x - 2 & x \geq 2 \\ -x + 2 & x < 2 \end{cases}$$


$$\rightarrow f'(x) = \begin{cases} 1 & x > 2 \\ -1 & x < 2 \end{cases}$$

ب) آیا $f'(2)$ موجود است؟

فیر، زیرا مشتق پل و راست با هم برابر نیستند.

پ) آیا $x = 2$ طول نقطه بحرانی است؟

بله، زیرا تابع در $x = 2$ مشتق‌پذیر نیست ولی $x = 2$ عضو رامنه است.



۷- نمودار تابع $y = -x^3 + 3x$ را رسم کرده‌ایم: f را تعیین کنید.

الف) طول‌های نقاط اکسٹرمم نسبی f را تعیین کنید.

از روی نمودار: $(1, 2), (-1, -2)$.

طول‌ها: $+1, -1$.

به کمک مشتق:

$$\frac{f'(x)=0}{-3x^2 + 3 = 0} \rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

ب) می‌دانیم این تابع در \mathbb{R} مشتق‌پذیر است ریشه‌های $f'(x) = 0$ نقطه بحرانی را بدست آورید.

$$f'(x) = -3x^2 + 3 = 0 \rightarrow \pm 1$$

$$f(1) = +2, \quad f(-1) = -2$$

۸- تابع با ضابطه $f(x) = -x^3 + 2x + 2$ را در نظر بگیرید. طول نقاط بحرانی را بدست آورید.

$$f'(x) = -3x^2 + 2 \frac{f'(x)=0}{-3x^2 + 2 = 0} \rightarrow x = \pm 1 \rightarrow x = \pm 1$$



۹- جدول تغییرات تابع $y = x^3 - 3x^2$ را رسم کنید که نقاط اکسترمم نسبی تابع در آن را مشخص شده باشد.

$$g'(x) = 3x^2 - 6x \xrightarrow{g'(x)=0} 3x(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 2$$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
بازه	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, +\infty)$	
علامت f'	+	-	+	
نکات پذیری تابع	صعودی آید max نسبی	نزولی آید min نسبی	صعودی آید	

۱۰- نقاط بحرانی تابع زیر را در صورت وجود بدست آورید.

$$(الف) f(x) = \sqrt{4-x^2} \Rightarrow f'(x) = \frac{-2x}{2\sqrt{4-x^2}} = \frac{-2x}{2\sqrt{4-x^2}} \xrightarrow{f'(x)=0} -2x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow f(0) = 2$$

به کمک مشتق: می‌دانیم ریشه‌های ساده مشتق تابع، نقاط بحرانی هستند.

$$(ب) g(x) = x^3 + 3x^2 - 4 \Rightarrow g'(x) = 3x^2 + 6x \xrightarrow{g'(x)=0} 3x^2 + 6x = 0 \Rightarrow 3x(x+2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow g(0) = -4 \rightarrow (0, -4) \\ x = -2 \rightarrow g(-2) = 0 \rightarrow (-2, 0) \end{cases}$$

$$(ب) h(x) = \sqrt[3]{x} \Rightarrow h'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \Rightarrow \text{در } x = 0 \text{ مشتق پذیر نیست پس نقطه } (0, 0) \text{ نقطه بحرانی است.}$$

۱۱- در هر یک از توابع زیر، ابتدا نقاط بحرانی تابع را بدست آورید و سپس با رسم جدول تغییرات تابع، نقاط ماکزیمم نسبی و مینیمم نسبی آن را در صورت وجود مشخص کنید.

$$(الف) f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 1$$

$$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 \xrightarrow{f'(x)=0} 3(x^2 + 2x - 3) = 0 \rightarrow 3(x-1)(x+3) = 0 \rightarrow x = 1, x = -3$$

x	$-\infty$	-3	$+1$	$+\infty$
f'	+	◊	-	◊
f	↗	↓	↘	↗

max min 17 -15

$$(ب) g(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x - 9$$

$$g'(x) = -6x^2 + 6x + 12 \xrightarrow{g'(x)=0} -6x^2 + 6x + 12 = 0 \rightarrow -6(x^2 - x - 2) = 0 \rightarrow -6(x-2)(x+1) = 0 \rightarrow$$

$$x = 2, x = -1$$

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
g'	-	◊	+	◊
g	↘	↗	↙	↘

min max -16 11

$$(ب) h(x) = -x^3 - 3x^2 + 2$$

$$h'(x) = -3x^2 - 6 \xrightarrow{h'(x)=0} -3x^2 - 6 = 0 \rightarrow x^2 = -2 \rightarrow \text{غیر قابل قبول (نقطه بحرانی ندارد)}$$



۱۲- اگر نقطه $(2, 1)$ ، نقطه اکسترمم تابع $f(x) = x^3 + bx^2 + d$ باشد، مقادیر b و d را بدست آورید.

نقطه $(2, 1)$ عضوی از تابع است پس می‌توانیم آن را در تابع صدق دهیم.

$$f(2) = 1 \rightarrow 8 + 4b + d = 1 \rightarrow 4b + d = -7 \quad I$$

پون $(2, 1)$ اکسترمم است پس مشتق در نقطه $x = 2$ برابر صفر است.

$$f'(x) = 3x^2 + 2bx$$


$$f'(2) = 0 \Rightarrow 12 + 4b = 0 \rightarrow b = -3$$

$$I \quad 4(-3) + d = -7 \rightarrow d = 5$$

۱۳- به کمک رسم نمودار توابع، مقادیر اکسترمم‌های نسبی و مطلق تابع‌های زیر را در صورت وجود تعیین کنید.



الف $f(x) = x^3 : x \in [-2, 1]$

در $x = -2$ مینیمم مطلق دارد که مقدار آن برابر -1 است. در $x = 1$ ماکزیمم مطلق دارد که مقدار آن 1 است.




ب) $g(x) = -x^3 : x \in [-2, 3]$

در $x = 0$ دارای ماکزیمم مطلق و نسبی است که مقدار آن برابر صفر است. در $x = 3$ مینیمم مطلق دارد که مقدار آن برابر -27 است.



ت) $t(x) = |x^2 - 1|, x \in [-2, 3]$

در $x = 1$ و $x = -1$ دارای مینیمم مطلق و نسبی است و در $x = 3$ ماکزیمم نسبی است و در $x = 0$ ماکزیمم مطلق است.



نه ماکزیمم دارد و نه مینیمم



۱۴- مقادیر ماکزیمم مطلق و مینیمم مطلق توابع زیر را در بازه‌های مشخص شده در صورت وجود بدست آورید.

$$f(x) = -2x^3 + 9x^2 - 13 : x \in [-1, 2]$$

$$f'(x) = -6x^2 + 18x = 0 \rightarrow -6x(x-3) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 3 \end{cases}$$

$x = 3$ قابل قبول نیست زیرا در بازه $[-1, 2]$ قرار ندارد.

$$f(-1) = -2(-1)^3 + 9(-1)^2 - 13 = -2$$

$$f(0) = -13 \Rightarrow \min_{\text{مطلق}}(0, 13), \max_{\text{مطلق}}(2, 7)$$

$$f(2) = -2(-2)^3 + 9(2)^2 - 13 = +7$$

$$\text{(ب) } g(x) = x^3 + 2x - 5 : x \in [-2, 1]$$


$$g'(x) = 3x^2 + 2 = 0 \rightarrow x^2 = \frac{-2}{3} \quad \text{غیر قابل}$$

$$g(-2) = (-2)^3 + 2(-2) - 5 = -17 \Rightarrow \min_{\text{مطلق}}(-2, -17), \max_{\text{مطلق}}(1, -2)$$

$$g(1) = (1)^3 + 2(1) - 5 = -2$$

۱۵- می‌خواهیم یک قوطی استوانه‌ای شکل رو به رو و در باز بسازیم که گنجایش آن دقیقاً یک لیتر باشد. ابعاد قوطی چقدر باشد تا مقدار فلز به کار رفته در تولید آن مینیمم شود.

پاسخ:



$$\text{حجم استوانه} = V(Lit) = 1000 \text{ cm}^3$$

$$\pi r^2 h = 1000 \Rightarrow h = \frac{1000}{\pi r^2}$$

$$\text{مساحت جانبی} + \text{مساحت قاعده} = \text{مساحت کل}$$

$$\Rightarrow S = \pi r^2 + 2\pi r h = \pi r^2 + 2\pi r \left(\frac{1000}{\pi r^2}\right) \Rightarrow S = \pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

با یافتن نقطه بحرانی S و تشکیل جدول تغییرات آن، مشخص می‌کنیم به ازای هر مقداری از r ، مقدار S مینیمم می‌شود.

$$S' = 2\pi r - \frac{2000}{r^2} \xrightarrow{S'=0} 2\pi r^3 = 2000 \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{1000}{\pi}} = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}} \Rightarrow S\left(\frac{10}{\sqrt[3]{\pi}}\right) = \pi\left(\frac{10}{\sqrt[3]{\pi}}\right)^2 + \frac{2000}{\frac{10}{\sqrt[3]{\pi}}} = \frac{1000}{\pi} + 200\sqrt[3]{\pi}$$

توشه‌ای برای موفقیت

۱۶- دو عدد حقیقی بباید که تفاضل آنها ۱۰ باشد و حاصل ضربشان کمترین مقدار ممکن گردد.

$$x - y = 10 \Rightarrow x = 10 + y$$


$$S(y) = x \cdot y = (10 + y)y = y^2 + 10y \Rightarrow S'(y) = 2y + 10$$

$$\xrightarrow{S'(y)=0} 2y + 10 = 0 \Rightarrow y = -5 \Rightarrow x = 10 + (-5) = 5$$



۱۷- در بناهای تاریخی کشورمان پنجره‌هایی وجود دارد که به شکل یک مستطیل و نیم‌دایره‌ای بر روی آن می‌باشد. به طوری که قطر نیم برابر با پهنه‌ای مستطیل است. اگر محیط یک چنین پنجره‌ای $\frac{4}{5}$ متر باشد، ابعاد آن را طوری بباید که بیشترین نوردهی را داشته باشد.

پاسخ:



$$\begin{aligned} \text{محیط} &= \frac{4}{5} = 2h + 2r + \frac{1}{2}(2\pi r) \\ \Rightarrow 2h + 2r + \pi r &= \frac{9}{2} \Rightarrow h = \frac{9}{4} - r - \frac{\pi r}{2} \\ \text{مساحت نیم‌دایره} + \text{مساحت مستطیل} &= \text{مساحت پنجره} \\ S &= 2r \times h + \frac{1}{2}(\pi r^2) = 2r \times \left(\frac{9}{4} - r - \frac{\pi r}{2}\right) + \frac{1}{2}\pi r^2 \\ \Rightarrow S &= -\left(\frac{\pi + 4}{2}\right)r^2 + \frac{9}{2}r \\ \Rightarrow S' &= -2\left(\frac{\pi + 4}{2}\right)r + \frac{9}{2} = 0 \Rightarrow r = \frac{-4/5}{-(\pi + 4)} = \frac{4/5}{\pi + 4} \end{aligned}$$

	$\frac{4/5}{\pi + 4}$
$S'_{(r)}$	+
$S_{(r)}$	↗ max ↘

۱۸- کشاورزی می‌خواهد دور یک مزرعه مستطیل شکل به مساحت ثابت 10000 متر مربع را دیوار کشی کند. هزینه هر متر دیوارهای شمالی و جنوبی 2 میلیون تومان و هزینه هر متر دیوارهای شرقی و غربی 8 میلیون تومان است.

(الف) هزینه مورد نیاز برای انجام این کار را به صورت یک تابع بنویسید.

(ب) ابعاد مزرعه چقدر باشد تا هزینه دیوار کشی به حداقل مقدار ممکن برسد؟

پاسخ:
(الف)

$$xy = 10000 \rightarrow y = \frac{10000}{x}$$

$$p(x) = 2(2000000x) + 2(8000000 \times \frac{10000}{x}) = \frac{4 \times 10^6 (x^2 + 40000)}{x}$$

(ب)

$$\begin{aligned} p'(x) &= 4 \times 10^6 \left(\frac{2x^2 - x^2 - 10000}{x^2} \right) = 4 \times 10^6 \left(\frac{x^2 - 40000}{x} \right) \\ \frac{p'(x)=0}{\rightarrow 4 \times 10^6 \left(\frac{x^2 - 40000}{x^2} \right) = 0} &\rightarrow x^2 - 40000 = 0 \rightarrow x^2 = 40000 \rightarrow x = 200 \\ x = 200 \rightarrow y = \frac{10000}{x} &\rightarrow y = 50 \end{aligned}$$





۱۹- الف) می خواهیم کنار رودخانه یک محوطه به شکل مثلث متساوی الساقین را نرده کشی کنیم. اگر تنها هزینه ۱۰۰ متر نرده را در اختیار داشته باشیم در این صورت بیشترین مساحت ممکن برای این مثلث چقدر خواهد بود؟

ب) بدون استفاده از مشتق نیز این مسئله را حل کنید.

پاسخ: الف)

$$h^2 + x^2 = 50^2 \rightarrow h = \sqrt{2500 - x^2}$$

$$S(x) = \frac{1}{2} \times 2x \times h = x(\sqrt{2500 - x^2})$$


$$D = [0 / 50]$$

$$S'(x) = \sqrt{2500 - x^2} + x \times \frac{-2x}{2\sqrt{2500 - x^2}} = \frac{2500 - x^2 - x^2}{\sqrt{2500 - x^2}} = \frac{2500 - 2x^2}{\sqrt{2500 - x^2}}$$

$$\frac{S'(x) = 0}{2500 - 2x^2 = 0} \rightarrow x^2 = \frac{2500}{2} = 1250 \rightarrow x = \sqrt{1250} = 25\sqrt{2}$$

$$h = \sqrt{2500 - x^2} \rightarrow h = \sqrt{2500 - 1250} = \sqrt{1250} \rightarrow h = 25\sqrt{2}$$

$$S(x) = (25\sqrt{2})(\sqrt{2500 - 1250}) = 625 \times 2 = 1250$$



ب) با توجه به $S = \frac{1}{2} \times 50 \times 50 \times \sin \theta$ بیشترین مساحت وقتی است $\sin \theta = 1$ باشد پس $\theta = 90^\circ$ می شود. پس خواهیم داشت:

$$S = \frac{1}{2} \times 50 \times 50 \times \sin \theta = \frac{1}{2} \times 50 \times 50 \times 1 = 1250$$

۲۰- ابعاد مستطیلی با بیشترین مساحت را تعیین کنید که دو رأس آن روی محور X ها و دو رأس دیگر بالای محور X ها

روی سهمی $y = 12 - x^2$ باشند.


پاسخ:

$$S(x) = 2xy = 2x(12 - x^2) = 24x - 2x^3$$

$$S'(x) = 24 - 6x^2 \quad \frac{S'(x)}{24 - 6x^2 = 0} \rightarrow x^2 = 4 \rightarrow x = 2$$

$$y = 12 - x^2 \rightarrow y = 12 - 4 = 8$$

طول مستطیل برابر ۸ و عرض آن برابر ۲ است.



۲۱- هر صفحه مستطیل شکل از یک کتاب جیبی، شامل یک متن ثابت ۳۲cm² خواهد بود. هنگام طراحی قطع این کتاب لازم است حاشیه های بالا و پایین هر صفحه ۲cm و حاشیه های کناری هر کدام یک سانتی متر در نظر گرفته شوند. ابعاد صفحه را طوری تعیین کنید که مساحت هر صفحه از کتاب کمترین مقدار ممکن باشد.


پاسخ:

$$S(x) = (x + 2)(y + 4) = xy + 4x + 2y + 8$$

$$\frac{xy = 32}{x} \rightarrow S(x) = 4x + 2y + 40 - \frac{32}{x} \rightarrow S(x) = 4x + \frac{64}{x} + 40$$

$$S'(x) = 4 - \frac{64}{x^2} = \frac{4x^2 - 64}{x^2} \quad \frac{S'(x) = 0}{4x^2 - 64 = 0} \rightarrow x^2 = 16 \rightarrow x = 4$$

$$\frac{y' = \frac{32}{x}}{x} \rightarrow y = \frac{32}{4} = 8$$



ابعاد هرجه برابر است با:




- ۲۲- آروین می خواهد به ایستگاه اتوبوسی برود که در ۲۰۰ متری غرب و ۶۰ متری شمال موقعیت فعلی او بعد از پارک قرار دارد. او می تواند با سرعت ۳ متر بر ثانیه از پیاده رو کنار پارک به سمت غرب برود. همچنین می تواند از درون پارک و تنها با سرعت $\frac{m}{s}$ عبور کند. با توجه به شکل، مقدار x را طوری بیابید که او در کمترین زمان ممکن به ایستگاه برسد.

پاسخ:

می دانیم زمان را می توانیم از فرمول $t = \frac{x}{V}$ بدست آوریم. پس:


$$\begin{aligned} t &= t_1 + t_2 \quad , \quad t_1 = \frac{x_1}{v_1} = \frac{200-x}{3} \quad , \quad t_2 = \frac{x_2}{v_2} = \frac{\sqrt{3600+x^2}}{2} \\ \Rightarrow t &= \frac{200-x}{3} + \frac{\sqrt{3600+x^2}}{2} = \frac{1}{6}(400-2x+3\sqrt{3600+x^2}) \\ t' &= \frac{1}{6}(-2+3\times\frac{x}{\sqrt{3600+x^2}}) \quad , \quad t'=0 \Rightarrow 2 = \frac{3x}{\sqrt{3600+x^2}} \Rightarrow 2\sqrt{3600+x^2} = 3x \\ \rightarrow & 14400+4x^2 = 9x^2 \rightarrow 5x^2 = 14400 \Rightarrow x^2 = 2880 \\ \Rightarrow t &= \frac{1}{6}(400-2\times24\sqrt{5}+3\sqrt{3600+2880}) = 100 \end{aligned}$$

ایستگاه اتوبوس



ایران توشه

توشه‌ای برای موفقیت



$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

- ۱- در حالت‌های زیر، معادله‌ی دایره را بنویسید.
الف) دایره‌ای به مرکز مبدأ مختصات و شعاع ۲.

ب) دایره‌ای به مرکز مبدأ مختصات و شعاع r .

پ) دایره‌ای که از نقطه‌ی $(-3, 1)$ بگذرد و مرکز آن $(2, -1)$ باشد.

$$r = \sqrt{(2-1)^2 + (-1+3)^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5} \rightarrow (x-1)^2 + (y+3)^2 = 5$$

- ۲- با تکمیل جدول، وضعیت هر نقطه را نسبت به دایره مشخص کنید.

معادله دایره
$(x+2)^2 + (y-3)^2 = 4$

شعاع و مختصات مرکز دایره
$O(-2, 3), r = 2$

نقاط	$A(1, 1)$	$B(0, 3)$
$C(-2, 4)$		

درون دایره روی دایره بیرون دایره

$$(1+2)^2 + (1-3)^2 > 4(0+2)^2 + (3-3)^2 = 4(-2+2)^2 + (4+3)^2 < 4$$


$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9 \quad \boxed{\text{دایره به مرکز } (1, -2) \text{ و شعاع } 3}$$

روی دایره

$$\boxed{\text{بیرون دایره}} \quad \boxed{\text{بیرون دایره}} \quad (0-1)^2 + (3+2)^2 > 9(-2-1)^2 + (4+2)^2 > 9$$

- ۳- اگر معادله‌ی دایره‌ای به شکل $(x+1)^2 + y^2 = 4$ باشد:

الف) مختصات مرکز دایره و اندازه‌ی شعاع دایره را بنویسید.



ب) مختصات نقاط تقاطع این داره را با محورهای مختصات پیدا کنید.

$$x = 0 \rightarrow 1^2 + y^2 = 4 \rightarrow y^2 = 3 \rightarrow y = \pm\sqrt{3} \quad N(0, -\sqrt{3}), M(0, \sqrt{3})$$



$$y = 0 \rightarrow (x+1)^2 = 4 \rightarrow \begin{cases} x+1 = 2 \rightarrow x = 1 \\ x+1 = -2 \rightarrow x+1 = -3 \end{cases} \quad Q(1, 0), P(-3, 0)$$

پ) شکل این دایره را رسم کنید و صحت پاسخ‌های خود را به کمک شکل بررسی کنید.

- ۴- معادله‌ی دایره‌های زیر را بنویسید:

$$r = 4, O(0, 3)$$

$$x^2 + (y-3)^2 = 16$$



$$r = 3, O(5, -4)$$

$$(x-5)^2 + (y+4)^2 = 9$$




۵- معادله‌ی گسترده‌ی دایره‌ای به شکل $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0$ است. مختصات مرکز این دایره و شعاع آن را پیدا کنید و معادله‌ی دایره را به شکل استاندارد بنویسید.

$$\begin{aligned} O & \left| \begin{array}{l} \frac{-a}{2} = -\frac{-2}{2} = 1 \\ \frac{-b}{2} = -\frac{-6}{2} = 3 \end{array} \right. \\ r &= \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2 - 4c} = \frac{1}{2} \sqrt{4 + 36 - 24} = \frac{1}{2} \sqrt{16} = 2 \\ x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 &= 0 \rightarrow \underbrace{x^2 - 2x + 1}_{(x-1)^2} + \underbrace{y^2 - 6y + 9}_{(y-3)^2} = 10 - 6 \\ (x-1)^2 + (y-3)^2 &= 4 \end{aligned}$$

۶- در هر دایره مختصات مرکز دایره و اندازه‌ی شعاع آن را پیدا کنید، محل تقاطع هر دایره را با محورهای مختصات در صورت وجود مشخص کنید و درستی پاسخ خود را به کمک رسم دایره بررسی کنید.

$$\begin{aligned} \text{الف) } x^2 + y^2 - 6x + 2y + 1 &= 0 \\ r &= \frac{1}{2} \sqrt{36 + 4 - 4} = 3 \\ O & \left| \begin{array}{l} 3 \\ -1 \end{array} \right. \\ \text{ب) } x^2 + (y+2)^2 - 4 &= 0 \end{aligned}$$



$$\text{الف) } x = 0 \quad y^2 + 2y + 1 = 0 \rightarrow y = -1 \rightarrow A \left| \begin{array}{l} 0 \\ -1 \end{array} \right. \text{ بر محور } y \text{ مماس است.}$$

$$\text{ب) } y = 0 \quad x^2 - 6x + 1 = 0 \rightarrow x_1, x_2 = 3 \pm \sqrt{2} > 0 \quad \text{دایره در سمت راست مبدأ محور } x \text{ ها، اقطع می‌کند.}$$

$$\begin{aligned} x = 0 \quad (y+3)^2 = 4 &\rightarrow y = -1, y = -5 \quad \text{پس محور } x \text{ ها را اقطع نمی‌کند.} \\ y = 0 \quad x^2 + 9 - 4 &= 0 \rightarrow x^2 = -5 \end{aligned}$$

توشه‌ای برای موفقیت

۷- در حالت‌های زیر معادله‌ی دایره را بنویسید:

الف) دایره‌ای که از مبدأ مختصات بگذرد و مرکز آن $(1, -2)$ باشد.

$$OC = \sqrt{4+1} = \sqrt{5} = r \quad (x-2)^2 + (y+1)^2 = 5$$

ب) دایره‌ای که مرکز آن $(2, 3)$ و نقطه‌ی $(-3, -9)$ نقطه‌ای روی آن باشد.

$$CA = \sqrt{(2+3)^2 + (3+9)^2} = 13 = r \quad (x-2)^2 + (y-3)^2 = 169$$

پ) دایره‌ای که نقاط $(0, 3)$ و $(-4, -1)$ دو سر یکی از قطرهای آن باشند.

$$C \left[\frac{0+(-4)}{2} = -2, \frac{-1+3}{2} = 1 \right] \quad \text{وسط دو نقطه}$$

$$2r = \sqrt{(-4-0)^2 + (-1-3)^2} = 4\sqrt{2} \rightarrow r = 2\sqrt{2}$$

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 = 8$$

وسط دو قطر برابر مرکز دایره است.

فاصله دو نقطه برابر قطر دایره است.



-۸- وضعیت نقاط $(1, 0)$, $(-1, -2)$ و $(0, 5)$ را نسبت به دایره $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ مشخص کنید.

لکنه: اگر زمانی که نقطه را در معادله دایره صدق می‌دهیم جواب مثبت شود یعنی نقطه قارچ دایره است.

$P(1, 0) = 1 + 0 - 2 + 0 + 1 = 0$ روی دایره $P(0, 5) = 0 + 25 - 2 + 20 + 1 > 0$ قارچ دایره است.

$P(-1, -2) = 1 + 4 + 2 - 4 + 1 = 0$ روی دایره $P(2, 3) = 4 + 9 - 8 + 2 + 1 = 10 > 0$ قارچ دایره است.

-۹- معادله گسترده‌ی یک دایره به شکل $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 8 = 0$ است. مختصات مرکز دایره و اندازه‌ی شعاع آن را پیدا کنید و معادله‌ی آن را به شکل استاندارد بنویسید.

$$O \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad r = \frac{1}{2} \sqrt{4 + 4 + 32} = \sqrt{10} \quad (x+1)^2 + (y+1)^2 = 10$$


-۱۰- در موارد زیر وضعیت خط و دایره را نسبت به هم مشخص کنید.

الف) دایره $x^2 + y^2 + 2x + 2y - 1 = 0$ و خط $x + y = 1$

$$x^2 + y^2 + 2x + 2y - 1 = 0 \rightarrow \underbrace{x^2 + 2x + 1}_{(x+1)^2} + \underbrace{y^2 + 2y + 1}_{(y+1)^2} = \underbrace{1}_{(\sqrt{2})^2}$$

$$O \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad r = \sqrt{2} \quad d = \frac{|-1-1-1|}{\sqrt{1+1}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \Rightarrow d > r$$


خط و دایره نقطه مشترک ندارند



ب) دایره $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 4$ و خط $y = -1$

$$O \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} \quad r = 2 \quad d = \frac{|-3+1|}{\sqrt{0+1}} = \frac{2}{1} = 2 \Rightarrow d = r$$


خط بر دایره مماس است.



-۱۱- معادله دایره‌ای را بنویسید که بر خط $3x + 4y - 1 = 0$ مماس بوده و مرکز آن $C(1, 2)$ باشد.

پون خط بر دایره مماس است، پس فاصله نقطه تا خط برابر شعاع دایره است.

$$d = \frac{|3+8-1|}{\sqrt{9+16}} = \frac{10}{5} = 2 \quad (x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$$




-۱۲- مرکز دایره‌ای، نقطه‌ی $O(2, -3)$ است. این دایره روی خط $3x - 4y + 0 = 0$ وتری به طول ۶ جدا می‌کند. معادله‌ی این دایره را بنویسید.

$$d = \frac{|3(2) - 4(-3) + 2|}{\sqrt{9+16}} = \frac{20}{5} = 4$$

$$\Delta OAH: r^2 = 4^2 + 3^2 = 25 \rightarrow r = 5$$

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$$





۱۳- وضع خط های زیر را نسبت به دایره مشخص کنید.

$$\text{الف) } 6x + 4y = 0, x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7 = 0$$

$$O \left| \begin{array}{l} r = \frac{1}{2} \sqrt{16+16-28} = 1 \\ d = \frac{|6(2)+4(2)|}{\sqrt{36+16}} = \frac{20}{\sqrt{52}} = \frac{10\sqrt{13}}{13} \end{array} \right.$$

$$d = \frac{10\sqrt{13}}{13} > r = 1$$


فقط خارج دایره قرار دارد.

$$\text{ب) } y = -x - 2, x^2 + y^2 = 2$$

$$O \left| \begin{array}{l} r = \sqrt{2} \\ x + y + 2 = 0 \quad d = \frac{|0+0+2|}{\sqrt{1+1}} = \sqrt{2} \quad d = r = \sqrt{2} \end{array} \right.$$

$$\text{فقط بر دایره مماس است.}$$

۱۴- اگر بدانیم خط L در نقطه $(3, 4)$ بر دایره‌ای به مرکز مبدأ مختصات مماس است، معادلهی خط مماس چیست؟



$$OA = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 = r$$

$$x^2 + y^2 = 25$$

$$m_{OA} = \frac{4-0}{3-0} = \frac{4}{3} \rightarrow m' = -\frac{3}{4}$$

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3) \rightarrow 3x + 4y - 25 = 0$$

m' شیب فقط ۱ است.

۱۵- معادلهی دایره‌ای را بنویسید که مرکز آن، نقطه $(0, 3)$ و بر خط $3x - 4y = 3$ مماس باشد.

$$d = \frac{|3(0) - 4(3) - 3|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{15}{5} = 3 = r$$

$$(x - 0)^2 + (y - 3)^2 = 9 \rightarrow x^2 + (y - 3)^2 = 9$$

فاصله نقطه $(0, 3)$ از خط $3x - 4y = 3$ برابر شعاع دایره است.

۱۶- با انجام مراحل زیر، معادلهی دایره‌ای را بنویسید که بر دایره $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$ مماس بیرون و مرکز آن نقطه $O(2, -2)$ باشد:

- مختصات نقطه O' ، مرکز دایره‌ی داده شده عبارت است از:

$$O' \left| \begin{array}{l} -1 \\ 2 \end{array} \right.$$

- اندازهی r' یعنی شعاع دایره داده شده برابر است با:

$$r' = \frac{1}{2} \sqrt{4+16+16} = 3$$

- طول OO' برابر است با:

$$OO' = \sqrt{(2+1)^2 + (-2-2)^2} = 5$$

- شرط اینکه دو دایره مماس بیرونی باشند این است که: $5 = r' + 3$ پس شعاع r' باید برابر ۲ باشد.

- معادلهی دایره مطلوب را با معلوم بودن اندازهی شعاع و مختصات مرکز آن بنویسید:

$$(x - 2)^2 + (y + 2)^2 = 4$$



- ۱۷- برای حالت‌های زیر معادله‌ی دو دایره را بنویسید و پاسخ را با دوستان مقایسه کنید.
 الف) دو دایره هم مرکز باشند.

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = R^2$$

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = R'^2 \quad OO' = 0$$

$$(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 4 \quad x^2 + y^2 = 1$$

ب) دو دایره بیرون هم باشند.


- ۱۸- برای موارد زیر وضعیت دو دایره را نسبت به هم مشخص کنید:

$$x^2 + y^2 + 2x - 4y = 0 \quad x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$$

$$O \left| \begin{array}{l} 1 \\ -2 \end{array} \right. \quad r = \frac{1}{2} \sqrt{4+16} = \sqrt{5}$$

$$O' \left| \begin{array}{l} -1 \\ 2 \end{array} \right. \quad r' = \frac{1}{2} \sqrt{4+16} = \sqrt{5}$$

$$OO' = \sqrt{(1+1)^2 + (-2-2)^2} = 2\sqrt{5} \Rightarrow OO' = r + r' \quad \text{دو دایره مماس قارچند}$$




$$x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0 \quad (x+1)^2 + (y-2)^2 = 1$$

$$O \left| \begin{array}{l} -1 \\ 2 \end{array} \right. \quad r = 1$$

$$O' \left| \begin{array}{l} 1 \\ -2 \end{array} \right. \quad r = \frac{1}{2} \sqrt{4+16-4} = 2$$

$$OO' = \sqrt{(1+1)^2 + (-2-2)^2} = 2\sqrt{5} \Rightarrow OO' > r + r' \quad \text{دو دایره متقاچند}$$



- ۱۹- مشخص کنید در حالت‌های زیر دو دایره نسبت به هم چه وضعی دارند؟

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y = 4 \quad x^2 + y^2 + 2x - 4y = 9 \quad (\text{الف})$$

$$O \left| \begin{array}{l} 1 \\ -2 \end{array} \right. \quad r = \frac{1}{2} \sqrt{4+16+16} = 3$$

$$O' \left| \begin{array}{l} -1 \\ 2 \end{array} \right. \quad r' = \frac{1}{2} \sqrt{4+16+36} = \sqrt{14}$$

$$OO' = \sqrt{(1+1)^2 + (-2-2)^2} = 2\sqrt{5} \Rightarrow r - r' < OO' < r + r' \quad \text{متقارع}$$

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 4 \quad x^2 + (y - 5)^2 = 5 \quad (\text{ب})$$

$$O \left| \begin{array}{l} 2 \\ -2 \end{array} \right. \quad r = \sqrt{4} \quad O' \left| \begin{array}{l} 0 \\ 5 \end{array} \right. \quad r' = \sqrt{5}$$

$$OO' = \sqrt{(2-0)^2 + (-3-5)^2} = 2\sqrt{17} \rightarrow OO' > r + r' \quad \text{متقارب}$$



- ۲۰- معادله‌ی دایره‌ای را بنویسید که مرکز آن $(-1, -1)$ و با دایره‌ی $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 3$ مماس درون باشد.

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 - 6y + 9) = 3 + 4 + 9 \Rightarrow (x-2)^2 + (y-3)^2 = 4^2$$

$$O \left| \begin{array}{l} x=2 \\ y=3 \end{array} \right. \quad O' \left| \begin{array}{l} x=-1 \\ y=-1 \end{array} \right. \quad d = \sqrt{(-1+1)^2 + (-3+3)^2} = \sqrt{9+16} = 5$$

$$d = |r - r'| \rightarrow 5 = |r - 4| \Rightarrow \begin{cases} r - 4 = 5 \rightarrow r = 9 \\ r - 4 = -5 \rightarrow r = -1 \end{cases} \quad (x+1)^2 + (y+1)^2 = 81$$

بیضی

- ۲۱- اگر در یک بیضی داشته باشیم $a = 5$ و $b = 3$ در این صورت فاصله کانونی را محاسبه کنید.

$$\begin{cases} a = 5 \\ b = 3 \end{cases} \rightarrow a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 5^2 = 3^2 + c^2 \rightarrow c = 4$$

$$\text{فاصله کانونی} = 2c = 2 \times 4 = 8$$


باشد:

الف) فاصله کانونی بیضی را پیدا کنید.

$$\begin{cases} 2a = 6 \rightarrow a = 3 \\ 2b = 4 \rightarrow b = 2 \end{cases} \rightarrow a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow c^2 = 3^2 - 2^2 = 5$$

$$\rightarrow c = \sqrt{5} \rightarrow \text{فاصله کانونی} = 2c = 2\sqrt{5}$$

ب) مختصات نقاط دو سر قطر بزرگ و قطر کوچک و همچنین کانون‌های بیضی را بنویسید.



$$\begin{array}{ll} O \left| \begin{array}{l} \alpha = 4 \\ \beta = 5 \end{array} \right. & A \left| \begin{array}{l} \alpha + a = 4 + 3 = 7 \\ \beta = 5 \end{array} \right. \\ A' \left| \begin{array}{l} \alpha - a = 4 - 3 = 1 \\ \beta = 5 \end{array} \right. & , \quad \beta \left| \begin{array}{l} \alpha = 4 \\ \beta + b = 5 + 2 = 7 \end{array} \right. \\ B' \left| \begin{array}{l} \alpha = 4 \\ \beta - b = 5 - 2 = 3 \end{array} \right. & , \quad F \left| \begin{array}{l} \alpha + c = 4 + \sqrt{5} \\ \beta = 5 \end{array} \right. \\ F' \left| \begin{array}{l} \alpha - c = 4 - \sqrt{5} \\ \beta = 5 \end{array} \right. & \end{array}$$

توشه‌ای برای موفقیت

- ۲۳- کانون‌های یک بیضی نقاط $(1, 3)$ و $(-1, -5)$ است.

الف) فاصله کانونی، مختصات مرکز بیضی و معادله قطرهای بزرگ و کوچک بیضی را بنویسید.

$$\begin{cases} F(1, 3) \\ F'(-1, -5) \end{cases} \Rightarrow |FF'| = |3 - (-5)| = 8 = 2c \rightarrow c = 4$$

$$O = \frac{F+F'}{2} \Rightarrow O = \left(\frac{1+(-1)}{2}, \frac{3+(-5)}{2} \right) = (0, -1)$$

$x = 1$: معادله قطر کوچک و $y = -1$: معادله قطر بزرگ

ب) اگر $a = 6$ باشد، اندازه قطر کوچک و خروج از مرکز بیضی را پیدا کنید.

$$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow b^2 = 6^2 - 4^2 = 20 \Rightarrow b = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$\Rightarrow BB' = 4\sqrt{5} \Rightarrow e = \frac{c}{a} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$



- ۲۴- خروج از مرکز یک بیضی افقی $\frac{4}{5}$ ، مرکز آن $(-4, -1)$ و طول قطر کوچک این بیضی ۶ واحد است.
 الف) طول قطر کانونی و فاصله کانونی را محاسبه کنید.

$$e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5} \rightarrow c = \frac{4}{5}a \quad \text{و} \quad 2b = 6 \rightarrow b = 3$$

$$c^2 = a^2 - b^2 \Rightarrow \frac{16}{25}a^2 = a^2 - 9 \rightarrow a^2 = 25 \rightarrow a = 5 \rightarrow c = 4$$

$$\text{طول قطر کانونی} \rightarrow AA' = 2a = 2 \times 5 = 10$$


مختصات نقاط دو سر قطر کوچک و قطر بزرگ و کانون‌های بیضی را پیدا کنید.

$$\begin{array}{l|l} F & -4+4=0 \\ \hline -1 & , F' & -4-4=-8 \\ \hline A & -4+5=1 \\ \hline -1 & , A' & -4-5=-9 \\ \hline B & -4 \\ \hline -1+3=2 & , B' & -1-3=-4 \end{array}$$

- ۲۵- شکل حاصل از دوران حول محور را در حالت‌های زیر مشخص کنید و آن‌ها را با هم مقایسه کنید:


الف) شکل حاصل از دوران مثلث

قائم‌الزاویه حول محور



الف) شکل حاصل از دوران

نیم خط حول محور





- ۲۶- مستطیلی را حول عرض آن دوران داده‌ایم.

الف) شکل حاصل را رسم کنید.

ب) سطح مقطع حاصل از برخورد یک استوانه و یک صفحه در چه حالتی یک مربع است؟



مخازن نفتی در زنجان



$$\sqrt{(طول مستطیل)^2 - \frac{1}{4}(\text{عرض مستطیل})^2} = \text{فاصله صفحه قاطع تا محور دوران} \Rightarrow h = \sqrt{y^2 - \frac{1}{4}x^2}$$

- پ) اگر ابعاد مستطیل، ۳ و ۴ باشد، مساحت سطح مقطع حاصل از برخورد یک صفحه موازی با قاعده این استوانه چقدر است؟

$$r = 4 \rightarrow S = \pi r^2 = \pi(4)^2 = 16\pi$$





ت) در حالت پ، اگر صفحه‌ای عمود بر قاعده استوانه آن را قطع کند، بیشترین مساحت ممکن برای سطح مقطع حاصل قدر است؟

وقتی صفحه از محور بگزیرد بر قاعده عمود باشد همان مساحت مستطیلی است که طول آن دو برابر طول مستطیل و عرض آن، عرض مستطیل یعنی ۳ است.



$$S = 3 \times 8 = 24 \quad \text{مستطیلی به ابعاد ۳ و ۸}$$

۲۷- شکل حاصل از دوران یک مثلث قائم‌الزاویه حول وتر آن چیست؟




دو مفروط با قاعده مشترک

۲۸- در شکل رو به رو می‌خواهیم ذوزنقه قائم‌الزاویه را حول محور دوران دهیم.
الف) حجم شکل حاصل را محاسبه کنید.



$$V - V_1 = \frac{1}{3} \pi (3)^2 \times 6 - \frac{1}{3} \pi (1)^2 \times 2 = \frac{52}{3} \pi$$


ب) سطح مقطع این شکل در برخورد با صفحه‌ای که شامل محور دوران باشد، چیست و مساحت آن چقدر است؟



$$S = \frac{1}{2} (2+6) \times 4 = 16$$

ایران نویس

۲۹- مربعی با ضلع ۳ واحد مطابق شکل رو به رو در فاصله ۲ واحد از یک خط راست قرار دارد.



الف) شکل حاصل از دوران این مربع حول محور داده شده را رسم و حجم آن را محاسبه کنید.


همم شکل - همم استوانه بزرگ - همم استوانه کوچک

$$\pi \times 5^2 \times 3 - \pi \times 2^2 \times 3 = 75\pi - 12\pi = 63\pi$$

ب) سطح مقطع این شکل را در برخورد با صفحه‌ای موازی با قاعده آن توصیف کنید.
سطح مقطع موازی با قاعده یک دایره تو قائم شعاع فار比 ۵ و شعاع دافلی ۲ است.



۳۰- اگر یک لوزی با طول قطرهای ۶ و ۴ حول قطر بزرگ دوران داده شود، حجم شکل حاصل چقدر است؟



$$V = 2 \left(\frac{\pi}{3} \times 2^2 \times 3 \right) = 8\pi$$



ایران توشه

توشه‌ای برای موفقیت






فصل ۷ احتمال

- ۱- دو جعبه داریم. درون یکی از آن‌ها ۱۲ لامپ قرار دارد که ۶ تا از آن‌ها معیوب است و درون جعبه دیگر ۹۶ لامپ قرار دارد که ۴ تا از آن‌ها معیوب‌اند به تصادف جعبه‌ای را انتخاب کرده، یک لامپ از آن بیرون می‌آوریم. چه قدر احتمال دارد لامپ موردنظر معیوب باشد؟

پاسخ:

۴ معیوب و ۹۲ سالم	۶ سالم و ۶ معیوب
-------------------	------------------



$$\frac{1}{2} \times \frac{6}{12} + \frac{1}{2} \times \frac{4}{96} = \frac{48}{192} + \frac{4}{192} = \frac{52}{192} = \frac{13}{48}$$

- ۲- فرض کنید جمعیت یک کشور متشکل از ۲۰ درصد کودک و نوجوان، ۵۰ درصد میانسال و ۳۰ درصد سالمند باشند و شیوع یک بیماری خاص در این دسته‌ها به ترتیب ۳ درصد، ۵ درصد، ۱ درصد باشد. اگر فردی به تصادف از این جامعه انتخاب شود، با چه احتمالی به بیماری موردنظر مبتلا است؟

پاسخ:

$$P(A) = \frac{20}{100}, \quad P(B) = \frac{50}{100}, \quad P(C) = \frac{30}{100}$$

$$P(D|A) = \frac{3}{100}, \quad P(D|B) = \frac{5}{100}, \quad P(D|C) = \frac{1}{100}$$

$$P(D) = P(A) \times P(D|A) + P(B) \times P(D|B) + P(C) \times P(D|C)$$

$$= \frac{20}{100} \times \frac{3}{100} + \frac{50}{100} \times \frac{5}{100} + \frac{30}{100} \times \frac{1}{100} = \frac{6+25+3}{1000} = 0.034 = 3.4\%$$

- ۳- یک سکه را پرتاب می‌کنیم و اگر پشت بیاید ۳ سکه دیگر را با هم پرتاب کنیم. در این آزمایش احتمال این که دقیقاً یک سکه رو ظاهر شود چه قدر است؟

پاسخ:

$$S = (R, PPPP, PPPR, PPRP, PRPP, PRRP, PRPR, PRRR, PPRR)$$

$$A = (R, PPPR, PPRP, PRPP)$$

$$P(A) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{16} = \frac{11}{16}$$



۴- در یک جعبه ۵ ساعت دیواری از نوع A و ۲ تا از نوع B و ۱۵ تا از نوع C وجود دارد. و احتمال این که عمر آنها از ۱۰ سال بیشتر باشد، برای نوع A , B , $\frac{4}{5}$ و برای نوع C , $\frac{9}{10}$ است. به تصادف یک ساعت از کارتون بیرون می‌آوریم. با چه احتمالی عمر این ساعت بیش از ۱۰ سال است؟

پاسخ:

A	۵
B	۲
C	۱۵

$$P(kh | A) = \frac{4}{5}, \quad P(kh | B) = \frac{9}{10}, \quad P(kh | C) = \frac{1}{2}$$

$$P(kh) = P(A) \times P(kh | A) + P(B) \times P(kh | B) + P(C) \times P(kh | C)$$

$$P(kh) = \frac{5}{22} \times \frac{4}{5} + \frac{2}{22} \times \frac{9}{10} + \frac{15}{22} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{11} + \frac{9}{110} + \frac{15}{44} = \frac{40+18+75}{220} = \frac{133}{220}$$

۵- مینا در انتخاب رشته‌ی خود برای تحصیل در دبیرستان بین سه رشته‌ی ریاضی، تجربی و انسانی مردود است. اگر او رشته‌ی ریاضی را انتخاب کند به احتمال $45/0$ ، اگر تجربی را انتخاب کند به احتمال $1/0$ و اگر انسانی را انتخاب کند به احتمال $3/0$ در آزمون ورودی دانشگاه پذیرفته خواهد شد. اگر احتمال این که او رشته‌ی ریاضی را انتخاب کند $1/0$ احتمال این که رشته تجربی را انتخاب کند $6/0$ و احتمال این که رشته انسانی را انتخاب کند $3/0$ باشد، با چه احتمالی در دانشگاه پذیرفته خواهد شد؟

پاسخ:

$$(انسانی | ق) p \times (انسانی) p + (تجربی | ق) p \times (تجربی) p + (ریاضی | ق) p \times (ریاضی) p = (ق) p$$

$$= \frac{1}{10} \times \frac{45}{100} + \frac{6}{10} \times \frac{1}{100} + \frac{3}{10} \times \frac{30}{100} = \frac{45+6+90}{1000} = \frac{195}{1000} = 19.5\%$$

ایران توسل

توشه‌ای برای موفقیت