



سؤالات آزمون نهایی درس: حسابان ۲	رشته: ریاضی فیزیک	تعداد صفحه: ۲	ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح
دوازدهم	تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳	نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و اینترنر داخل کشوری ماه ۱۴۰۳		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir	

ردیف	سؤالات (پاسخ برگ دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است)	نمره
------	--------------------------------------------------------------	------

۰/۵	<p>۱ درست‌ی یا نادرستی عبارات‌های زیر را مشخص کنید.</p> <p>الف) نقطه \circ یک نقطه گوشه‌ای تابع $f(x) = \sqrt[3]{x}$ است.</p> <p>ب) تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & x \geq 1 \\ 2x & x < 1 \end{cases}$ در نقطه ۱ مشتق پذیر است.</p>	
۰/۷۵	<p>۲ جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید.</p> <p>الف) برد تابع $y = \tan x$ با دامنه $\left\{ \frac{\pi}{2}, \pi \right\} - \left[\frac{\pi}{3}, \pi \right]$ برابر است.</p> <p>ب) مشتق دوم تابع $y = \sin x$ در نقطه $x = \frac{\pi}{4}$ برابر است.</p>	
۱	<p>۳ نمودار تابع $f(x)$ در شکل مقابل رسم شده است.</p> <p>الف) نمودار تابع $g(x) = -3f\left(\frac{1}{4}x\right)$ را رسم کنید.</p> <p>ب) مقدار $g(5)$ را به دست آورید.</p> 	
۱	<p>۴ نمودار تابع $f(x) = -(x-2)^3 + 1$ را به کمک نمودار تابع $y = x^3$ رسم کنید و صعودی یا نزولی بودن تابع f را بررسی کنید.</p>	
۰/۵	<p>۵ اگر $\left(\frac{1}{4}\right)^{2x-3} \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{x+1}$ باشد، حدود x را به دست آورید.</p>	
۱	<p>۶ اگر چند جمله‌ای $p(x) = x^2 + a - 2$ بر $x - a$ بخش پذیر باشد، مقدار a را بیابید.</p>	
۱/۲۵	<p>۷ قسمتی از نمودار تابع $f(x) = a \cos bx + c$ به صورت مقابل است، مقادیر a, b, c را بیابید.</p> 	
۱/۲۵	<p>۸ معادله $\cos x(2 \cos x - 7) = 4$ را حل کنید.</p>	

سؤالات آزمون نهایی درس: حسابان ۲	رشته: ریاضی فیزیک	تعداد صفحه: ۲	ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح
دوازدهم	تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳	نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و اینترنر داخل کشوری ماه ۱۴۰۳		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir	

ردیف	سؤالات (پاسخ برگ دارد) (استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است)	نمره
------	--------------------------------------------------------------	------


۹	حاصل حدود زیر را به دست آورید. الف) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-7}{x^5-4x+3}$ ب) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin^2 x + x}{x^2}$	۱/۲۵
۱۰	الف) مجانب های قائم و افقی نمودار تابع $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^3 - 1}$ را به دست آورید. ب) وضعیت نمودار $f(x)$ را در همسایگی مجانب قائم آن نمایش دهید.	۱/۷۵
۱۱	مطابق شکل روبه رو خط d در نقطه $P(1, 3)$ بر نمودار تابع f مماس و در نقطه $Q(2a+1, a)$ آن را قطع می کند. اگر $f'(1) = -1$ مقدار a را بیابید.	۱
۱۲	مشتق پذیری تابع $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 4}$ را در نقطه $x = 2$ با استفاده از تعریف مشتق بررسی کنید.	۱
۱۳	مشتق توابع زیر را به دست آورید. (ساده کردن الزامی نیست) الف) $f(x) = \frac{\sqrt{x} - 5x}{x - 3}$ ب) $g(x) = (\cos^3 x)(\tan x)$	۲
۱۴	تابع $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x + 1$ مفروض است. در نقطه $x = a$ ، آهنگ تغییر لحظه ای تابع کمتر از آهنگ تغییر متوسط آن در بازه $[0, 3]$ است، محدوده a را بیابید.	۱/۲۵
۱۵	نمودار تابع $f(x) = x^3 + ax + b$ به صورت مقابل است. مقادیر a و b را بیابید.	۱
۱۶	یک مستطیل در یک نیم دایره محاط شده است. اگر شعاع دایره ۲ سانتی متر باشد، طول و عرض مستطیل را طوری به دست آورید که مساحت آن بیشترین مقدار ممکن باشد.	۱/۵
۱۷	جدول رفتار و نمودار تابع $f(x) = (x+1)(x-2)^2$ را رسم کنید.	۲
۲۰	صفحه ۲ از ۲	جمع نمره

رشته: ریاضی و فیزیک		راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: حسابان ۲	
مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح	تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳	دوازدهم
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir		دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و اینترگر داخل و خارج از کشوری ماه ۱۴۰۳	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
------	---------------	------

۱	الف) نادرست (۰/۲۵) (صفحه ۸۹) ب) نادرست (۰/۲۵) (صفحه ۱۰۰)	۰/۵
۲	الف) $(0, \sqrt{3}) - \mathbb{R}$ یا $(-\infty, 0] \cup [\sqrt{3}, +\infty)$ (۰/۵) (صفحه ۳۲) ب) ۱ (۰/۲۵) (صفحه ۱۰۱)	۰/۷۵
۳	روش اول: رسم هر مرحله (۰/۲۵) نمره تعلق گیرد. روش دوم: (انتقال نقاط) ب) $g(5) = -6$ (۰/۲۵) (صفحه ۱۰)	۱
۴	به رسم نمودار (انتقال افقی) (۰/۲۵)، انتقال عمودی (۰/۲۵) و قرینه‌یابی (۰/۲۵) نمره تعلق گیرد. $f(x)$ اکیدا نزولی (یا نزولی) است. (۰/۲۵) (صفحه ۲۱)	۱
۵	(صفحه ۲۲)	۰/۵
۶	(صفحه ۱۹)	۱

رشته: ریاضی و فیزیک		راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: حسابان ۲	
مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح	تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳	دوازدهم
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir		دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و اینترگر داخل و خارج از کشوری ماه ۱۴۰۳	
ردیف	راهنمای تصحیح		نمره


۱/۲۵	$T = 4\pi \Rightarrow \frac{2\pi}{ b } = 4\pi \Rightarrow b = \frac{1}{2} \quad (0/25)$ $f(\pi) = -1 \Rightarrow \underbrace{a \cos(b\pi) + c = -1}_{0/25} \xrightarrow{ b =\frac{1}{2}} a \times 0 + c = -1 \Rightarrow c = -1 \quad (0/25)$ $\max = 2 \Rightarrow a + c = 2 \xrightarrow{c=-1} a = 3 \quad (0/25) \xrightarrow{a>0} a = 3 \quad (0/25) \quad (\text{روش اول محاسبه } a)$ $f(0) = 2 \Rightarrow a + c = 2 \xrightarrow{c=-1} a = 3 \quad (0/5) \quad (\text{روش دوم محاسبه } a) \quad (\text{صفحه ۲۸})$	۷
۱/۲۵	$\cos x (2 \cos x - 7) = 4 \Rightarrow \underbrace{2 \cos^2 x - 7 \cos x - 4 = 0}_{0/25} \Rightarrow \begin{cases} \cos x = 4 \times \quad (0/25) \\ \cos x = -\frac{1}{2} \quad (0/25) \end{cases}$ $\underbrace{\cos x = \cos \frac{2\pi}{3}}_{0/25} \Rightarrow x = 2k\pi \pm \left(\frac{2\pi}{3}\right) \quad (0/25) \quad (\text{صفحه ۴۱})$	۸
۱/۲۵	$\text{الف) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-7}{x^5 - 4x + 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^4} = 0 \quad (0/25) \quad (\text{صفحه ۶۶})$ $\text{ب) } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin^2 x + x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin^2 x}{x^2} + \frac{1}{x} = 1 + \frac{1}{0^-} = 1 - \infty = -\infty \quad (0/25) \quad (\text{صفحه ۵۴})$	۹
۱/۷۵	<p>الف) خط ۱ مجانب قائم است (۰/۲۵) زیرا:</p> $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 1}{x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{0^-} = -\infty \quad (0/25) \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 1}{x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{0^+} = +\infty \quad (0/25)$ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + 1}{x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^3} = 0 \quad (0/25)$ <p>ب) پس خط ۰ مجانب افقی است. (۰/۲۵) (صفحه ۶۹)</p> <p>(ب) (۰/۵) (صفحه ۶۹)</p> 	۱۰


رشته: ریاضی و فیزیک		راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: حسابان ۲	
مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰:۳۰ صبح	تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳	دوازدهم
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir		دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و اینترگر داخل و خارج از کشوری ماه ۱۴۰۳	
ردیف	راهنمای تصحیح		نمره

۱	<p>خط d در نقطه $P(1, 3)$ بر تابع $f(x)$ مماس است، بنابراین شیب خط d برابر -1 است. (۰/۲۵)</p> <p>روش اول: معادله خط d بصورت زیر است:</p> $y - 3 = -1(x - 1) \Rightarrow y = -x + 4 \xrightarrow{Q(2a+1, a) \in d} a = -2a - 1 + 4 \Rightarrow a = 1 \quad (0/25)$ <p>روش دوم:</p> $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{a - 3}{2a + 1 - 1} = -1 \Rightarrow a = 1 \quad (0/25)$ <p>(صفحه ۸۳)</p>	۱۱
۱	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 - 4x + 4} - 0}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{ x - 2 }{x - 2} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x - 2)}{x - 2} = -1 \quad (0/25) \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x - 2}{x - 2} = 1 \quad (0/25) \end{cases}$ <p>پس $f(x)$ در $x = 2$ مشتق پذیر نیست. (۰/۲۵) (صفحه ۸۶)</p>	۱۲
۲	$f'(x) = \frac{\left(\frac{1}{2\sqrt{x}} - 5\right)(x - 3) - (1)(\sqrt{x} - 5x)}{(x - 3)^2}$ <p>الف)</p> $g'(x) = \underbrace{(3(-\sin x) \cos^2 x)(\tan x)}_{0/5} + \underbrace{(\cos^3 x)(1 + \tan^2 x)}_{0/5}$ <p>ب)</p> <p>(صفحه ۱۰۱)</p>	۱۳
۱/۲۵	<p>آهنگ متوسط تغییر در بازه $[0, 3]$: $\frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{-2 - 1}{3} = -1 \quad (0/25)$</p> <p>آهنگ لحظه‌ای تغییر برابر $f'(x) = x^2 - 4$ است.</p> $f'(a) < -1 \Rightarrow a^2 - 4 < -1 \Rightarrow a^2 < 3 \Rightarrow -\sqrt{3} < a < \sqrt{3}$ <p>(صفحه ۱۱۰)</p>	۱۴

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: حسابان ۲		رشته: ریاضی و فیزیک
دوازدهم	تاریخ آزمون: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسالان، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و اینترگر داخل و خارج از کشوری ماه ۱۴۰۳		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir
ردیف	راهنمای تصحیح	
نمره		

۱	$f'(1) = 0 \rightarrow f'(x) = 3x^2 + a \rightarrow 3(1)^2 + a = 0 \Rightarrow a = -3 \quad (0/5)$ $f(1) = 2 \Rightarrow (1)^3 + a(1) + b = 2 \xrightarrow{a=-3} 1 - 3 + b = 2 \Rightarrow b = 4 \quad (0/5)$	۱۵
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

۱/۵	 <p>با توجه به شکل $y^2 + x^2 = 4$ پس $y = \sqrt{4-x^2}$ در نتیجه:</p> $S = 2xy \xrightarrow{y=\sqrt{4-x^2}} S(x) = 2x\sqrt{4-x^2} \Rightarrow S'(x) = 2\sqrt{4-x^2} + \frac{(-2x)}{2\sqrt{4-x^2}}(2x)$ $S'(x) = 0 \rightarrow \frac{2(4-x^2) - 2x^2}{\sqrt{4-x^2}} = 0 \Rightarrow -4x^2 + 8 = 0 \Rightarrow x = \sqrt{2} \Rightarrow 2x = 2\sqrt{2} \Rightarrow y = \sqrt{2}$	۱۶
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

۲	$f'(x) = (x-2)^2 + 2(x-2)(x+1) \xrightarrow{f'(x)=0} x=0, x=2 \quad (0/5)$ $f''(x) = 6x - 6 \xrightarrow{f''(x)=0} x=1 \quad (0/25)$  <table border="1" data-bbox="909 1195 1379 1411"> <tr> <td>f'</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>f''</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f</td> <td></td> <td>↗</td> <td>↘</td> <td>↘</td> <td>↗</td> <td>↗</td> </tr> </table>	f'	+	0	-	-	0	+	f''		-	-	+	+		f		↗	↘	↘	↗	↗	۱۷
f'	+	0	-	-	0	+																	
f''		-	-	+	+																		
f		↗	↘	↘	↗	↗																	

۲۰	جمع نمره	صفحه ۴ از ۴
----	----------	-------------