



بنیاد علمی آموزشی

# سال یازدهم ریاضی

۳ مرداد ۱۴۰۴

دفترچه سؤال

تعداد کل سؤالات جهت پاسخ‌گویی: ۷۰ سؤال نگاه به گذشته (اجباری) + ۶۰ سؤال نگاه به آینده (انتخابی)  
مدت پاسخ‌گویی به آزمون: ۹۵ دقیقه سؤالات نگاه به گذشته (اجباری) + ۸۰ دقیقه سؤالات نگاه به آینده (انتخابی)

| عنوان                   | نام درس    | تعداد سؤال | شماره سؤال | شماره صفحه<br>(دفترچه سؤال) | وقت پیشنهادی<br>(دقیقه) |
|-------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------------|
| نگاه به گذشته (اجباری)  | ریاضی (۱)  | ۱۰         | ۱-۱۰       | ۴-۷                         | ۳۰                      |
|                         |            | ۱۰         | ۱۱-۲۰      |                             |                         |
|                         | هندسه (۱)  | ۱۰         | ۲۱-۳۰      | ۸-۹                         | ۱۵                      |
|                         | فیزیک (۱)  | ۲۰         | ۳۱-۵۰      | ۱۰-۱۳                       | ۳۰                      |
|                         | شیمی (۱)   | ۲۰         | ۵۱-۷۰      | ۱۴-۱۸                       | ۲۰                      |
|                         | مجموع      | ۷۰         | ۱-۷۰       | ۴-۱۸                        | ۹۵                      |
| نگاه به آینده (انتخابی) | حسابان (۱) | ۱۰         | ۷۱-۸۰      | ۱۹-۲۲                       | ۳۰                      |
|                         |            | ۱۰         | ۸۱-۹۰      |                             |                         |
|                         | هندسه (۲)  | ۱۰         | ۹۱-۱۰۰     | ۲۳-۲۴                       | ۱۵                      |
|                         | فیزیک (۲)  | ۱۰         | ۱۰۱-۱۱۰    | ۲۵-۲۶                       | ۱۵                      |
|                         | شیمی (۲)   | ۱۰         | ۱۱۱-۱۲۰    | ۲۷-۳۱                       | ۲۰                      |
|                         |            | ۱۰         | ۱۲۱-۱۳۰    |                             |                         |
|                         | مجموع      | ۶۰         | ۷۱-۱۳۰     | ۱۹-۳۱                       | ۸۰                      |
|                         | جمع کل     | ۱۳۰        | ۱-۱۳۰      | ۴-۳۱                        | ۱۷۵                     |

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن: ۰۲۱-۶۴۶۳



## پدید آورندگان آزمون ۳ مرداد

### سال یازدهم ریاضی

#### طراحان

| نام درس                | نام طراحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ریاضی (۱) و حسابان (۱) | محمد پیمانی - شاهین پروازی - عادل حسینی - میلاد سجادی لاریجانی - مهدی ملارمضانی - سعید علم‌پور - حامد خاکی - میثم بهرامی جویا - مجتبی نادری - احسان غنی‌زاده - مسعود برملا - حمید علیزاده - جواد زنگنه قاسم آبادی - طاهر دادستانی                                                                                                                        |
| هندسه (۱) و (۲)        | حسین حاجیلو - پژمان فرهادیان - امیر محمد کریمی - کیوان دارابی - نصیر محبی‌نژاد - سرژ یقیازاریان تبریزی - امیر هوشنگ خمسه - امیر حسین ابومحبوب - محمد پوراحمدی - محمد ابراهیم تونزنده جانی - میثم بهرامی جویا - ابراهیم نجفی - رضا عباسی اصل                                                                                                              |
| فیزیک (۱) و (۲)        | بابک اسلامی - محمد علی راست‌پیمان - میلاد نقوی - عبدالرضا امینی‌نسب - حسین مخدومی - کاظم منشادی - محسن قندچلر - اسعد حاجی‌زاده - محمد جعفر مفتاح - مصطفی مصطفی‌زاده - افشین مینو - خسرو ارغوانی‌فرد - پوریا علاقه‌مند - علیرضا جباری - زهره آقامحمدی - علیرضا گونه - مهدی شریفی - شادمان ویسی - سینا صالحی - شهرام آموزگار - امیر ستارزاده               |
| شیمی (۱) و (۲)         | امیر حسین طیبی - میر حسن حسینی - ایمان حسین‌زاد - روزبه رضوانی - مجید معین‌السادات - علیرضا اصل فلاح - کیارش معدنی - یاشار باغساری - محمدرضا جمشیدی - فرزاد رضایی - محمد عظیمیان زواره - رسول عابدینی‌زواره - امیر حسین نوروزی - امیر حاتمیان - مسعود جعفری - موسی خیاط‌علیمحمدی - میلاد کرمی - سید رحیم هاشمی‌دهکردی - محمد فلاح‌نژاد - ارسلان عزیززاده |

#### گزینشگران، مسئولین درس و ویراستاران

| نام درس                | گزینشگر و مسئول درس | گروه ویراستاری                                                     | مسئول درس مستندسازی |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ریاضی (۱) و حسابان (۱) | مهدی ملارمضانی      | سپهر متولیان - احسان غنی‌زاده - مهدی بحر کاظمی                     | سمیه اسکندری        |
| هندسه (۱) و (۲)        | امیر محمد کریمی     | گروه مستندسازی: معصومه صنعت‌کار - سیداحسان میرزینلی - سجاد سلیمی   | سجاد سلیمی          |
| فیزیک (۱) و (۲)        | سینا صالحی          | مهدی بحر کاظمی - سپهر متولیان - سجاد محمدنژاد                      | علیرضا همایون‌خواه  |
| شیمی (۱) و (۲)         | ایمان حسین‌نژاد     | گروه مستندسازی: معصومه صنعت‌کار - مهسا محمدنیا - سیداحسان میرزینلی | سمیه اسکندری        |

#### گروه فنی و تولید

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| مدیر گروه                    | بابک اسلامی                                      |
| مسئول دفترچه                 | لیلا نورانی                                      |
| مستندسازی و مطابقت با مصوبات | مدیر گروه: محیا اصغری / مسئول دفترچه: سجاد سلیمی |
| حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی      | فاطمه علی‌یاری                                   |
| نظارت چاپ                    | حمید محمدی                                       |

### بنیاد علمی آموزش قلمچی (وقف عام)

۳۰ دقیقه

ریاضی (۱) - نگاه به گذشته

ریاضی (۱)  
مجموعه، الگو و دنباله  
مثلثات (نسبت‌های  
مثلثاتی)  
صفحه‌های ۱ تا ۳۵

۱- مجموعه  $A$  دارای ۱۴ عضو، مجموعه  $B$  دارای ۱۷ عضو و مجموعه  $A \cap B$  دارای ۵ عضو است. مجموعه

$(A - B) \cup (B - A)$  چند عضو دارد؟


۲۰ (۲)

۱۹ (۱)

۲۲ (۴)

۲۱ (۳)

۲- نمایش مجموعه  $(x^2, 2x) - (3x - 2, +\infty)$  روی محور اعداد حقیقی به صورت زیر است.  $x$  کدام است؟



$\frac{1}{2}$  (۲)

۲ (۱)

۱ (۴)

۴ (۳)

۳- با توجه به مجموعه‌های  $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -11 < 2x - 3 < 3\}$ ،  $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$  و  $C = \{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{3} < x < \frac{a+1}{3}\}$ ، اگر

$(A - B) \cup C = A$  باشد مقدار  $\frac{a+1}{3}$  کدام است؟

۷ (۲)

۳ (۱)

۴ (۴)

۱ (۳)

۴- در یک دنباله حسابی، با جملات مثبت، جمله هشتم، ۱۶ واحد از جمله چهارم بیشتر است. اگر حاصل ضرب این دو جمله برابر ۶۶۵ باشد،

جمله ششم این دنباله کدام است؟

۲۳ (۲)

۲۷ (۱)

۱۹ (۴)

۳۵ (۳)

۵- چندمین جمله از دنباله حسابی و غیر ثابت  $3, -3, a+3, a, \dots$  صفر می‌باشد؟

۲ پنجم


۱ ششم

۴ هفتم

۳ چهارم

محل انجام محاسبات

۶- با توجه به الگوی زیر، در شکل یازدهم، اختلاف دایره‌های توپر و توخالی کدام است؟




(۲) ۶

(۱) ۷

(۴) ۸

(۳) ۵

۷- در مثلث روبه‌رو، حاصل  $3 \sin \hat{B} + 4 \sin \hat{C}$  کدام است؟




(۲) ۴/۸

(۱) ۲/۴

(۴) ۵/۴

(۳) ۲/۸

۸- مساحت شش ضلعی منتظم زیر چقدر است؟




(۲)  $\frac{27\sqrt{3}}{2}$

(۱)  $\frac{9\sqrt{3}}{2}$

(۴)  $\frac{27}{2}$

(۳)  $\frac{9}{2}$

۹- در شکل زیر، اندازه AB کدام است؟ (AC و DB بر خط d عمودند.)



(۱)  $6\sqrt{3}$

(۲)  $4\sqrt{6}$

(۳)  $3\sqrt{6}$

(۴)  $8\sqrt{3}$

۱۰- کدام گزینه نادرست است؟

ایران تونل  
توشیه‌ای برای موفقیت

(۱) مجموعه اعداد گویا در بازه  $(0/2, 0/1)$  نامتناهی است.

(۲) اگر A و B دو مجموعه نامتناهی باشند، آن‌گاه  $A - B$  الزاماً مجموعه‌ای نامتناهی است.

(۳) اگر  $A \subseteq B$  و B مجموعه‌ای متناهی باشد، آن‌گاه A الزاماً مجموعه‌ای متناهی است.

(۴) تعداد عضوهای یک مجموعه نامتناهی را نمی‌توان با یک عدد حسابی بیان کرد.

## ریاضی (۱) - سوالات آشنا

۱۱- کدام یک از مجموعه‌های زیر، مجموعه‌ای متناهی را نشان می‌دهد؟

$$B = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 1 - x < 3\} \quad (۲)$$

$$A = \{x^2 \mid x \in \mathbb{R}, x \leq 5\} \quad (۱)$$

$$D = \{1 - x \mid x \in \mathbb{Z}, x < 4\} \quad (۴)$$

$$C = \{x^3 \mid x \in \mathbb{N}, x \leq 10\} \quad (۳)$$

۱۲- اگر  $n(U) = 50$ ،  $n(B) = 35$ ،  $n(A' \cup B') = 30$  و  $n(A') = 20$  باشند، مقدار  $n(A \cup B)$  کدام است؟

$$40 \quad (۲)$$

$$25 \quad (۱)$$

$$20 \quad (۴)$$

$$45 \quad (۳)$$

۱۳- چند جمله از دنباله با جمله عمومی  $a_n = 3n - 13$ ، منفی است؟

$$(۲) \text{ چهار جمله}$$

$$(۱) \text{ سه جمله}$$

$$(۴) \text{ بی‌شمار}$$

$$(۳) \text{ دو جمله}$$

۱۴- در یک دنباله اعداد،  $a_1 = 1$  و برای هر  $n \geq 2$  داریم:  $a_n = 2a_{n-1} + 1$ ، جمله هشتم این دنباله کدام است؟

$$159 \quad (۲)$$

$$127 \quad (۱)$$

$$255 \quad (۴)$$

$$247 \quad (۳)$$

۱۵- در یک دنباله حسابی،  $t_3 + t_5 = 16$  و  $t_3 - t_5 = -160$  است، قدرنسبت این دنباله کدام است؟

$$-2 \quad (۲)$$

$$2 \quad (۱)$$

$$-5 \quad (۴)$$

$$5 \quad (۳)$$

۱۶- بین دو عدد ۴ و ۲۲۴، سه واسطه هندسی درج کرده‌ایم. جمله سوم این دنباله کدام است؟

$$45 \quad (۲)$$


$$36 \quad (۱)$$

$$63 \quad (۴)$$

$$54 \quad (۳)$$

۱۷- مطابق شکل زیر، شخصی با قد  $۲۰۰\text{ cm}$  در فاصله افقی  $۵\text{ m}$  از یک ساختمان قرار دارد. اگر این شخص با زاویه  $۶۳^\circ$  نسبت به افق، لبه بالای

ساختمان را ببیند، ارتفاع ساختمان چند متر است؟ ( $\tan 63^\circ \approx 2$ )



(۱) ۱۰

(۲) ۱۲

(۳)  $7/5$

(۴)  $4/5$

۱۸- حاصل عبارت  $A = 4 \sin 60^\circ \cos 30^\circ - 3 \tan 45^\circ \sin 30^\circ + \tan^2 60^\circ$  کدام است؟

(۲) -۵

(۱) ۵

(۴)  $-\frac{9}{2}$

(۳)  $\frac{9}{2}$


۱۹- در شکل زیر، مساحت مثلث ABC برابر  $20\sqrt{3}$  است. ضلع AC چند برابر  $\sqrt{3}$  است؟

(۱) ۲

(۲) ۳

(۳) ۴

(۴) ۵




۲۰- در شکل زیر، اگر مساحت مثلث ABC برابر ۲۴ واحد مربع و  $\tan \alpha = \frac{3}{4}$  و AC قطر دایره باشد، مساحت دایره چند واحد مربع است؟

(۱)  $25\pi$

(۲)  $100\pi$

(۳)  $64\pi$

(۴)  $36\pi$



۱۵ دقیقه

هندسه (۱) - نگاه به گذشته

هندسه (۱)

ترسیم‌های هندسی و

استدلال

صفحه‌های ۹ تا ۲۷

۲۱- می‌خواهیم به کمک روش رسم عمودمنصف یک پاره‌خط، از نقطه‌ای خارج یک خط، خطی موازی با آن رسم کنیم.

برای انجام این کار حداقل چند کمان باید رسم کنیم؟

۶ (۴)

۵ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

۲۲- اگر  $x+5$ ،  $2x-2$  و  $x+1$ ، طول اضلاع مثلثی باشند، کدام عدد می‌تواند محیط این مثلث باشد؟

۸ (۲)


۵ (۱)

۱۸ (۴)

۱۰ (۳)

۲۳- در مثلث روبه‌رو می‌خواهیم عمودمنصف ضلع AC را به کمک پرگار و خط‌کش رسم کنیم. دهانه پرگار حداقل چقدر باید باز

باشد؟



۲۹ (۲)

۲۱ (۱)

۱۴/۵ (۴)

۱۰/۵ (۳)

۲۴- در مثلثی به اضلاع ۱،  $\sqrt{2}$  و  $\sqrt{3}$ ، فاصله نقطه همرسی عمودمنصف‌ها از نقطه همرسی ارتفاع‌ها چقدر است؟

$\frac{\sqrt{6}}{2}$  (۲)

$\frac{\sqrt{3}}{4}$  (۱)

$\frac{\sqrt{3}}{2}$  (۴)

$\frac{\sqrt{3}}{3}$  (۳)

۲۵- نقطه‌ای داخل مربع ABCD وجود دارد که از نقاط A و B و نیز ضلع CD به یک فاصله است. مقدار این فاصله چند برابر طول ضلع مربع است؟

$\frac{5}{8}$  (۲)

$\frac{3}{8}$  (۱)

$\frac{3}{5}$  (۴)

$\frac{1}{2}$  (۳)

محل انجام محاسبات

۲۶- نقطه A به فاصله ۱ سانتی متر از خط d قرار دارد. چند نقطه در صفحه یافت می شود که از نقطه A به فاصله ۴ سانتی متر و از خط d به فاصله ۳ سانتی متر باشد؟

(۲) ۲

(۱) ۱

(۴) ۴

(۳) ۳

۲۷- در مثلث متساوی الساقین ABC ( $AB = AC$ )، نیمساز خارجی  $\hat{A}$  و نیمساز داخلی  $\hat{B}$  در نقطه D متقاطع هستند، اگر نیمساز داخلی  $\hat{B}$ ،

ضلع AC را در نقطه E قطع کند، نسبت  $\frac{AD}{AC}$  کدام است؟

(۲)  $\frac{1}{2}$

(۱) ۱

(۴) بین  $\frac{1}{2}$  و ۱

(۳) کوچکتر از  $\frac{1}{2}$

۲۸- در مثلث قائم الزاویه ABC ( $\hat{A} = 90^\circ$ )، AD نیمساز زاویه داخلی A و  $AB < AD < AC$  است. اگر زاویه B در بازه  $(\alpha, \beta)$  قرار داشته

باشد، بیشترین مقدار  $\beta - \alpha$  کدام است؟

(۲)  $22/5^\circ$

(۱)  $15^\circ$

(۴)  $37/5^\circ$

(۳)  $30^\circ$

۲۹- در شکل روبه رو OM و ON عمود منصف اضلاع متناظرشان هستند. اگر  $AB = 8$  و  $AC = 12$  باشد و محیط


چهار ضلعی AMON  $20$  باشد، فاصله C از O چقدر است؟

(۱)  $2\sqrt{13}$

(۲)  $3\sqrt{11}$

(۳)  $4\sqrt{7}$

(۴)  $\sqrt{13}$



۳۰- در شکل زیر، اگر BE و CE نیمسازهای زاویه های  $\hat{B}$  و  $\hat{C}$  باشد و  $AB = 3$ ،  $AE = 6$  و  $CD = 12$  باشد، مساحت مثلث BEC


چقدر است؟

(۱) ۵۴

(۲) ۴۵

(۳) ۹۰

(۴) ۳۶





فیزیک (۱) - نگاه به گذشته

فیزیک (۱)  
فیزیک و اندازه گیری  
فصل ۱  
صفحه های ۱ تا ۲۲

۳۱- چه تعداد از عبارت های زیر نادرست است؟

(الف) مدل ها و نظریه های فیزیکی در طول زمان همواره معتبرند.

(ب) آزمایش و مشاهده در پیشبرد و تکامل علم فیزیک بیش از همه نقش ایفا کرده است.

(پ) ویژگی آزمون پذیری و اصلاح نظریه های فیزیک، نقطه قوت دانش فیزیک است.

(ت) فیزیک پایه و اساس تمام مهندسی ها و فناوری هاست.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۳۲- کودک خردسالی، توپی را از پایین تپه ای به سمت بالا شوت می کند. در بررسی حرکت توپ نادیده گرفتن موارد ذکر شده در کدام گزینه در

مدل سازی فیزیکی این حرکت به درستی بیان شده است؟

(۱) شیب تپه - شکل توپ - مقاومت هوا

(۲) تغییر وزن توپ با ارتفاع - شیب تپه - شکل توپ

(۳) شکل توپ - وزن توپ - مقاومت هوا

(۴) مقاومت هوا - تغییر وزن توپ با ارتفاع - شکل توپ

۳۳- چند مورد از جمله های زیر درست است؟

(الف) یکاهای اندازه گیری باید تغییر نکنند و دارای قابلیت باز تولید باشند.

(ب) هنگام مدل سازی یک پدیده فیزیکی، باید اثرهای جزئی تر را نادیده گرفت.

(پ) دقت اندازه گیری در ابزارهای رقمی (دیجیتال) همواره از دقت اندازه گیری ابزارهای مدرج، بیش تر است.

(ت) در نمادگذاری علمی، هر عدد را به صورت حاصل ضرب عددی بین صفر و یک در توان صحیحی از ۱۰ می نویسیم.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۳۴- کمیت های ذکر شده در کدام گزینه، همگی نرده ای و جزء کمیت های فرعی در SI هستند؟

(۱) جریان الکتریکی - تندی - فشار

(۲) جریان الکتریکی - مقدار ماده - دما

(۳) گرمای ویژه - شتاب - نیرو

(۴) فشار - انرژی - تندی

۳۵- کدام یک از یکاهای SI زیر، با یکای فرعی خود تطابق ندارد؟

$$\frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2} = \text{پاسکال} \quad (۲)$$

$$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} = \text{نیوتون} \quad (۱)$$

$$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3} = \text{وات} \quad (۴)$$

$$\frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}^2} = \text{ژول} \quad (۳)$$

۳۶- کدام گزینه جای خالی را برحسب نمادگذاری علمی به درستی پر می‌کند؟

$$9 \times 10^5 \text{ W} \cdot \mu\text{s} = \boxed{\phantom{000}} \text{ mW} \cdot \text{h}$$

(۱)  $2/5 \times 10^{-3}$

(۲)  $2/5 \times 10^{-1}$

(۳)  $25 \times 10^2$

(۴)  $2/5 \times 10^{-2}$

۳۷- ارتفاع برجی ۱/۰ فرسنگ است. ارتفاع این برج برحسب متر، برابر با کدام گزینه است؟ (هر فرسنگ برابر با ۶۰۰۰ ذرع و هر ذرع برابر با ۱۰۴

سانتی‌متر است.)

(۱) ۶۲۴۰

(۲) ۵۷/۶

(۳) ۷۵۶

(۴) ۶۲۴

۳۸- چه تعداد از یکاهای فرعی زیر، برابر با یکای چگالی در SI می‌باشند؟

$$\left[ \frac{\mu\text{g}}{\text{mL}}, \frac{\text{ton}}{\text{km}^3}, \frac{\text{ng}}{\text{mm}^3} \right]$$

(۱) صفر

(۲) ۱

(۳) ۲

(۴) ۳

۳۹- یک ورزشکار با یک رژیم غذایی و ورزش، در مدت یک ماه  $2/592 \text{ kg}$  از جرم خود را از دست می‌دهد. آهنگ کاهش جرم این ورزشکار در دوره

رژیم غذایی و ورزش، چند  $\frac{\text{pg}}{\mu\text{s}}$  است؟ (هر ماه را ۳۰ شبانه‌روز در نظر بگیرید.)

(۱) ۱۰

(۲)  $10^2$

(۳)  $10^3$

(۴)  $10^4$

۴۰- اگر در رابطه فیزیکی  $\frac{A}{B} = CD + E$ ، کمیت A انرژی، کمیت B زمان و کمیت C فشار و یکای تمامی آن‌ها SI باشد، به ترتیب از راست به

چپ یکای کمیت D و نام کمیت E چیست؟

(۱) توان،  $\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$

(۲) وات،  $\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$

(۳) توان،  $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$

(۴) وات،  $\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$

۴۱- آهنگ ورود آب به یک استخر نیمه پر به ابعاد  $9m \times 8m \times 3m$ ، برابر با  $\frac{22}{5} \frac{cm^3}{ms}$  و آهنگ خروج آب از آن برابر با  $\frac{108}{h}$  است.

این استخر پس از ... ساعت به طور کامل ... می شود.


(۴) ۴، پر

(۳) ۸، خالی

(۲) ۸، پر

(۱) ۴، خالی

۴۲- در شکل های زیر، صفحه نمایش دو ترازوی رقمی و مدرج نشان داده شده است. دقت اندازه گیری ترازوی رقمی چند برابر دقت اندازه گیری ترازوی



مدرج است؟

(۱)  $\frac{1}{250}$

(۲)  $\frac{1}{250}$

(۳)  $\frac{1}{40}$

(۴)  $\frac{1}{40}$

۴۳- اگر ابعاد یک شمش توپُر  $15cm \times 8cm \times 3cm$  و چگالی آن  $15 \frac{g}{cm^3}$  باشد، جرم این شمش چند کیلوگرم است؟

(۴)  $\frac{4}{5}$

(۳)  $4500$

(۲)  $5400$

(۱)  $\frac{5}{4}$

۴۴- در صنعت آبکاری، با استفاده از دانش شیمی یک روکش یکنواخت و نازک فلزی بر روی سطح رسانای دیگری ایجاد می گردد. اگر با استفاده از یک

گرم طلا، یک طرف از یک ورقه مسی نازک به ابعاد  $10cm \times 20cm$  را آبکاری نماییم، ضخامت روکش طلای حاصل چند میکرون خواهد بود؟

$(\rho_{\text{طلا}} = 20 \frac{g}{cm^3})$

(۴) ۵

(۳)  $\frac{5}{2}$

(۲)  $\frac{2}{5}$

(۱)  $\frac{5}{20}$

۴۵- مکعبی توپُر به ضلع  $\ell$  و استوانه ای توخالی به شعاع داخلی  $\frac{\ell}{3}$ ، شعاع خارجی  $\ell$  و ارتفاع  $\frac{2}{3}\ell$  در اختیار داریم. اگر جرم مکعب،  $\frac{1}{4}$  جرم استوانه

باشد، نسبت چگالی استوانه به چگالی مکعب کدام است؟ ( $\pi = 3$ )

(۴) ۱

(۳) ۴

(۲)  $\frac{1}{4}$

(۱)  $\frac{1}{3}$

۴۶- وقتی جرم مایعی را ۶ برابر کنیم، حجم آن  $400 \text{ cm}^3$  تغییر می‌کند. حجم نهایی مایع چند لیتر است؟ (دما ثابت فرض شود).


(۲) ۰/۴۸

(۱) ۴/۸

(۴) ۰/۲۴

(۳) ۲/۴

۴۷- برای دو جسم A و B، نمودار جرم برحسب حجم به صورت زیر است. اگر چگالی جسم B،  $\frac{g}{\text{cm}^3}$  باشد، جرم یک گلوله به حجم  $5 \text{ cm}^3$  از



جنس A چند گرم است؟ (دما ثابت و یکسان فرض شود).

(۱) ۱۰

(۲) ۲۰

(۳) ۳۰

(۴) ۴۰

۴۸- جرم یک استوانه توپر مسی،  $6 \text{ kg}$  و شعاع قاعده آن  $10 \text{ cm}$  می‌باشد. این استوانه را خوب می‌کنیم و از آن کره‌ای به شعاع  $5 \text{ cm}$  در همان

دما می‌سازیم. حجم حفره داخل کره چند سانتی‌متر مکعب است؟ ( $\rho_{\text{مس}} = 9 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$  و  $\pi = 3$ )

(۲) ۲۵۰

(۱) ۱۰۰

(۴) ۵۰۰

(۳) ۴۰۰

۴۹- کره‌ای توپر به جرم یک کیلوگرم، از فلزی به چگالی  $4 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$  ساخته شده است. کره را به آرامی درون ظرفی پر از آب می‌اندازیم و  $300$  گرم آب از

ظرف بیرون می‌ریزد. کدام گزینه صحیح است؟ ( $\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ )

(۱) کره توپر است و حجم آن  $300 \text{ cm}^3$  است.

(۲) کره توپر است و حجم آن  $250 \text{ cm}^3$  است.

(۳) کره توخالی است و حجم حفره داخل آن  $50 \text{ cm}^3$  است.

(۴) کره توخالی است و حجم حفره داخل آن  $250 \text{ cm}^3$  است.

۵۰- اگر  $50 \text{ cm}^3$  از مایع A با چگالی  $1200 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$  را با  $100 \text{ cm}^3$  از مایع B با چگالی  $1800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$  مخلوط کنیم. چگالی مخلوط چند  $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

می‌شود؟ (در اثر مخلوط شدن دو مایع، تغییر حجم رخ نمی‌دهد).

(۲) ۱/۴

(۱) ۱/۳

(۴) ۱/۶

(۳) ۱/۵

۲۰ دقیقه

شیمی (۱) - نگاه به گذشته

شیمی (۱)

کیهان زادگاه عناصر

(از ابتدای فصل تا انتهای نشر)

نور و طیف نشری)

صفحه‌های ۱ تا ۲۳

۵۱- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) پاسخ به پرسش «جهان کنونی چگونه شکل گرفته است؟» در قلمرو علم تجربی می‌گنجد.

(۲) دو فضاییمای وویجر ۱ و ۲ در سال ۱۹۷۷ میلادی برای شناخت بیشتر سامانه خورشیدی، سفر طولانی و تاریخی خود را آغاز کردند.

(۳) اولین عناصر ایجاد شده پس از مهبانگ، عنصرهای H و He بودند که با کاهش دما و گذشت زمان، سحابی‌ها را ایجاد کردند.

(۴) انرژی گرمایی و نور خیره‌کننده خورشید به دلیل تبدیل هلیوم به هیدروژن در واکنش‌های هسته‌ای است.

۵۲- کدام گزینه درباره مقایسه هشت عنصر فراوان‌تر سیاره‌های زمین و مشتری درست است؟

(۱) در سیاره زمین برخلاف سیاره مشتری، عنصر نافلزی وجود ندارد.

(۲) گوگرد و اکسیژن در هر دو سیاره زمین و مشتری یافت می‌شوند که درصد فراوانی آن‌ها در سیاره مشتری بیشتر است.

(۳) از بین دو سیاره زمین و مشتری، سیاره بزرگ‌تر عمدتاً از گاز تشکیل شده است.

(۴) تفاوت درصد فراوانی دو عنصر فراوان‌تر سیاره مشتری، کمتر از این تفاوت در سیاره زمین است.

۵۳- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) انسان اولیه با نگاه به آسمان و مشاهده ستارگان در پی فهم نظام و قانونمندی در آسمان بوده است.

(۲) نوع و میزان فراوانی عنصرها در دو سیاره زمین و مشتری متفاوت است.

(۳) وویجر ۱ و ۲ مأموریت داشتند شناسنامه فیزیکی و شیمیایی را از همه سیاره‌های سامانه خورشیدی تهیه کنند و به زمین بفرستند.

(۴) با بررسی نوع و مقدار عنصرهای سازنده برخی سیاره‌های سامانه خورشیدی و مقایسه آن با عنصرهای سازنده خورشید می‌توان به درک

بهتری از چگونگی تشکیل عنصرها دست یافت.

۵۴- کدام گزینه در رابطه با دومین عنصر گروه دوم جدول تناوبی درست است؟

(۱) دارای سه ایزوتوپ است که فراوانی ایزوتوپ با عدد جرمی ۲۴ از دو ایزوتوپ دیگر آن کمتر است.

(۲) در پایدارترین ایزوتوپ آن شمار پروتون‌ها با شمار نوترون‌ها برابر است.

(۳) واکنش‌پذیری ایزوتوپ با عدد جرمی ۲۶، با گاز کلر در شرایط یکسان بیشتر از این خصلت در دو ایزوتوپ دیگر در واکنش با گاز کلر است.

(۴) برای جداسازی ایزوتوپ‌های آن از یکدیگر، روش‌های شیمیایی مناسب‌تر از روش‌های فیزیکی است.

۵۵- تفاوت مجموع ذره‌های زیراتمی در  ${}^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$  و  ${}^{31}_{15}\text{P}^{3-}$  چند برابر شمار ذره‌های زیراتمی در پایدارترین رادیوایزوتوپ هیدروژن است؟

(۲) ۸/۲۵

(۱) ۷/۵

(۴) ۱۱

(۳) ۱۰

۵۶- همه گزینه‌های زیر درست هستند، به جز ...

(۱) همه ایزوتوپ‌های ناپایدار هیدروژن، ساختگی نیستند ولی تمام ایزوتوپ‌های ساختگی هیدروژن، ناپایدارند.

(۲) در همه ایزوتوپ‌های ناپایدار هیدروژن، رابطه  $n \geq 1/\Delta p$  برقرار است.

(۳) با افزایش عدد جرمی در ایزوتوپ‌های ناپایدار هیدروژن، نیم‌عمر همواره کاهش می‌یابد.

(۴) تعداد ایزوتوپ‌های طبیعی هیدروژن با تعداد ایزوتوپ‌های طبیعی منیزیم برابر است.

۵۷- تعداد الکترون‌های یون  $X^+$  برابر ۷۹ است. اگر تعداد نوترون‌های اتم  $X$ ،  $1/5$  برابر تعداد پروتون‌های آن باشد، عدد جرمی  $X$  کدام است؟

( $X$  نماد شیمیایی عنصری فرضی است.)

(۲) ۱۹۸

(۱) ۲۰۰

(۴) ۱۹۴

(۳) ۱۹۶

۵۸- تفاوت شمار الکترون‌ها و نوترون‌ها در یون  ${}^{92}_{42}\text{A}^{4+}$ ،  $1/6$  برابر تفاوت شمار پروتون‌ها و نوترون‌ها در اتم  ${}^9\text{A}$  است. شمار نوترون‌های

موجود در هر اتم  ${}^9\text{A}$ ، چند برابر شمار نوترون‌ها در هر اتم از ایزوتوپ طبیعی هیدروژن با کمترین فراوانی خواهد بود؟

(۲) ۲۵

(۱) ۲۴

(۴) ۲۷

(۳) ۲۶

۵۹- کدام گزینه درست است؟

(۱) به تقریب ۲۲ درصد از کل عناصر شناخته شده، ساختگی هستند.

(۲) از یون تکنسیم برای درمان بیماری‌های غده تیروئید استفاده می‌شود.

(۳) اورانیم شناخته شده‌ترین فلز پرتوزایی است که ایزوتوپ‌های آن به عنوان سوخت در راکتور اتمی استفاده می‌شوند.

(۴) دود سیگار و قلیان مقدار اندکی مواد پرتوزا دارد. از این رو اغلب افرادی که به سرطان دچار می‌شوند، سیگاری نیستند.

۶۰- کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) تکنسیم نخستین عنصر ساخت بشر است که نیم عمر آن کم بوده و نمی توان آن را برای مدت طولانی ذخیره کرد.
- (۲) در روش تشخیص سرطان به وسیله گلوکز نشان دار، در محل توده های سرطانی هر دو نوع گلوکز معمولی و نشان دار مشاهده می شود.
- (۳) مهم ترین مرحله از چرخه تولید سوخت هسته ای، غنی سازی ایزوتوپی است.
- (۴) اغلب هسته هایی که نسبت شمار پروتون ها به نوترون های آن ها برابر یا کم تر از  $\frac{2}{3}$  باشد، ناپایدارند.

۶۱- اختلاف شمار عناصر با نماد شیمیایی دو حرفی و عناصر با نماد شیمیایی یک حرفی در دوره چهارم جدول دوره ای کدام است؟

(۲) ۱۳

(۱) ۱۴

(۴) ۱۱

(۳) ۱۲

۶۲- کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) دانشمندان همواره در پی یافتن سنجه ای مناسب و در دسترس برای اندازه گیری جرم اتم ها بوده اند.
- (۲) جرم پروتون و نوترون در حدود ۱ amu و جرم الکترون حدود  $9.1 \times 10^{-31}$  amu است.
- (۳) در نمادهای  ${}^1_0e$  و  ${}^1_1p$ ، عدد بالایی جرم نسبی ذره را نشان می دهد.
- (۴) جرم اتمی میانگین هیدروژن اندکی از جرم پروتون بیشتر است.

۶۳- کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) نسبت شمار ایزوتوپ های طبیعی منیزیم به ایزوتوپ های طبیعی لیتیم برابر  $\frac{1}{5}$  است.
- (۲) ایزوتوپی از منیزیم که شمار الکترون ها و نوترون های آن یکسان است، درصد فراوانی بیش تری دارد.
- (۳) اگر از هر ۶۰ اتم X که دارای دو ایزوتوپ است، تعداد ۴۵ اتم  ${}^aX$  باشد، درصد فراوانی  ${}^bX$  برابر ۲۵ درصد خواهد بود.
- (۴) فراوانی ایزوتوپی از اورانیم ( ${}^{235}U$ ) که دارای ۱۴۶ نوترون است، در مخلوط طبیعی از ۷٪ درصد کمتر است و اغلب به عنوان سوخت در راکتورهای اتمی کاربرد دارد.



۶۴- کدام موارد از عبارت‌های زیر درست هستند؟

(الف) برای تعیین جرم اتم‌ها از یک مقیاس جرم نسبی استفاده می‌شود.

(ب) با تعریف amu، جرم اتمی عناصر و ذره‌های زیراتمی اندازه‌گیری شده است.

(پ)  $\frac{1}{12}$  جرم اتمی میانگین ایزوتوپ‌های کربن را به عنوان یکای جرم اتمی در نظر گرفته و با amu نشان می‌دهند.

(ت) جرم اتمی میانگین هیدروژن برابر  $1/18u$  است.

(۲) (الف) و (ت)

(۱) (الف) و (ب)

(۴) (پ) و (ت)

(۳) (ب) و (پ)

۶۵- اگر تعداد اتم‌های اکسیژنی که در  $5^\circ$  مول از مولکول‌های  $N_xO_y$  وجود دارد، در کنار یکدیگر زنجیره‌ای به طول  $3/612 \times 10^{11}$


کیلومتر مطابق شکل زیر تشکیل بدهند، کدام گزینه فرمول مولکولی آن را به درستی نشان می‌دهد؟ ( $1\text{pm} = 10^{-12}\text{m}$ )

(۱) NO

(۲)  $\text{NO}_2$

(۳)  $\text{N}_2\text{O}_3$

(۴)  $\text{N}_2\text{O}_4$



۶۶- مخلوطی به جرم ۸ گرم شامل  $\text{CH}_3\text{OH}$  و  $\text{C}_3\text{H}_8$  شامل  $5/76 \times 10^{23}$  اتم هیدروژن است. شمار اتم‌های کربن در این مخلوط

به تقریب کدام است؟ ( $H=1, C=12, O=16: \text{g.mol}^{-1}, N_A \approx 6 \times 10^{23}$ )

(۲)  $1/92 \times 10^{22}$

(۱)  $1/44 \times 10^{22}$

(۴)  $1/92 \times 10^{23}$

(۳)  $1/44 \times 10^{23}$

۶۷- جدول زیر فراوانی ایزوتوپ‌های عناصر منیزیم و کلر را نشان می‌دهد. اگر شمار یون‌ها در یک نمونه  $1/59$  گرمی از منیزیم کلرید برابر با

$3/01 \times 10^{22}$  باشد، تفاوت شمار الکترون‌ها و نوترون‌ها در چند درصد از یون‌های موجود در این نمونه برابر با ۳ است؟ (جرم اتمی میانگین

و جرم مولی را یکسان فرض کنید). (عدد اتمی:  $\text{Cl}=17, \text{Mg}=12$ )

|                  |                  |                  |                  |                  |               |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| $^{37}\text{Cl}$ | $^{35}\text{Cl}$ | $^{26}\text{Mg}$ | $^{25}\text{Mg}$ | $^{24}\text{Mg}$ | اتم           |
| F                | $3\text{F}$      | ۱۵               | $\text{F}''$     | $\text{F}'$      | فراوانی(درصد) |

(۱) ۲/۲

(۲) ۳/۳

(۳) ۴/۴

(۴) ۵/۵




۶۸- کدام مقایسه در مورد انرژی امواج الکترومغناطیسی به درستی صورت گرفته است؟

- (۱) پرتوهای گاما < ریزموجها < پرتوهای فروسرخ  
(۲) ریزموجها < امواج رادیویی < امواج مرئی  
(۳) نور مرئی < پرتوهای فرابنفش < پرتوهای گاما  
(۴) پرتوهای ایکس < پرتوهای فروسرخ < موجهای رادیویی

۶۹- با توجه به شکل زیر، کدام گزینه درست است؟

(۱) با عبور نور نشر شده از لیتیم سولفات در شعله از یک منشور،  
الگوی شامل ۴ خط رنگی A, E, F و G ایجاد می‌شود.  
(۲) اگر دمای شعله مربوط به رنگ C برابر با  $1750^{\circ}\text{C}$  باشد،  
دمای شعله مربوط به رنگهایی A و E به ترتیب می‌تواند  
 $800^{\circ}\text{C}$  و  $2750^{\circ}\text{C}$  باشد.



- (۳) در تصویری از خورشید که با استفاده از دوربین‌هایی حساس به پرتوهایی به طول موج کوتاه‌تری از رنگ G گرفته شده است، خورشید به‌طور عمده به شکل مخلوطی از رنگ‌های C تا G مشاهده می‌شود.  
(۴) پرتو B نسبت به پرتو D، توانایی حمل انرژی بیشتری دارد.

۷۰- کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) اگر فاصله بین سه قله متوالی پرتو یک موج الکترومغناطیس برابر با  $700$  نانومتر باشد، آن پرتو در گستره فرابنفش قرار خواهد گرفت.  
(۲) شمار خطوط طیف نشری خطی نخستین عنصر دوره سوم جدول تناوبی با عدد اتمی نخستین عنصر گروه ۱۶ جدول تناوبی برابر است.  
(۳) اختلاف طول موج پرتو گسیل شده از چشمی کنترل تلویزیون از ریزموجها، نسبت به اختلاف طول موج آن از پرتوهای فرابنفش، بیشتر است.  
(۴) انرژی رنگ شعله نخستین عنصر گروه ۱۱ جدول تناوبی، نسبت به انرژی رنگ شعله نخستین عنصر دوره دوم جدول تناوبی، بیشتر است.

۳۰ دقیقه

حسابان (۱) - نگاه به آینده

حسابان (۱)

جبر و معادله

(از ابتدای فصل تا انتهای روابط

بین ضرایب و ریشه های

معادله درجه دوم)

صفحه های ۱ تا ۹

۷۱- جمله عمومی یک دنباله به صورت  $a_n = 3^{n-1}$  است. چند جمله از این دنباله را با هم جمع کنیم تا

حاصل برابر ۱۲۱ شود؟

۵ (۲)

۴ (۱)

۷ (۴)

۶ (۳)

۷۲- مجموع چند جمله اول دنباله حسابی  $3, 8, 13, \dots$  برابر ۲۵۵ است؟

۱۱ (۲)

۹ (۱)

۱۰ (۴)

۱۲ (۳)

۷۳- معادله درجه دومی که ریشه های آن  $5 + \sqrt{3}$  و  $5 - \sqrt{3}$  باشند، کدام است؟

$$x^2 + 8x + 22 = 0 \quad (2)$$

$$x^2 - 8x + 22 = 0 \quad (1)$$

$$x^2 + 10x + 22 = 0 \quad (4)$$

$$x^2 - 10x + 22 = 0 \quad (3)$$

۷۴- جمله  $n$ ام یک دنباله حسابی به صورت  $t_n = \frac{2kn - 3}{(k+1)n^2 + 3}$  است. مجموع بیست جمله اول این دنباله کدام است؟

-۱۲۰ (۲)

-۹۰ (۱)

-۱۶۰ (۴)

-۱۴۰ (۳)

۷۵- در دنباله حسابی  $a_1, a_2, a_3, \dots$  اگر برای  $n \geq 2$  داشته باشیم  $a_{n+1} - a_{n-1} = \frac{3}{2}$  و  $a_5 = \frac{3}{2}$  باشد، مجموع ۱۳ جمله اول این دنباله، کدام

است؟

۳۹ (۲)

۲۷ (۱)

۴۲ (۴)

۳۶ (۳)

محل انجام محاسبات

۷۶- اگر  $\alpha$  و  $\beta$  ریشه‌های معادله درجه دوم  $(m+2)x^2 - (1-m)x + 3m = -6$  بوده و رابطه  $\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 + 2 = 0$  برقرار باشد، کدام  $m$  می‌تواند باشد؟

(۱) -۳ (۲) ۳

(۳) ۵ (۴) -۵

۷۷- اگر مجموع  $n$  جمله اول دنباله هندسی  $a_n$  برابر با  $S_n = 4 - \frac{(-1)^n}{2^{n-2}}$  باشد. حاصل  $a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10}$  کدام است؟

(۱)  $\frac{-511}{256}$  (۲)  $\frac{1023}{512}$

(۳)  $\frac{511}{128}$  (۴)  $\frac{-1023}{256}$

۷۸- اگر  $x_1$  و  $x_2$  ریشه‌های معادله  $x^2 - 7x - 2 = 0$  باشند، حاصل عبارت  $\frac{2x_1^2 - 4}{3x_1} + \frac{4x_2}{5x_2^2 - 10}$  کدام است؟

(۱)  $\frac{502}{7}$  (۲)  $\frac{502}{5}$

(۳)  $\frac{27}{35}$  (۴)  $\frac{502}{105}$

۷۹- یک دنباله حسابی  $n$  جمله دارد. اگر دو جمله وسط دنباله ۱۸ و ۳۰ و مجموع تمامی جملات ۴۳۲ باشد،  $n$  کدام است؟

(۱) ۲۴ (۲) ۲۲

(۳) ۱۸ (۴) ۱۶

۸۰- هر گاه  $\alpha$  و  $\beta$  ریشه‌های معادله  $x^2 + 2ax + b = 0$  باشند، کدام معادله همواره یک ریشه به صورت  $\alpha + \beta + \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$  دارد؟

(۱)  $x^2 + 4ax - 2b = 0$  (۲)  $x^2 + 4ax + 2b = 0$

(۳)  $x^2 - 4ax + 2b = 0$  (۴)  $x^2 - 4ax - 2b = 0$

حسابان (۱) - سؤالات آشنا

۸۱- در دنباله حسابی  $37, a, b, 25, \dots$  مجموع جملات مثبت دنباله کدام است؟

(۲) ۱۸۰

(۱) ۱۹۰

(۴) ۱۶۰

(۳) ۱۷۰

۸۲- حداقل چند جمله اول از دنباله  $a_n = \frac{3^{n-2}}{4}$  را با هم جمع کنیم تا مجموع آن‌ها از ۱۱ بیشتر باشد؟

(۲) ۶

(۱) ۵

(۴) ۷

(۳) ۸

۸۳- سه جمله اول یک دنباله هندسی با قدرنسبت ۲ را در نظر بگیرید، اگر عدد ۱۲ را بین جملات دوم و سوم این دنباله قرار دهیم، چهار جمله

اول یک دنباله حسابی شکل می‌گیرد. مجموع بیست جمله اول این دنباله حسابی کدام است؟

(۲) ۸۲۰

(۱) ۸۴۰

(۴) ۸۴۵

(۳) ۸۲۵

۸۴- اعداد طبیعی زوج را به شکل زیر به گونه‌ای دسته‌بندی می‌کنیم که تعداد اعداد هر دسته با شماره آن برابر باشد. مجموع همه اعداد دسته

$(2), (4, 6), (8, 10, 12), \dots$

دهم کدام است؟

(۲) ۹۶۵

(۱) ۹۰۹

(۴) ۱۰۱۰

(۳) ۱۲۱۰

۸۵- دایره‌ای به شعاع  $r$  مفروض است. در مرحله اول نصف دایره را رنگ می‌کنیم. در مرحله دوم نیم‌دایره باقی‌مانده را مجدداً نصف کرده و آن را

رنگ می‌کنیم. اگر این کار را ادامه دهیم، پس از حداقل چند مرحله حداقل ۹۶ درصد مساحت دایره رنگ می‌شود؟

(۲) ۵

(۱) ۴

(۴) ۷

(۳) ۶

۸۶- در یک دنباله هندسی، نسبت جمله سیزدهم به جمله چهارم برابر  $\frac{-1}{512}$  است. مجموع ده جمله اول این دنباله چند برابر مجموع پنج جمله

دوم آن است؟

(۱) -۳۱ (۲)  $\frac{33}{32}$

(۳)  $\frac{-31}{32}$  (۴) ۳۳

۸۷- حاصل  $(x^5 + \frac{1}{x^5})^2 + \dots + (x^2 + \frac{1}{x^2})^2 + (x + \frac{1}{x})^2$  به ازای  $x = \sqrt{2}$  چقدر از  $\frac{1}{33}$  بیشتر است؟

(۱) ۷۳ (۲) ۷۴

(۳) ۷۸ (۴) ۸۲

۸۸- اگر  $\alpha$  و  $\beta$  ریشه‌های معادله  $4x^2 - 12x + 1 = 0$  باشند، مقدار  $\frac{1}{\sqrt{\alpha}} + \frac{1}{\sqrt{\beta}}$  چقدر است؟

(۱) ۲ (۲) ۳

(۳) ۴ (۴) ۶

۸۹- اگر  $x_1$  و  $x_2$  ریشه‌های معادله  $2x^2 - 5x - 1 = 0$  باشند، مقدار  $|x_1| + |x_2|$  کدام است؟ ( $x_1 > x_2$ )

(۱)  $\frac{\sqrt{33}}{2}$  (۲)  $\sqrt{33}$

(۳)  $\frac{\sqrt{32}}{2}$  (۴)  $\sqrt{31}$

۹۰- اگر ریشه‌های معادله  $x^2 + bx + c = 0$  مجذور ریشه‌های معادله  $x^2 - 2x - 4 = 0$  باشند،  $c - b$  کدام است؟

(۱) ۲۸ (۲) ۳۶

(۳) ۱۶ (۴) -۴

هندسه (۲)

دایره

(مفاهیم اولیه و زاویه‌ها در دایره

تا ابتدای زاویه ظلی)

صفحه‌های ۹ تا ۱۴

۹۱- دایره‌ای به شعاع ۵ مفروض است. اگر فاصله نقطه دلخواه M درون دایره از مرکز دایره  $x^2 + 4x$  باشد،

آن‌گاه x کدام عدد می‌تواند باشد؟

(۲) ۴

(۱) ۵

(۴)  $\frac{1}{2}$

(۳) ۱

۹۲- اگر خط d و دایره C یک نقطه اشتراک داشته باشند، نسبت فاصله خط از مرکز دایره به شعاع دایره کدام است؟


(۲) بزرگتر از یک

(۱) اظهارنظر قطعی ممکن نیست.

(۴) یک

(۳) کوچکتر از یک

۹۳- با توجه به شکل زیر، حاصل  $y - x$  کدام است؟




(۱)  $90^\circ$

(۲)  $150^\circ$

(۳)  $120^\circ$

(۴)  $135^\circ$

۹۴- در شکل زیر، حاصل  $\widehat{AC} + \widehat{BD}$  چند درجه است؟




(۲)  $140^\circ$

(۱)  $145^\circ$

(۴)  $130^\circ$

(۳)  $135^\circ$

۹۵- در شکل زیر، نقطه O مرکز دایره است و دو قطر AB و CD بر هم عمودند. اگر  $OM = MN$  باشد، اندازه زاویه A چند درجه است؟




(۲)  $40^\circ$

(۱)  $30^\circ$

(۴)  $55^\circ$

(۳)  $45^\circ$

۹۶- در شکل زیر  $AB = BD$  و  $\widehat{CAD} = 28^\circ$  است. زاویه  $\widehat{BAC}$  چند درجه است؟ (O مرکز دایره است.)



(۱)  $30^\circ$

(۲)  $31^\circ$

(۳)  $24^\circ$

(۴)  $36^\circ$

۹۷- در یک دایره، دو وتر به طول‌های ۴ و ۱۰ به گونه‌ای قرار گرفته‌اند که فاصله مرکز دایره از وتر کوچک‌تر، دو برابر فاصله آن تا وتر بزرگ‌تر



است. طول شعاع این دایره کدام است؟


(۲)  $4\sqrt{2}$

(۱) ۴

(۴) ۸

(۳)  $4\sqrt{3}$

۹۸- در شکل زیر، BD قطر دایره است. اگر  $\widehat{A} = 7\alpha - 1^\circ$ ،  $\widehat{COD} = 10\alpha + 2^\circ$  و O مرکز دایره باشد، اندازه کمان BC چند درجه است؟




(۱)  $15^\circ$

(۲)  $30^\circ$

(۳)  $45^\circ$

(۴)  $60^\circ$

۹۹- در شکل زیر،  $AB = 30$ ،  $DC = 48$  و  $AB \parallel DC$  است. اگر شعاع دایره برابر ۲۵ باشد، فاصله دو وتر AB و DC از یکدیگر کدام است؟




(۱) ۲۴

(۲) ۲۵

(۳) ۲۷

(۴) ۳۰

۱۰۰- در شکل مقابل، اگر  $AF = AD = AC$  و  $\widehat{BAD} = 70^\circ$  باشد، اندازه زاویه  $\widehat{FCB}$  کدام است؟



(۱)  $20^\circ$

(۲)  $30^\circ$

(۳)  $35^\circ$

(۴)  $45^\circ$



فیزیک (۲) - نگاه به آینده

۱۵ دقیقه

فیزیک (۲)

الکتریسیته ساکن

(از ابتدای فصل تا انتهای

میدان الکتریکی)

صفحه‌های ۱ تا ۱۲

۱۰۱- ابتدا میله باردار A را به کلاهک الکتروسکوپ خنثی تماس می‌دهیم. سپس میله باردار B را به کلاهک

الکتروسکوپ نزدیک می‌کنیم. مشاهده می‌شود که ورقه‌های الکتروسکوپ ابتدا بسته و سپس باز می‌شوند و بار نهایی

ورقه‌ها در وضعیتی که میله B نزدیک است، منفی می‌باشد. بار میله A و B به ترتیب چگونه است؟

(۲) مثبت، منفی

(۱) مثبت، مثبت

(۴) منفی، مثبت

(۳) منفی، منفی

۱۰۲- دو گلوله آلومینیومی و برنجی را با روش مالش با اجسام مختلف باردار کرده و نزدیک یکدیگر قرار می‌دهیم. این دو

گلوله یکدیگر را دفع می‌کنند. در این صورت گلوله آلومینیومی می‌تواند با ... و گلوله برنجی با ... مالش داده شده

باشد.

(۱) کاغذ - پارچه کتان

(۲) نایلون - کاغذ

(۳) ابریشم - لاستیک

(۴) پارچه کتان - پارچه کتان

۱۰۳- عدد اتمی اورانیوم  $Z = 92$  است. بار الکتریکی هسته اورانیوم چقدر است؟ ( $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ )

(۲)  $1.472 \times 10^{-17} \text{ C}$

(۱)  $1.472 \times 10^{-17} \text{ mC}$


(۴)  $2.944 \times 10^{-17} \text{ C}$

(۳)  $2.944 \times 10^{-17} \text{ mC}$

۱۰۴- دو کره رسانای مشابه روی پایه‌های عایقی در فاصله‌ای مناسب از یکدیگر قرار دارند. کره A بدون بار و بار کره B برابر

با  $q_B = -6/4 \text{ pC}$  است. با وصل کلید k، کره A چه تعداد الکترون دریافت می‌کند؟ ( $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ) و فرض کنید باری روی

سیم رابط باقی نمی‌ماند.



(۲)  $4 \times 10^6$

(۱)  $2 \times 10^7$

(۴)  $2 \times 10^6$

(۳)  $4 \times 10^7$

۱۰۵- کدام یک از گزینه‌های زیر می‌تواند بیانگر بار الکتریکی یک جسم باشد؟ ( $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ )

(۲)  $\frac{5}{9} \mu\text{C}$

(۱)  $8 \times 10^{-20} \text{ C}$

(۴)  $5/2 \text{ nC}$

(۳)  $\sqrt{3} \mu\text{C}$

محل انجام محاسبات

۱۰۶- بارهای نقطه‌ای  $q_1$  و  $q_2$  در فاصله  $d$ ، به یکدیگر نیروی الکتریکی  $2N$  وارد می‌کنند. اگر بار  $q_1$  را نصف و آن را در فاصله  $\frac{d}{2}$  از بار  $q_2$

قرار دهیم، اندازه نیروی الکتریکی وارد شده به هر یک از دو بار چند نیوتون می‌شود؟


۲ (۲)

۱ (۱)

۴ (۴)

۸ (۳)

۱۰۷- سه ذره با بارهای  $q_1 = 4 \mu C$ ،  $q_2 = -1 \mu C$  و  $q_3 = 4 \mu C$ ، در نقطه‌های A، B و C مطابق شکل زیر ثابت شده‌اند. نیروی



الکتریکی خالص وارد بر بار  $q_2$  برابر با چند نیوتون است؟  $(k = 9 \times 10^9 \frac{N.m^2}{C^2})$


۸ / ۷۵  $\times 10^{-3}$  (۲)

۱۱ / ۲۵  $\times 10^{-3}$  (۱)

۶ / ۷۵  $\times 10^{-3}$  (۴)

۴ / ۷۵  $\times 10^{-3}$  (۳)

۱۰۸- در شکل زیر، سه بار الکتریکی نقطه‌ای  $q_1$ ،  $q_2$  و  $q_3$  در سه رأس مثلث قائم‌الزاویه‌ای ثابت شده‌اند. نیروی الکتریکی برآیند وارد بر بار



نقطه‌ای  $q_1$  از طرف دو بار نقطه‌ای  $q_2$  و  $q_3$  چند نیوتون است؟  $(k = 9 \times 10^9 \frac{N.m^2}{C^2})$

۱۰<sup>-۳</sup> (۲)

۱۰<sup>-۲</sup> (۱)

۲  $\times 10^{-3}$  (۴)

۲  $\times 10^{-2}$  (۳)

۱۰۹- دو بار الکتریکی نقطه‌ای  $q_1 = -4 \mu C$  و  $q_2 = 36 \mu C$ ، در فاصله  $20 \text{ cm}$  از یکدیگر قرار دارند. بار  $q_3$  را در فاصله چند سانتی‌متری بار

$q_2$  قرار دهیم تا در آن مکان به حال تعادل باقی بماند؟

۴۰ (۴)

۱۰ (۳)


۲۰ (۲)

۳۰ (۱)

۱۱۰- بار آزمون نشان داده شده در شکل زیر،  $q_0 = 3 \times 10^{-8} \text{ C}$  است و از سوی دو گوی و یک میله باردار نیرویی برابر با  $F = 6 \times 10^{-5} \text{ N}$



در جهت نشان داده شده بر آن وارد می‌شود. اندازه میدان الکتریکی بر حسب نیوتون بر کولن و جهت آن چگونه است؟



۲  $\times 10^3$ ، هم‌جهت و هم‌راستا با  $\vec{F}$  (۱)

۴  $\times 10^3$ ، هم‌جهت و هم‌راستا با  $\vec{F}$  (۲)

۲  $\times 10^3$ ، خلاف جهت و هم‌راستا با  $\vec{F}$  (۳)

۴  $\times 10^3$ ، خلاف جهت و هم‌راستا با  $\vec{F}$  (۴)

۲۰ دقیقه

شیمی (۲) - نگاه به آینده

**شیمی (۲)**  
**قدر هدایای زمینی را بدانیم**  
(از ابتدای فصل تا انتهای الگوها و روندها در رفتار مواد و عناصرها)  
صفحه‌های ۱ تا ۱۰

۱۱۱- کدام گزینه نادرست است؟ 

(۱) میزان تغییرات استخراج و مصرف مواد معدنی نسبت به سوخت‌های فسیلی، با گذشت زمان، شیب بیشتری داشته است.

(۲) پیشرفت صنعت الکترونیک مبتنی بر اجزایی است که از مواد نیمه‌رسانا ساخته می‌شوند.

(۳) در پنج سال آینده، میزان استخراج و مصرف سوخت‌های فسیلی بیش‌تر از فلزها پیش‌بینی می‌شود.

(۴) برخی مواد استفاده شده در ساخت دوچرخه، طبیعی نیستند و از کره زمین به دست نمی‌آیند.

۱۱۲- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) با گسترش فناوری به رابطه میان خواص مواد با عنصرهای سازنده آن‌ها پی برده شد.

(۲) فولاد نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش صنعت خودرو داشته است.

(۳) جرم کل مواد در کره زمین به تقریب ثابت است.

(۴) رشد و گسترش تمدن بشری در گرو کشف و شناخت مواد جدید است.

۱۱۳- اگر عدد اتمی عناصر A، C و D به ترتیب ۱۹، ۳۲ و ۳۵ باشد، عبارت کدام گزینه نادرست است؟ (نماد عناصرها فرضی است).

(۱) هر دو عنصر A و C رسانای جریان الکتریسیته هستند، اما عنصر C برخلاف عنصر A شکننده است.

(۲) عنصر A ضمن واکنش با عنصر D، الکترون از دست داده و پیوند یونی برقرار می‌کند.

(۳) بیش‌ترین خصلت فلزی و نافلزی به ترتیب متعلق به عناصر D و A است.

(۴) عنصر C از نظر خواص فیزیکی بیش‌تر شبیه عنصر A و از نظر رفتار شیمیایی مانند عنصر D است.

۱۱۴- کدام گزینه نادرست است؟ 

(۱) خصلت فلزی و تعداد زیرلایه‌های الکترونی عنصر سدیم از عنصر لیتیم بیش‌تر است.

(۲) عنصرهای پتاسیم، منیزیم، قلع و سرب، رسانایی الکتریکی و گرمایی بالایی دارند.

(۳) عنصرهای اکسیژن، نیتروژن و فلوئور در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون می‌گیرند یا به اشتراک می‌گذارند.

(۴) عنصرهای شبه‌فلزی در جدول دوره‌ای، در واکنش با دیگر اتم‌ها، الکترون از دست می‌دهند.

محل انجام محاسبات

۱۱۵- عبارت کدام گزینه درست است؟

(۱) هلیوم در گروه ۱۸ جدول تناوبی جای دارد و عنصری از دسته S است که آرایش لایه ظرفیت آن به صورت هشت تایی پایدار است.

(۲) عنصر با نماد فرضی  $X_{14}$  در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون به اشتراک می‌گذارد و در اثر ضربه خرد می‌شود.

(۳) در گروه ۱۴ جدول دوره‌ای عنصرها، با افزایش مجموع  $l$  و  $n$  الکترون‌های لایه ظرفیت اتم‌ها، خصلت فلزی آن‌ها کاهش می‌یابد.

(۴) شمار عناصر شبه فلزی گروه ۱۴ جدول دوره‌ای عنصرها، برابر با شمار عناصر نافلزی آن است.

۱۱۶- با توجه به جدول زیر برای عناصر A، B، C، D و E، به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه، تنها سه عنصر با ویژگی‌های داده شده هم‌خوانی

دارند؟

| عنصر | رسانایی الکتریکی | رسانایی گرمایی | سطح صیقلی | چکش‌خواری | ویژگی شیمیایی          | حالت فیزیکی<br>( $25^{\circ}\text{C}$ ) |
|------|------------------|----------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
| A    | بالا             | بالا           | دارد      | دارد      | از دست دادن الکترون    | جامد                                    |
| B    | پایین            | بالا           | دارد      | ندارد     | اشتراک الکترون         | جامد                                    |
| C    | بالا             | ندارد          | ندارد     | ندارد     | اشتراک الکترون         | جامد                                    |
| D    | ندارد            | ندارد          | ندارد     | ندارد     | اشتراک و گرفتن الکترون | جامد                                    |
| E    | ندارد            | ندارد          | ندارد     | -         | اشتراک و گرفتن الکترون | گاز                                     |

(۱) سدیم - قلع - کربن - گوگرد - فلونور (۲) سرب - سیلیسیم - کربن - فسفر - برم

(۳) آلومینیم - اکسیژن - کربن - ژرمانیم - کلر (۴) کربن - سیلیسیم - گوگرد - فسفر - سدیم

۱۱۷- عبارت کدام گزینه نادرست است؟

(۱) دانش شیمی به ما کمک می‌کند تا ساختار دقیق ترکیبات گوناگون را شناسایی کنیم، به رفتار آن‌ها پی ببریم و بهره‌برداری درست از آن‌ها را بیاموزیم.

(۲) گسترش فناوری به میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته است، به طوری که پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از موادی مانند Si و ... ساخته می‌شوند.

(۳) انسان‌های پیشین از برخی مواد طبیعی مانند چوب، سنگ، سفال، پشم و پوست بهره می‌بردند، اما با گذشت زمان توانستند موادی مانند برخی فلزها را نیز استخراج کنند.

(۴) با گسترش دانش تجربی، شیمی‌دان‌ها دریافتند که گرما دادن به مواد و افزودن آن‌ها به یکدیگر سبب تغییر و گاهی بهبود خواص می‌شود.

۱۱۸- با توجه به میزان تولید یا مصرف نسبی برخی مواد (مواد معدنی، فلزها و سوخت‌های فسیلی) در جهان، کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) در سال ۲۰۱۵ به تقریب ۷ میلیارد تن فلز در جهان استخراج و مصرف شده است.
- (۲) هر چه میزان استخراج از منابع یک کشور بیشتر باشد، آن کشور توسعه یافته‌تر است.
- (۳) سرعت رشد مصرف سوخت‌های فسیلی نسبت به فلزها کمتر است.
- (۴) پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۳۰ به تقریب در مجموع ۷۲ میلیارد تن از این مواد استخراج و مصرف شوند.

۱۱۹- کدام گزینه درست است؟

- (۱) با بررسی توزیع برخی عناصرها در جهان می‌توان پی برد که پراکندگی منابع نمی‌تواند دلیلی بر پیدایش تجارت جهانی باشد.
- (۲) علم شیمی را می‌توان مطالعه هدف‌دار، منظم و هوشمندانه رفتار عناصرها و مواد برای یافتن روندها، الگوهای رفتار فیزیکی و شیمیایی آنها دانست.
- (۳) عنصرهای جدول دوره‌ای که شامل ۱۸ دوره و ۷ گروه است، بر اساس رفتارشان در سه دسته شامل فلز، نافلز و شبه‌فلز جای دارند.
- (۴) هلیوم در گروه ۱۸ جدول دوره‌ای عناصرها جای دارد و همانند سایر گازهای نجیب متعلق به دسته عناصر p است.

۱۲۰- عنصر دارای ویژگی ذکر شده در هر یک از عبارتهای (الف) تا (پ) به ترتیب از راست به چپ، در کدام گزینه آمده است؟ 

(الف) رسانایی الکتریکی کمی دارد.

(ب) جامدی شکل‌پذیر است.

(پ) رسانای خوب گرماست.

(۲) C، Si، Pb، (گرافیت)

(۱) C، Si، Ge، (گرافیت)

(۴) Pb، Sn، Ge

(۳) Si، C، (گرافیت)

شیمی (۲) - سوالات آشنا

۱۲۱- کدام عبارت درست است؟

- (۱) منابع شیمیایی در سرتاسر جهان به صورت یکسان پخش شده‌اند.
- (۲) مواد طبیعی برخلاف مواد مصنوعی از کره زمین به دست می‌آیند.
- (۳) گسترش صنعت خودرو، مدیون شناخت و دسترسی به فولاد است.
- (۴) با استخراج منابع از کره زمین، جرم کل مواد کره زمین کاهش می‌یابد.

محل انجام محاسبات

۱۲۲- کدام مطلب همواره درست است؟

- (۱) برای ساخت اجزاء مختلف دوچرخه تنها از فراوری نفت استفاده می‌شود.
- (۲) آهن و آلومینیم چون به طور مستقیم از طبیعت به دست می‌آیند، جزو مواد طبیعی می‌باشند.
- (۳) صرفاً هرچه میزان استخراج از منابع یک کشور بیشتر باشد، آن کشور توسعه یافته‌تر است.
- (۴) پراکندگی منابع در جهان می‌تواند دلیل پیدایش تجارت جهانی باشد.

۱۲۳- کدام گزینه در مورد جدول دوره‌ای عنصرها نادرست می‌باشد؟

- (۱) به شیمی‌دان‌ها کمک می‌کند تا حجم انبوهی از مشاهده‌ها را سازمان‌دهی و تجزیه و تحلیل کنند.
- (۲) جدول دوره‌ای شامل ۷ دوره و ۸ گروه می‌باشد.
- (۳) تعیین موقعیت یک عنصر در این جدول به معنی تعیین دوره و گروه آن نیز می‌باشد.
- (۴) در این جدول، اتم‌ها بر اساس عدد اتمی چیده شده‌اند.

۱۲۴- کدام موارد از مطالب زیر نادرست‌اند؟ (کامل‌ترین گزینه را انتخاب کنید.)

- (آ) عنصرهای جدول براساس بنیادی‌ترین ویژگی آن‌ها یعنی عدد اتمی (A) چیده شده‌اند.
  - (ب) بین فلزها، سوخت‌های فسیلی و مواد معدنی میزان تولید یا مصرف نسبی فلزها از همه کمتر است.
  - (پ) گازهای نجیب عناصری از دسته P هستند که در گروه ۱۸ قرار دارند.
  - (ت) اختلاف عدد اتمی اولین و سومین فلز قلیایی با عدد اتمی عنصری از گروه پانزدهم جدول دوره‌ای برابر است.
- (۱) آ، پ، ت (۲) ب، پ، ت (۳) آ، ت (۴) آ، ب

۱۲۵- کدام گزینه در رابطه با دومین شبه‌فلز گروه چهاردهم جدول تناوبی نادرست است؟

- (۱) همانند شبه‌فلز دیگر این گروه، رسانایی الکتریکی کمی دارد.
- (۲) در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون به اشتراک می‌گذارد.
- (۳) تفاوت عدد اتمی آن با دیگر شبه‌فلز این گروه، برابر ۱۷ است.
- (۴) چکش‌خوار نیست و در اثر ضربه خرد می‌شود.

۱۲۶- از بین پنج عنصر اول گروه چهاردهم ... عنصر سطح درخشان و صیقلی و ... عنصر رسانایی الکتریکی کمی دارند و ... عنصر بر اثر ضربه خرد می‌شوند. (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید).

(۲) ۳-۲-۴

(۱) ۳-۱-۴

(۴) ۱-۱-۳

(۳) ۱-۲-۳

۱۲۷- در کدام مورد، ویژگی نسبت داده شده به عنصر مورد نظر همواره صحیح است؟

(۱) ژرمانیم توانایی ایجاد پیوند اشتراکی را دارد و از لحاظ رسانایی الکتریکی نارسانا است.

(۲) کربن نافلزی است که در اثر ضربه خرد می‌شود و رسانای جریان برق نیست.

(۳) قلع برخلاف فسفر درخشان است و در اثر ضربه خرد نمی‌شود.

(۴) آلومینیم با از دست دادن الکترون به آرایش گاز نجیب آرگون می‌رسد.

۱۲۸- عبارت کدام گزینه درست است؟

(۱) از بین عناصر گروه چهاردهم جدول دوره‌ای دو عنصر شکننده هستند.

(۲) خصلت نافلزی عنصر  $^{117}\text{Cl}$  از خصلت نافلزی عنصر  $^{35}\text{Br}$  کمتر است.

(۳) خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر به صورت دوره‌ای تکرار می‌شوند که به قانون دوره‌ای عناصر معروف است.

(۴) خواص فیزیکی  $\text{Si}$  و  $\text{Ge}$  بیشتر به نافلزات شبیه است اما رفتار شیمیایی آن‌ها همانند فلزات است.

۱۲۹- در چند مورد از موارد زیر، ویژگی بیان شده با آرایش الکترونی آخرین زیرلایه اتم عنصر مربوطه مطابقت دارد؟

- دارای سطحی تیره است. ( $2p^2$ )

- فاقد رسانایی الکتریکی می‌باشد. ( $3p^2$ )

- دارای رسانایی گرمایی می‌باشد. ( $3p^2$ )

- خواص فیزیکی آن کاملاً مانند فلزات است. ( $4p^2$ )

- چکش‌خوار می‌باشد. ( $4p^2$ )

(۴) ۵

(۳) ۳

(۲) ۱

(۱) ۲

۱۳۰- ویژگی‌های سه عنصر از جدول تناوبی به شرح زیر است. به ترتیب از راست به چپ، هر یک از این عناصر براساس رفتارشان در کدام دسته قرار می‌گیرند؟

(الف) عنصری از دوره سوم جدول تناوبی که شمار الکترون‌های زیرلایه  $p$  لایه آخر آن نصف زیرلایه  $s$  همان لایه می‌باشد.

(ب) عنصری از دوره دوم جدول تناوبی که رسانایی الکتریکی دارد اما رسانایی گرمایی ندارد و تنها توانایی به اشتراک گذاشتن الکترون را در واکنش با سایر عناصر دارد.

(پ) عنصری که رسانایی الکتریکی کمی دارد، در اثر ضربه خرد می‌شود و در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون به اشتراک می‌گذارد.

(۲) نافلز - شبه‌فلز - فلز

(۱) فلز - فلز - شبه‌فلز

(۴) فلز - نافلز - فلز

(۳) فلز - نافلز - شبه‌فلز





# دفترچه سؤال

آزمون هوش و استعداد

(دوره دوم)

۳ مرداد

تعداد کل سؤالات آزمون: ۲۰  
زمان پاسخ‌گویی: ۳۰ دقیقه

گروه فنی تولید

|                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| حمید لنجان‌زاده اصفهانی                                                               | مسئول آزمون            |
| فاطمه راسخ                                                                            | ویراستار               |
| محیا اصغری                                                                            | مدیر گروه مستندسازی    |
| علیرضا همایون‌خواه                                                                    | مسئول درس مستندسازی    |
| حمید اصفهانی، فاطمه راسخ، حمید گنجی، حامد کریمی،<br>سپهر حسن‌خان‌پور، فرزاد شیرمحمدلی | طراحان                 |
| معصومه روحانیان                                                                       | حروف‌چینی و صفحه‌آرایی |
| حمید عباسی                                                                            | ناظر چاپ               |

برای مشاهده پاسخ‌ها، به صفحه شخصی خود در سایت کانون مراجعه کنید.



استعداد تحلیلی

۳۰ دقیقه

۲۵۱- کدام وسیله متفاوت است؟

- (۱) کورنومتر  
(۲) فشارسنج  
(۳) ذره‌بین  
(۴) ترازو

۲۵۲- نسبت تخته‌سیاه به وایت‌برد، شبیه است به نسبت میان دو واژه‌ی کدام گزینه؟

- (۱) مداد، پاک‌کن  
(۲) کتاب، دفتر  
(۳) گچ، ماژیک  
(۴) پاک‌کن، تراش

۲۵۳- مفهوم عبارت زیر کدام است؟

«فراء نحوی»، معلم دو فرزند مأمون بود. و هر زمان که برمی‌خاست، هر یک از آن دو به سرعت یک لنگ کفش وی را می‌نهاد. مأمونشان چنین دستور داده بود.»

- (۱) احترام گذاشتن به معلم  
(۲) سخت‌گیری معلم بر دانش‌آموزان  
(۳) ترس دانش‌آموز از معلم  
(۴) دوستی معلم با دانش‌آموزان

۲۵۴- طبق متن زیر معنای واژه‌ی «دعوی» به کدام گزینه نزدیکتر است؟

«آدمی باید اخذ علم از حضرت استاد کند، بعد از آن دعوی تعلیم و ارشاد، نه آن که استاد ندیده خود را استاد بیند و از کس نیاموخته آموزگار کسان گردد.»

- (۱) ادعا  
(۲) آموخته  
(۳) نبرد  
(۴) خیرخواهی

\* بر اساس متن زیر - برگرفته از کتاب اصول و مبانی سیاست، نوشته‌ی علیرضا حیدری و سمیه ذوالفقاری، به سه پرسش بعدی پاسخ دهید.

مشروعیت یکی از مهمترین مفاهیم در علم سیاست و به معنای پذیرش و مقبولیت از سوی مردم است. ماکس وبر سه نوع مشروعیت را مطرح می‌کند: مشروعیت سنتی که بر پایه‌ی هنجارها و سنت‌های تاریخی استوار است، مشروعیت کاریزماتیک که از نفوذ و ویژگی‌های استثنایی شخصیتی یک رهبر ناشی می‌شود، و مشروعیت قانونی‌عقلانی که به ساختارهای حقوقی و نهادهای دموکراتیک وابسته است. در جوامع مدرن، مشروعیت قانونی‌عقلانی بیشترین اهمیت را دارند زیرا قوانین و نهادهای سیاسی تعیین‌کننده‌ی قدرت هستند. اما در دوران بحران، مشروعیت کاریزماتیک می‌تواند نقش بیشتری پیدا کند، زیرا مردم در این دوران به دنبال رهبری مقتدر برای خروج از بحران هستند. هابز و لاک نیز نظرات متفاوتی درباره مشروعیت دارند. هابز معتقد بود که برای جلوگیری از هرج و مرج، مردم باید قدرت مطلق را به حاکم واگذار کنند. در مقابل جان لاک بر این تصور بود که اگر حکومت حقوق طبیعی مردم را نقض کند، مشروعیت خود را از دست می‌دهد و مردم حق تغییر آن را دارند. بحران مشروعیت زمانی رخ می‌دهد که حاکمیت نتواند رضایت عمومی را حفظ کند. این بحران می‌تواند ناشی از فساد، ناکارآمدی، سرکوب و یا نارضایتی اجتماعی باشد و در صورت شدت یافتن ممکن است به سقوط بینجامد.

۲۵۵- کدام مورد از نظریات ماکس وبر در متن بالا برمی‌آید؟

- (۱) مشروعیت کاریزماتیک یک رهبر، آینده‌ی آرمانی‌تری را برای آن حاکمیت نوید می‌دهد.  
(۲) در تعیین مشروعیت سنتی حاکمان در گذشته‌های دور، کاریزمای رهبران عامل مؤثری محسوب نمی‌شود.  
(۳) تعیین‌کننده‌بودن قوانین و نهادهای سیاسی در جوامع مدرن، به تأثیر مشروعیت قانونی‌عقلانی در مشروعیت حاکم می‌افزاید.  
(۴) در جوامع مدرن، برتری کاریزماتیک یک شخص بر شخص دیگر، عامل تأثیرگذاری در مشروعیت او نخواهد بود.

۲۵۶- بر اساس دیدگاه جان لاک، مردم چه زمانی حق تغییر حکومت را دارند؟

- (۱) زمانی که حکومت مشروعیت کاریزماتیک خود را از دست بدهد.
- (۲) هنگامی که حکومت حقوق طبیعی مردم را نقض کند.
- (۳) وقتی که حکومت در اجرای قوانین دچار مشکل شود.
- (۴) اگر بحران‌های امنیتی و مشکلات اقتصادی فراوان باشد.

۲۵۷- متن برای پاسخگویی به کدام پرسش(ها) اطلاعات کافی را در اختیار مخاطب می‌گذارد؟

الف) کاریزمای یک رهبر، چگونه بر قدرت او در عبور از بحران‌های اجتماعی و سیاسی می‌افزاید؟

ب) چه نمونه رفتارهایی ممکن است عامل کاهش رضایت عمومی و بحران مشروعیت یک حکومت باشد؟

ج) ماکس وبر چه ارزشی برای نقش هنجارها و سنت‌های تاریخی در مشروعیت یک حاکم امروزی برمی‌شمارد؟

(۱) فقط الف

(۲) الف، ب

(۳) فقط ب

(۴) ب، ج

\* بر اساس متن زیر به سه پرسش بعدی پاسخ دهید. حالت‌های خاص جدایی، چندهمسری، و ... را در نظر بگیرید و بهترین گزینه را انتخاب کنید.

در روزگار ملک‌شاه سلجوقی، گردی بازرگان و فاضل می‌زیست که نام وی «ظهیرالدین رازی» بود و ۵ فرزند داشت، سه پسر و دو دختر با نام‌های حسن، یعقوب، سلمان، زهره و مه‌پاره. حسن زنی از مردم بلخ را به همسری گرفت و صاحب دو پسر شد. سلمان دختری از طبرستان را به همسری گرفت و صاحب دختری شد. یعقوب نیز با خواهر زن سلمان وصلت نمود. زهره را به همسری، به پسر دایی مادرش دادند. مه‌پاره نیز با برادر زن حسن وصلت کرد و مادر دو دختر شد.

۲۵۸- نسبت پسر بزرگ حسن با فرزند یعقوب چیست؟

(۱) پسر عموی اوست.

(۲) هم پسرعمه و هم پسردایی اوست.

(۳) پسرعمه‌ی اوست.

(۴) هم پسرعمو و هم پسرخاله‌ی اوست.

۲۵۹- پسر کوچک حسن چه نسبتی با دختر بزرگ مه‌پاره دارد؟

(۱) پسر دایی اوست.

(۲) هم پسردایی و هم پسرعمه اوست.

(۳) پسر خاله‌ی اوست.

(۴) هم پسرعمو و هم پسرخاله‌ی اوست.

۲۶۰- اگر پسر بزرگ حسن، با دختر برادر زن سلمان ازدواج کند، زن یعقوب چه نسبت جدیدی با او خواهد یافت؟

(۱) زن دایی همسر اوست.

(۲) خاله‌ی همسر اوست.

(۳) زن عموی همسر اوست.

(۴) عمه‌ی همسر اوست.

\* بر اساس اطلاعات زیر، به چهار پرسش بعدی پاسخ دهید.

اصغر، اکبر، امیر و امین، چهار برادر یک خانواده‌اند که اسامی آنان به ترتیب الفبا نوشته شده است. بزرگترین فرزند ۲۲ سال دارد و سه فرزند دیگر به ترتیب

۲۰، ۱۷ و ۱۴ سال دارند و هر کدام پیراهنی به یکی از رنگ‌های زرد، سبز، قرمز و آبی به تن کرده است. یکی از این افراد یک کمر بند، یکی دیگر یک

کراوات و یک نفر دیگر یک پاپیون نیز دارد. می‌دانیم:

امیر که کراوات ندارد، بزرگترین فرزند نیست و زرد نیز نپوشیده است.

آن که پاپیون دارد، پیراهنش آبی است و کوچکترین فرزند نیست.

فقط یک نفر از آن که کراوات دارد بزرگتر است که او هم قرمز نپوشیده است.

امین کوچکترین فرزند است. بزرگترین فرزند که اصغر نیست، کمر بند دارد.

آن که نه کمر بند دارد، نه کراوات و نه پاپیون، قرمز پوشیده است.

۲۶۱- چه کسی کراوات زده است؟

(۲) اکبر

(۱) اصغر

(۴) امین

(۳) امیر

۲۶۲- آن که پاپیون زده است، پیراهنی به چه رنگ دارد؟

(۲) سبز

(۱) زرد

(۴) قرمز

(۳) آبی

۲۶۳- آن که کمر بند دارد چند سال دارد؟

(۲) ۱۷

(۱) ۱۶

(۴) ۲۲

(۳) ۲۰

۲۶۴- با داده‌های بالا، کدام مورد به طور قطع معلوم نمی‌شود؟

(۲) رنگ پیراهن اکبر


(۱) سن امیر

(۴) رنگ پیراهن امین

(۳) سن اصغر

۲۶۵- میانگین وزنی قیمت تمام شده محصولات کارخانه را «الف» و میانگین وزنی قیمت فروش محصولات آن را «ب» می نامیم. کدام گزینه

درباره محصولات این کارخانه نادرست است؟ نمودار بر اساس پایان نه ماه نخست سال رسم شده است.




(۱) در دو ماهه نخست فصل تابستان، کارخانه در ضرر بوده است.

(۲) پرسودترین فصل سال برای کارخانه، فصل بهار بوده است.

(۳) در اوایل فصل زمستان، کارخانه تدریجاً زیان ده شده است.

(۴) در فصل پاییز، کارخانه سوددهی داشته است.

۲۶۶- موقعیت نقطه ها نسبت به دیگر شکل ها، در کدام گزینه متفاوت است؟






\* در دو سؤال پرسش بعدی تعیین کنید کدام گزینه با شکل های صورت سؤال تفاوت بیش تری دارد.

۲۶۷-








-۲۶۸






\* در دو پرسش بعدی، تعیین کنید کدام گزینه تقارنِ مدّنظر را نسبت به خط یا نقطه معلوم شده، بهتر کامل می کند.

-۲۶۹



-۲۷۰



ایران توننه  
توشه ای برای موفقیت

# منابع مناسب هوش و استعداد

## دوره دوم

