

# دفترچه سوال

## آزمون ۳ مرداد یازدهم تجربی

تعداد کل سوال‌های قابل پاسخ‌گویی: ۱۳۰ سوال

مدت پاسخ‌گویی به آزمون: ۱۶۰ دقیقه

نگاه به گذشته مهم است، اما نگاه به آینده مهم‌تر است. چرا؟

در بخش نگاه به گذشته به سراغ درس‌های سال گذشته می‌روید و می‌توانید چالش‌های خود را برطرف کنید. در بخش نگاه به آینده، شما می‌توانید یک یا چند درس از درس‌های سال آینده را پیش‌خوانی کنید. خواندن درس‌های جدید انگیزه‌ی بیشتری برای درس‌خواندن در تابستان ایجاد می‌کند. پیشرفت درسی را از همین تابستان آغاز می‌کنید.

نام درس	تعداد سوال	شماره سوال‌ها	زمان پاسخ‌گویی
زیست‌شناسی ۱	۲۰	۱-۲۰	۲۰ دقیقه
فیزیک ۱	۱۰	۲۱-۳۰	۱۵ دقیقه
شیمی ۱	۲۰	۳۱-۵۰	۲۰ دقیقه
ریاضی ۱	۲۰	۵۱-۷۰	۳۰ دقیقه
زیست‌شناسی ۲	۱۰	۷۱-۸۰	۱۰ دقیقه
فیزیک ۲	۱۰	۸۱-۹۰	۱۵ دقیقه
شیمی ۲	۲۰	۹۱-۱۱۰	۲۰ دقیقه
ریاضی ۲	۲۰	۱۱۱-۱۳۰	۳۰ دقیقه
مجموع	۱۲۰	----	۱۶۰ دقیقه

### گروه فنی و تولید

مدیر گروه	امیر رضا حکمت‌نیا
مسئول دفترچه	احسان پنجه شاهی
مستندسازی و مطابقت با مصوبات	مدیر گروه: محیا اصغری مسئول دفترچه: مهندس آزاده هاشمی
حرروف نگاری و صفحه آرایی	سیده صدیقه میر غیاثی
ناظر چاپ	حیدر محمدی

سوال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند، سوال‌هایی هستند که مشابه آن‌ها در امتحانات تشریعی مورد پرسش قرار می‌گیرد.

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به سایت [kanoon.ir](http://kanoon.ir) ، آدرس اینستاگرامی [@kanoon\\_11t](https://www.instagram.com/kanoon_11t) و آدرس تلگرامی [@kanoon](https://t.me/kanoon) مراجعه کنید.

وقت پیشنهادی: ۲۰ دقیقه

زیست‌شناسی ۱: صفحه‌های ۱ تا ۲۴

۱- در رابطه با یاخته‌های بافتی که سطح درونی مری در بدن انسان را پوشانده است، چند مورد صحیح است؟

(الف) غشای پایه در اتصال همه یاخته‌های آن به هم نقش دارد.

(ب) دارای فضای بین یاخته‌ای انگشتی در بین یاخته‌های خود می‌باشد.

(ج) یاخته‌های عمقی برخلاف یاخته‌های سطحی، دارای ظاهر مکعبی هستند.

(د) در هسته‌های هر یاخته، اطلاعات لازم برای تعیین صفات مشاهده می‌شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۲- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در ارتباط با نوعی لیپید که ..... ، می‌توان گفت ..... »

(۱) در ساختار آن اسید چرب شرکت کرده است - قطعاً دارای یک گروه فسفات در ساختار خود است.

(۲) در غشای یاخته‌های جانوری مشاهده می‌شود - ممکن نیست فاقد اسید چرب در ساختار خود باشد.

(۳) روغن‌ها و چربی‌ها انواعی از آن هستند - انرژی ذخیره شده در آن‌ها نسبت به گلوکز در جرم برابر، بیشتر است.

(۴) در ساختار انواعی از هورمون‌های بدن انسان شرکت دارد - همواره در دو لایه غشای یاخته‌ای دیده می‌شود.

۳- کدام گزینه عبارت زیر را در ارتباط با زیست‌شناسی نوین و زیست‌شناسی در خدمت انسان به درستی کامل می‌کند؟

«با توجه به ..... ، می‌توان دریافت که برای ..... ، می‌توان از ..... برخلاف ..... استفاده کرد. »

(۱) کل نگری - توضیح دادن علت ویژگی‌های یک سامانه - مطالعه اجزای سازنده آن - ارتباط اجزا با یکدیگر

(۲) پزشکی شخصی - تشخیص و درمان بیماری‌ها - بررسی وضعیت بیمار - اطلاعات دنا

(۳) حفاظت از بوم‌سازگانها - افزایش خدمات بوم‌سازگان - گیاهان - پروانه مونارک

(۴) تأمین انرژی تجدیدپذیر - جایگزینی سوختی با منشأ زیستی - دانه‌های روغنی - گازوئیل زیستی

۴- کدام گزینه در ارتباط با نوعی بافت پیوندی که عمدتاً یاخته‌های آن ظاهری مشابه یاخته‌های بافت ماهیچه صاف دارند، به درستی بیان شده است؟

(۱) برخلاف بافتی که معمولاً بافت پوششی را پشتیبانی می‌کند، دارای فضای بین یاخته‌ای انگشتی است.

(۲) یاخته‌های آن همانند یاخته‌های بافتی که سطح حفرات بدن را می‌پوشاند، با انواعی از گلیکوپروتئین‌ها در تماس است.

(۳) برخلاف نوعی بافت که در ساختار زردپی مشاهده می‌شود، دارای یاخته‌هایی با ظاهر متفاوت است.

(۴) برخلاف بافتی که نقش ضربه‌گیری دارد، دارای انواعی از پروتئین‌ها در ماده زمینه‌ای خود است.

۵- چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

«کانال‌های پروتئینی غشای هر یاخته ..... »

(الف) همگی به واسطهٔ فعالیت ریبوزوم‌ها و شبکه آندوبلاسمی صاف به وجود آمدند.

(ب) همانند بیشترین مولکول‌های تشکیل دهندهٔ غشا، می‌توانند مولکول‌های آب را عبور دهند.

(ج) برخلاف پروتئین‌های متصل به کلسترول، در سرتاسر عرض غشا کشیده شده‌اند.

(د) همگی با داشتن بخش کربوهیدراتی به برقراری اتصال فیزیکی میان یاخته‌ها و مولکول‌ها کمک می‌کنند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۶- کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«می‌توان گفت سطحی از سطوح سازمان‌یابی حیات که .....، نسبت به سطحی که ..... در موقعیت ..... قرار ندارد.»

(۱) در آن ممکن است چندین گونه دیده شود—افراد حاضر در آن همگی جزو یک گونه هستند، لزوماً—برابری

(۲) تعامل بین اجزای زنده و غیرزنده، برای دو میان بار مشاهده می‌شود—میزان خدمات آن به میزان تولیدکنندگی افراد حاضر در آن بستگی دارد

—بالاتری

(۳) در آن دو اندام مختلف برای نخستین بار به همکاری با هم می‌پردازند—در آن برای نخستین بار فعالیت آنزیم‌ها صورت می‌گیرد —

پایین‌تری

(۴) باکتری‌ها، توانایی حضور در آن سطح و سطوح قبل و بعد آن را ندارند—یاخته‌های عصبی و غیرعصبی در آن به تعامل و همکاری می‌پردازند —

پایین‌تری

۷- هر یاخته از غده معده یک فرد سالم و بالغ که .....

(۱) فعالیت آن تحت تأثیر هورمون گاسترین قرار می‌گیرد، در کاهش تجزیه نشاسته از طریق تحریب آمیلاز مؤثر است.

(۲) به ترشح نوعی یون قلیابی کننده سد محافظ در برابر آنزیم‌ها می‌پردازد، توانایی تولید ماده مخاطی نیز دارد.

(۳) منجر به افزایش مصرف ATP در یاخته‌های استوانه‌ای ریزپرزدار می‌شود، ظاهری استوانه‌ای شکل دارد.

(۴) قادر به ساخت انواعی از آنزیم‌ها برای تجزیه مواد است، در عمق غدد معده یافت می‌شود.

۸- انقباض ماهیچه‌های دیواره لوله گوارش دو نوع حرکت منظم را در آن ایجاد می‌کند. کدام عبارت در ارتباط با این دو نوع حرکت نادرست است؟

- (۱) حرکت دارای چندین حلقه انقباضی در واحد زمان، برخلاف حرکت دیگر، در محل آغاز گوارش شیمیایی پروتئین‌ها دیده نمی‌شود.
- (۲) حرکت مؤثرتر در ریزشدن ذرات غذایی، همانند حرکت دیگر، در محل فعالیت متنوع‌ترین آنزیم‌های گوارشی مشاهده می‌شود.
- (۳) حرکت مؤثرتر در پیشروع غذا، همانند حرکت دیگر، با انقباض هر دو نوع ماهیچه طولی و حلقوی لایه ماهیچه‌ای دیواره همراه است.
- (۴) حرکت دارای چند حلقه انقباضی در واحد زمان، برخلاف حرکت دیگر، تحت تأثیر تحریک دیواره لوله گوارش توسط محتويات ایجاد می‌شود.

۹- چند مورد درباره همه آنزیم‌هایی که درون معده یک فرد سالم و بالغ دیده می‌شود، صحیح است؟

- الف) توسط یاخته‌های اصلی غدد دیواره معده ساخته شده است.
- ب) تحت تأثیر اسید ترشح شده از یاخته‌های کناری فعال می‌شود.
- ج) به طور معمول در پی فرایند بروونرانی و با صرف انرژی از یاخته خود آزاد می‌شود.
- د) توسط یاخته‌های زنده بافتی با فضای بین یاخته‌ای اندک، تولید شده است.

۱۰- چند مورد از موارد زیر، در رابطه با اندامی در بدن انسان که در زیر و موازی با معده قرار دارد، صحیح است؟

- الف) محتويات گوارشی خود را تنها پس از مخلوط شدن با شیره صفراء، به دوازدهه می‌ریزد.
- ب) دارای ترشحاتی است که شیره معده را خنثی می‌کند.
- ج) پروتئازهای قوی و متنوعی را می‌سازد که تنها در دوازدهه فعالیت می‌کنند.

۱۱- هر بافتی در بدن یک انسان سالم و بالغ که واجد یاخته‌هایی ... است، می‌تواند ...

- (۱) دوکی‌شکل - به طور غیرارادی منقبض شود.
- (۲) استوانه‌ای شکل و غیرمنشعب - هسته‌(ها)ی غیرمرکزی در یاخته‌های خود داشته باشد.
- (۳) منشعب - پیام عصی را تولید و منتقل کند.
- (۴) با هسته مجاور غشا - در ذخیره انرژی نقش اصلی را ایفا کند.



۱۲- کدام گزینه درباره ساختار لوله گوارش صحیح است؟ (ترتیب لایه‌ها از خارج به داخل می‌باشد.)

- ۱) دومین لایه در ابتدای مری، دارای بخش‌های طولی، حلقوی و شبکه یاخته‌های عصبی می‌باشد.

- ۲) داخلی ترین لایه در معده، دارای یاخته‌هایی با توانایی ترشح آنزیم‌های گوارشی در عمق حفرات خود می‌باشد.

- (۳) سومین لایه، علاوه بر چسباندن دو لایه دیگر روی هم، نازکتر از لایه داخلی خود می‌باشد.

- ۴) خارجی ترین لایه، در تمام طول اندام قبیل از معده، در تشکیل پرده صفاق نقش دارد.

-۱۳- کدام گزینه ویژگی، حرکاتی، از لوله گوارش است که نقش پیشتری در مخلوط‌کنندگی محتویات لوله گوارش دارد؟

- ۱) هنگام عورتوده غذای از انتهای معده، دهان و عقب آن، حلقه انقباضی، دیده می‌شود.

- ۲) این حركات، در يك باخته‌های عصبي و سيس، گشاد شدن لوله گوارش، تشکیا، می‌شوند.

- (۳) ایجاد حلقه‌های انقباضی بین قسمت‌های شل، در پیش بردن توده غذایی نیز نقش دارد.

- ۴) ایجاد یک حلقه انقباضی در لوله، علاوه بر پیش بردن توده غذایی، نقش مخلوط کنندگی نیز دارد.

۱۴- به دنبال گشاد شدن دیواره ماهیچه‌ای حلق و در ضمن انجام فرایند بلع، کدام واقعه پیش از سایرین رخ می‌دهد؟

- ۱) رانده شدن غذا به سمت مری ۲) تغییر زاویه قرارگیری ایمیل گلوت

- ۳) اعمال فشار زیان پر روی توده غذا ۴) انقباض پاخته‌های ماهیچه اسکلتی مری

۱۵- بخششی، کسه‌ای شکل، در لوله گوارش، در دیواره خود جیرن خود را گیر، های، دارد که با پر شدن آن، باز می‌شوند. در مود پاخته‌های غدد این بخشش، کدام

مودهای نادست

الف) هر یاخته‌ای که وجود آن پرای جذب  $B_{12}$  حیاتی است، تنها یاخته‌ای است که در این بخش HCl ترشح می‌کند.

ب) هر پاخته‌ای که بیسین ترشح می‌کند، در بخش بیسین تری نسبت به پاخته‌دارای زوائد دندانه‌دار قرار گرفته است.

ج) هر یاخته‌ای که به کریبات ترشح می‌کند، حسین گلیزی، ای داد، که نسبت به هسته آن، به داخل، محاجا نزدیک‌تر است.

د) هر باخته‌ای، که هستهٔ کوی آن توسط اکین‌هارم احاطه شده، به نزد گتی‌بن باخته‌های این بخش متصاً شده است.

(١) «الف»، «ب»، «ج» و «د»

۲۷

٣) فقط «ب»

١٩

۱۶- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در یک فرد سالم ...»

(۱) در محل پایان گوارش پروتئین‌ها، همه کربوهیدرات‌ها برای جذب شدن گوارش می‌یابند.

(۲) آنزیم آغازگر تجزیه کربوهیدرات‌ها توسط سلول‌های پوششی مخاط لوله گوارش ترشح می‌شود.

(۳) آنزیم‌های آغازگر تجزیه کننده پروتئین‌ها، توانایی تجزیه آن‌ها به واحدهای سازنده‌شان را دارند.

(۴) در محل آغاز گوارش پروتئین‌ها، بیشترین گوارش شیمیایی فراوان‌ترین لیپیدهای رژیم غذایی ممکن نیست.

۱۷- در نوعی بیماری مرتبط با لوله گوارش، داخلی‌ترین لایه دیواره اندامی به علت برگشت محتویات اندام بعدی، آسیب می‌بیند. کدام مورد در خصوص

این بیماری، صحیح است؟

(۱) به علت اختلال در عملکرد بندارهای در سمت راست بدن ایجاد می‌شود.

(۲) افزایش فعالیت بزرگ‌ترین یاخته‌های مخاط معده موجب تشیدید آن می‌شود.

(۳) بافت پوششی آسیب دیده، در عمقی‌ترین لایه خود یاخته‌هایی بیشتر و بزرگ‌تر دارد.

(۴) خارجی‌ترین لایه دیواره اندام مورد آسیب در تمام طول خود در تشکیل نوعی پرده نقش دارد.

۱۸- در خصوص ساختار بافتی دیواره اندام کیسه‌ای شکل لوله گوارش، کدام مورد درست است؟

(۱) در لایه دوم از داخل به سمت خارج، یاخته‌هایی با توانایی تولید پیام عصبی و حفظ هم‌ایستایی وجود دارد.

(۲) در لایه دوم از خارج به سمت داخل، یاخته‌هایی چندهسته‌ای و با توانایی انقباض مکرر، به سه شکل سازماندهی شده‌اند.

(۳) در لایه اول از داخل به سمت خارج، یاخته‌هایی استوانه‌ای شکل، با توانایی ترشح هم‌زمان موسین و بیکربنات در غدد این اندام وجود دارد.

(۴) در لایه اول از خارج به سمت داخل، یاخته‌هایی با شکل‌های متنوع در بافت پیوندی سیستم، ماده زمینه‌ای چسبنده و سفیدرنگ را ترشح می‌کنند.

۱۹- کدام گزینه درباره غدد بزاقي بزرگ صحیح است؟

(۱) بزرگ‌ترین غده بزاقي، علاوه بر داشتن مجرای طویل، توسط استخوان فک پایین محافظت می‌شود.

(۲) پایین‌ترین غده بزاقي، دارای مجاور انتصابی در مجاورت جلویی‌ترین دندان‌های فک پایین است.

(۳) غده بزاقي با بیشترین تعداد مجراء، در قسمت عقبی خود ضخامت کمتری نسبت به بخش جلویی دارد.

(۴) عقبی‌ترین غده بزاقي، در بخش پایینی قطر کمتری داشته و دارای مجرای در سطح داخلی نوعی ماهیچه است.

۲۰- کدامیک از تغییرات زیر در حین فرایند بلع، غیر قابل انتظار است؟

(۱) چسبیدن زبان به سقف دهان

(۲) حرکت حنجره به سمت بالا

(۳) افزایش فاصله زبان کوچک و اپیگلوت

(۴) نزدیک شدن نوعی غضروف دو قسمتی به زبان کوچک

وقت پیشنهادی: ۱۵ دقیقه

۲۲ فقره های ۱ تا

۲۱- طول قد دختریچهای هنگام تولد  $50$  سانتی متر است. اگر آهنگ متوسط رشد قد دختریچه  $\frac{\text{nm}}{\text{s}}$  باشد، پس از گذشت  $20$  سال، قد دختر بچه

تقریباً به چند سانتی متر رسد؟ (هر سال را معادل با  $365$  روز در نظر بگیرید.)

۲۰۷ (۴)

۵۷ (۳)

۱۵۷/۲ (۲)

۱۰۷ (۱)

۲۲- داخل کره ای به شعاع  $10\text{cm}$ ، حفره ای کروی شکل به شعاع  $5\text{cm}$  وجود دارد. اگر حفره را از مایعی به چگالی  $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$  به طور کامل پُر کنیم،

مجموع جرم کره و مایع  $1\text{kg}$  می شود. چگالی ماده سازنده کره چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ ( $\pi = 3$ )

۲/۵۴ (۴)

۲/۲ (۳)

۲ (۲)

۱/۹۲۵ (۱)

۲۳- مقداری مایع درون یک ظرف استوانه ای شکل مدرج ریخته ایم و گلوله ای توپ را که چگالی ماده سازنده آن  $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$  است، درون ظرف می اندازیم.

گلوله به طور کامل در مایع فرو رفته و ارتفاع مایع درون ظرف  $15$  درصد افزایش می یابد. اگر چگالی مایع  $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$  باشد، جرم گلوله چند برابر جرم مایع

درون ظرف است؟ (فرض کنید مایعی از ظرف بیرون ریخته نشده باشد.)

$\frac{9}{20}$  (۴)

$\frac{3}{10}$  (۳)

$\frac{3}{20}$  (۲)

$\frac{1}{20}$  (۱)

۲۴- اگر حجم  $(m+2)$  کیلوگرم از مایع  $B$  دو برابر حجم  $m$  کیلوگرم از مایع  $A$  باشد و جرم  $V$  سانتی متر مکعب از مایع  $A$ ،  $20$  درصد کمتر از جرم  $1/5V$  سانتی متر مکعب از مایع  $B$  باشد،  $m$  برحسب کیلوگرم کدام است؟

۲ (۴)

$\frac{10}{7}$  (۳)

۳ (۲)

$\frac{3}{2}$  (۱)

۲۵- سطح یک برکه آب بر اثر تبخیر هر هفته به طور متوسط  $3/024\text{cm}^3$  پایین می رود. اندازه آهنگ تغییر ارتفاع آب این برکه برابر با چند  $\frac{\mu\text{m}}{\text{ms}}$  است؟

$5 \times 10^{-5}$  (۴)

$5 \times 10^{-4}$  (۳)

$2 \times 10^{-5}$  (۲)

$2 \times 10^{-4}$  (۱)

۲۶- تندی نور در هوا  $\frac{m}{s}$  است. بر حسب نمادگذاری علمی، تندی نور در هوا در SI کدام است؟

- (۱)  $3 \times 10^6$       (۲)  $3 \times 10^8$       (۳)  $3 \times 10^{10}$       (۴)  $3 \times 10^{17}$

۲۷- فاصله منظومه شمسی تا نزدیکترین ستاره بعد از خورشید،  $m^{16} \times 10^4$  است. این فاصله بر حسب یکای نجومی (AU) چقدر است؟

(میانگین فاصله زمین تا خورشید  $m^{11} \times 10^3$  است.)

- (۱)  $\frac{8}{3} \times 10^2$       (۲)  $\frac{8}{3} \times 10^5$       (۳)  $\frac{3}{8} \times 10^2$       (۴)  $\frac{3}{8} \times 10^5$

۲۸- استوانه مدرجی از مایع با چگالی  $\frac{g}{cm^3} / 5$  پر شده است. اگر جسمی توپر به جرم  $200 g$  و چگالی  $2 / 5$  را به آرامی وارد این استوانه کنیم، چند گرم مایع از استوانه سرریز می‌شود؟

- (۱) ۱۶۰      (۲) ۱۲۰      (۳) ۸۰      (۴) ۲۴۰

۲۹- کمیت‌های نیرو، دما و فشار به ترتیب ..... ، ..... و ..... می‌باشند.

- (۱) برداری، اصلی / نرده‌ای، اصلی / برداری، فرعی  
 (۲) برداری، اصلی / برداری، فرعی / نرده‌ای، اصلی  
 (۳) برداری، فرعی / نرده‌ای، اصلی / نرده‌ای، فرعی  
 (۴) برداری، فرعی / برداری، اصلی / برداری، اصلی

۳۰- چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

الف) دما، جریان الکتریکی و جرم، همگی از کمیت‌های اصلی SI هستند.

ب) طول، حجم و فشار، همگی از کمیت‌های فرعی SI هستند.

پ) یکای SI انرژی برابر با  $\frac{kg}{m.s^2}$  است.

ت) طول و سرعت از کمیت‌های برداری هستند.

- (۱) ۱      (۲) ۲      (۳) ۳      (۴) ۴

**بران توشه**

**توشه‌ای برای موفقیت**

**۳۱- کدام گزینه نادرست است؟**

- ۱) پاسخ به پرسش «جهان کنونی چگونه شکل گرفته است؟» در قلمرو علم تجربی می‌گجد.
- ۲) دو فضایی‌مای وویجر ۱ و ۲ در سال ۱۹۷۷ میلادی برای شناخت بیشتر سامانه خورشیدی، سفر طولانی و تاریخی خود را آغاز کردند.
- ۳) اولین عناصر ایجاد شده پس از مهبانگ، عنصرهای H و He بودند که با کاهش دما و گذشت زمان، سحابی‌ها را ایجاد کردند.
- ۴) انرژی گرمایی و نور خیره‌کننده خورشید به دلیل تبدیل هلیم به هیدروژن در واکنش‌های هسته‌ای است.

**۳۲- کدام گزینه درباره مقایسه هشت عنصر فراوان‌تر سیاره‌های زمین و مشتری درست است؟**

- ۱) در سیاره زمین برخلاف سیاره مشتری، عنصر نافلزی وجود ندارد.
- ۲) گوگرد و اکسیژن در هر دو سیاره زمین و مشتری یافت می‌شوند که درصد فراوانی آن‌ها در سیاره مشتری بیشتر است.
- ۳) از بین دو سیاره زمین و مشتری، سیاره بزرگ‌تر عمدتاً از گاز تشکیل شده است.
- ۴) تفاوت درصد فراوانی دو عنصر فراوان‌تر سیاره مشتری، کمتر از این تفاوت در سیاره زمین است.

**۳۳- کدام گزینه نادرست است؟**

- ۱) انسان اولیه با نگاه به آسمان و مشاهده ستارگان در پی فهم نظام و قانونمندی در آسمان بوده است.
- ۲) نوع و میزان فراوانی عنصرها در دو سیاره زمین و مشتری متفاوت است.
- ۳) وویجر ۱ و ۲ مأموریت داشتند شناسنامه فیزیکی و شیمیایی را از همه سیاره‌های سامانه خورشیدی تهیه کنند و به زمین بفرستند.
- ۴) با بررسی نوع و مقدار عنصرهای سازنده برخی سیاره‌های سامانه خورشیدی و مقایسه آن با عنصرهای سازنده خورشید می‌توان به درک بهتری از چگونگی تشکیل عنصرها دست یافت.

**۳۴- کدام گزینه در رابطه با دومین عنصر گروه دوم جدول تناوبی درست است؟**

- ۱) دارای سه ایزوتوپ است که فراوانی ایزوتوپ با عدد جرمی ۲۴ از دو ایزوتوپ دیگر آن کمتر است.
- ۲) در پایدارترین ایزوتوپ آن شمار پرتوون‌ها با شمار نوترون‌ها برابر است.
- ۳) واکنش پذیری ایزوتوپ با عدد جرمی ۲۶، با گاز کلر در شرایط یکسان بیشتر از این خصلت در دو ایزوتوپ دیگر در واکنش با گاز کلر است.
- ۴) برای جداسازی ایزوتوپ‌های آن از یکدیگر، روش‌های شیمیایی مناسب‌تر از روش‌های فیزیکی است.



۳۵- تفاوت مجموع ذرهای زیراتمی در  $^{+3+}_{\text{Fe}}$  و  $^{-3-}_{\text{P}}^{15}$  چند برابر شمار ذرهای زیراتمی در پایدارترین رادیوایزوتوپ هیدروژن است؟

۸/۲۵ (۲

Y/D (1)

11 (F)

1° (۳)

۳۶- همه گزینه‌های زیر درست هستند، به جز ...

۱) همه ایزو توپ‌های ناپایدار هیدروژن، ساختگی نیستند ولی تمام ایزو توپ‌های ساختگی هیدروژن، ناپایدارند.

۲) در همه ایزوتوپ‌های ناپیدار هیدروژن، رابطه  $n \geq 1/p^5$  بیقرار است.

۳) با افزایش عدد جرمی در ایزوتوبهای ناپایدار هیدروژن، نیم عمر همواره کاهش می‌یابد.

۴) تعداد این و توپ‌های طبیعی هیدروژن با تعداد این و توب‌های طبیعی منزیم برابر است.

۳۷- تعداد الکترون‌های یون  $X^{+}$  برابر ۷۹ است. اگر تعداد نوترون‌های اتم  $X$ ،  $1/5$  برابر تعداد پروتون‌های آن باشد، عدد جرمی  $X$  کدام است؟

(X نماد شیمیاب، عنصر، فرض، است.)

198 (5)

۵۰۰ (۱)

194 (c)

۱۹۶ (۳)

۳۸- تفاوت شمار الکترون‌ها و نوترون‌ها در یون  $A^{4+}$ ،  $\frac{1}{16}$  برابر تفاوت شمار پروتون‌ها و نوترون‌ها در اتم  $A^{90}$  است. شمار نوترون‌های

موجود در هر اتم A<sup>90</sup>, جند پایه شمار نوترون‌ها در هر اتم از ایزوتوپ طبیعی، هیدروژن یا کمترین فراوانی، خواهد بود؟

۱۰۸

۲۴ (۱)

57

۲۶۳

۳۹- کتاب گزینه دست است

کل عناصر شناخته شده، ساختگی هستند.

کل عناصر شناخته شده، ساختگی هستند.

مان بیماری‌های غده تیروئید استفاده می‌شود.

<sup>(۳)</sup> از این سه شناخته شده‌ترین فلزات تمدن ایلاریون آن به عنوان سه‌خوش در باکتری، اتم استفاده می‌شوند.

<sup>16</sup> ملکه عربی، از آنکه این اتفاق را در این شرایطی بگذراند، نیز می‌گفت: «این اتفاق را بگذراند و بگوییم که این اتفاق را بگذراند».

**۴۰- کدام گزینه نادرست است؟**

- ۱) تکنسیم نخستین عنصر ساخت بشر است که نیم عمر آن کم بوده و نمی‌توان آن را برای مدت طولانی ذخیره کرد.
- ۲) در روش تشخیص سرطان بهوسیله گلوکز نشان‌دار، در محل توده‌های سرطانی هر دو نوع گلوکز معمولی و نشان‌دار مشاهده می‌شود.
- ۳) مهم‌ترین مرحله از چرخه تولید سوخت هسته‌ای، غنی‌سازی ایزوتوپی است.
- ۴) اغلب هسته‌هایی که نسبت شمار پروتون‌ها به نوترون‌های آن‌ها برابر یا کمتر از  $\frac{2}{3}$  باشد، ناپایدارند.

**۴۱- اختلاف شمار عناصر با نماد شیمیایی دو حرفی و عناصر با نماد شیمیایی یک حرفی در دوره چهارم جدول دوره‌ای کدام است؟**

۱۳ (۲)

۱۴ (۱)

۱۱ (۴)

۱۲ (۳)

**۴۲- کدام گزینه نادرست است؟**

- ۱) دانشمندان همواره در پی یافتن سنجه‌ای مناسب و در دسترس برای اندازه‌گیری جرم اتم‌ها بوده‌اند.

۲) جرم پروتون و نوترون در حدود  $1\text{ amu}$  و جرم الکترون حدود  $1.67 \times 10^{-3}\text{ amu}$  است.

۳) در نمادهای  ${}^{\pm 1}\text{H}$  و  ${}^{+1}\text{p}$ ، عدد بالایی جرم نسبی ذره را نشان می‌دهد.

۴) جرم اتمی میانگین هیدروژن اندکی از جرم پروتون بیشتر است.

**۴۳- کدام گزینه نادرست است؟**

- ۱) نسبت شمار ایزوتوپ‌های طبیعی منیزیم به ایزوتوپ‌های طبیعی لیتیم برابر  $1/5$  است.

۲) ایزوتوپی از منیزیم که شمار الکترون‌ها و نوترون‌های آن یکسان است، درصد فراوانی بیشتری دارد.

۳) اگر از هر  ${}^{60}\text{X}$  که دارای دو ایزوتوپ است، تعداد  $45$  اتم  ${}^a\text{X}$  باشد، درصد فراوانی  ${}^b\text{X}$  برابر  $25$  درصد خواهد بود.

۴) فراوانی ایزوتوپی از اورانیم ( ${}^{92}\text{U}$ ) که دارای  $146$  نوترون است، در مخلوط طبیعی از  $70\%$  درصد کمتر است و اغلب به عنوان سوخت در راکتورهای اتمی کاربرد دارد.

۴۴- کدام موارد از عبارت‌های زیر درست هستند؟

الف) برای تعیین جرم اتم‌ها از یک مقیاس جرم نسبی استفاده می‌شود.

ب) با تعریف amu، جرم اتمی عناصر و ذره‌های زیراتومی اندازه‌گیری شده است.

پ)  $\frac{1}{12}$  جرم اتمی میانگین ایزوتوپ‌های کربن را به عنوان یکای جرم اتمی در نظر گرفته و با amu نشان می‌دهند.

ت) جرم اتمی میانگین هیدروژن برابر  $1.08 \times 10^{-23}$  است.


(۲) (الف) و (ت)

(۱) (الف) و (ب)

(۴) (پ) و (ت)

(۳) (ب) و (پ)

۴۵- اگر تعداد اتم‌های اکسیژنی که در  $5\text{ g}$  مول از مولکول‌های  $\text{N}_x\text{O}_y$  وجود دارد، در کنار یکدیگر زنجیره‌ای به طول  $3.612 \times 10^{11}\text{ km}$  کیلومتر مطابق شکل زیر تشکیل بدهند، کدام گزینه فرمول مولکولی آن را به درستی نشان می‌دهد؟ ( $1\text{ pm} = 10^{-12}\text{ m}$ )



(۱) NO

(۲)  $\text{NO}_2$

(۳)  $\text{N}_2\text{O}_3$

(۴)  $\text{N}_2\text{O}_4$

۴۶- مخلوطی به جرم ۸ گرم شامل  $\text{CH}_3\text{OH}$  و  $\text{C}_3\text{H}_4$  شامل  $7.6 \times 10^{23}$  اتم هیدروژن است. شمار اتم‌های کربن در این مخلوط به تقریب کدام است؟ ( $H=1, C=12, O=16: \text{g.mol}^{-1}, N_A = 6 \times 10^{23}$ )

$$1 / 9.2 \times 10^{22}$$

(۲)  $1 / 4.4 \times 10^{22}$

$$1 / 9.2 \times 10^{23}$$

(۳)  $1 / 4.4 \times 10^{23}$

۴۷- جدول زیر فراوانی ایزوتوپ‌های عناصر منیزیم و کلر را نشان می‌دهد. اگر شمار یون‌ها در یک نمونه  $1/59$  گرمی از منیزیم کلرید برابر با

$3 \times 10^{22}$  باشد، تفاوت شمار الکترون‌ها و نوترون‌ها در چند درصد از یون‌های موجود در این نمونه برابر با ۳ است؟ (جرم اتمی میانگین

(Mg = 12, Cl = 17) (عدد اتمی:  $\text{Mg} = 12, \text{Cl} = 17$ )

$^{37}\text{Cl}$	$^{35}\text{Cl}$	$^{26}\text{Mg}$	$^{25}\text{Mg}$	$^{24}\text{Mg}$	atom
F	$^{37}\text{F}$	۱۵	$^{25}\text{F}'$	$^{24}\text{F}''$	فراوانی(درصد)

(۱) ۲/۲

(۲) ۳/۳

(۳) ۴/۴

(۴) ۵/۵




۴۸- کدام مقایسه در مورد انرژی امواج الکترومغناطیسی به درستی صورت گرفته است؟

- ۱) پرتوهای گاما < ریزموچها < پرتوهای فروسرخ
- ۲) ریزموچها < امواج رادیویی < امواج مرئی
- ۳) نور مرئی < پرتوهای فرابنفش < پرتوهای گاما
- ۴) پرتوهای ایکس < پرتوهای فروسرخ < موج‌های رادیویی

۴۹- با توجه به شکل زیر، کدام گزینه درست است؟

۱) با عبور نور نشر شده از لیتیم سولفات در شعله از یک منشور،



۳ در تصویری از خورشید که با استفاده از دوربین‌هایی حساس به پرتوهایی به طول موج کوتاه‌تری از رنگ G گرفته شده است، خورشید به‌طور

عمده به شکل مخلوطی از رنگ‌های C تا G مشاهده می‌شود.

۴ پرتو B نسبت به پرتو D، توانایی حمل انرژی بیشتری دارد.


۵۰- کدام گزینه نادرست است؟

- ۱) اگر فاصله بین سه قله متواالی پرتو یک موج الکترومغناطیسی برابر با  $700$  نانومتر باشد، آن پرتو در گستره فرابنفش قرار خواهد گرفت.
- ۲) شمار خطوط طیف نشری خطی نخستین عنصر دوره سوم جدول تناوبی با عدد اتمی نخستین عنصر گروه ۱۶ جدول تناوبی برابر است.
- ۳) اختلاف طول موج پرتو گسیل شده از چشمی کنترل تلویزیون از ریزموچ‌ها، نسبت به اختلاف طول موج آن از پرتوهای فرابنفش، بیشتر است.
- ۴) انرژی رنگ شعله نخستین عنصر گروه ۱۱ جدول تناوبی، نسبت به انرژی رنگ شعله نخستین عنصر دوره دوم جدول تناوبی، بیشتر است.

وقت پیشنهادی: ۳۰ دقیقه

ریاضی ۱: صفحه‌های ۱ تا ۳۵

۵۱- اگر  $A = [-1, +\infty)$  و  $B = (3, 11]$  و  $C = (-10, 7]$  باشند، مجموعه هاشور خورده در نمایش هندسی زیر، کدامیک از بازه‌های زیر است؟

(۱)  $(-10, -1)$ (۲)  $(-10, -1]$ (۳)  $(-10, 3)$ (۴)  $(-10, 3]$ 

۵۲- در یک کلاس ۴۳ نفره دوازدهم ریاضی، ۳۱ نفر به مهندسی نرم افزار و ۲۵ نفر هم به مهندسی برق علاقه دارند. اگر ۷ نفر هم به هیچ کدام از این دو رشته علاقه‌مند نباشند، تعداد افراد علاقه‌مند به هر دو رشته کدام است؟




(۱) ۱۸

(۲) ۲۱

(۳) ۱۹

(۴) ۲۰

۵۳- در الگوی شکل مقابل، تعداد نقاط شکل چندم برابر ۱۹۲ است؟



(۱) ۱۱

(۲) ۱۲

(۳) ۱۳

(۴) ۱۴

۵۴- اگر  $A_n = \left( \frac{n}{n+1}, \frac{n+1}{n} \right)$  و حاصل  $A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_n$  به صورت بازه  $(a, b)$  باشد، حاصل  $b - a$  کدام است؟

$$\frac{3}{5} \quad (1)$$

$$\frac{21}{11^{\circ}} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \quad (3)$$

$$\frac{12}{11} \quad (4)$$

۵۵- در دنباله حسابی  $\dots, 4^x, 3, 16^x$  جمله بیستم کدام است؟

$$21 \quad (1)$$

$$65 \quad (2)$$

$$19 \quad (3)$$

$$63 \quad (4)$$

۵۶- تعداد جملات منفی دنباله  $a_n = n^2 - 7n + 10$ ، با تعداد جملات منفی دنباله  $b_n = \frac{n-a}{n+2a}$  برابر است. حدود  $a$  کدام است؟



$$[-2, 4] \quad (1)$$

$$\left[ -\frac{3}{2}, 3 \right] \quad (2)$$

$$\left[ -2, -\frac{3}{2} \right) \cup (3, 4] \quad (3)$$

$$\left[ -\frac{3}{2}, -1 \right) \cup (2, 3] \quad (4)$$

۵۷- دنباله هندسی ...،  $\frac{1}{\lambda}$ ,  $\frac{1}{4\sqrt{2}}$  چند جمله کمتر از ۴ دارد؟

۹ (۱)

۱۰ (۲)

۱۱ (۳)

۱۲ (۴)

۵۸- در یک دنباله ،  $a_1 = 4$  و برای  $n \geq 1$  داریم:  $a_{n+1} = 2a_n + 1$ ; حاصل  $a_1 - a_8$  کدام است؟


۶۲° (۱)

۳۲° (۲)

۳۱° (۳)

۶۴° (۴)

۵۹- اگر مساحت مثلث مقابل برابر ۵ واحد باشد،  $\sin \alpha$  کدام است؟

 $\frac{3}{\sqrt{14}}$  (۱) $\frac{5}{6}$  (۲) $\frac{2}{3}$  (۳) $\frac{\sqrt{11}}{6}$  (۴)

۶۰- حاصل عبارت  $A = 2\sin^2 30^\circ + \cos 60^\circ - \tan 45^\circ$  کدام است؟

توشه‌ای برای موفقیت

(۱) صفر

۲ (۲)

 $\frac{3}{2}$  (۳) $\frac{1}{2}$  (۴)

## ریاضی (۱) – آشنا

۶۱- اگر مجموعه‌های  $A$ ،  $B$  و  $C$  را به صورت  $C = Z \cup (R - Q)$  و  $B = W \cap Z$ ،  $A = R - Z$  تعریف کنیم، کدام گزینه نادرست است؟

$$A \cap B = \emptyset \quad (1)$$

$$C \subseteq (A \cup B) \quad (2)$$

$$B - C = \emptyset \quad (3)$$

$$A \cup C = R \quad (4)$$

۶۲- کدام گزینه‌ی زیر درست نیست؟

$$[-1, 2] \subseteq [-1, 2] \quad (1)$$

$$\emptyset \subseteq (-15, 1] \quad (2)$$

$$\{-2, 1\} \subseteq [-3, 0] \quad (3)$$

$$[3, 5) \neq (3, 5] \quad (4)$$

۶۳- اگر نمایش مجموعه‌های  $A$  و  $B$  به صورت بازه‌های  $A = [-1, 2]$  و  $B = (-3, a]$  و مجموعه‌ی  $A \cap B$  غیر تهی باشد، آنگاه مجموعه‌ی

تمام مقادیر ممکن برای  $a$ ، کدام است؟

$$\{a | a \geq -1\} \quad (1)$$

$$\{a | -1 \leq a < 2\} \quad (2)$$

$$\{a | a < -3\} \quad (3)$$

$$\{a | -2 < a < -1\} \quad (4)$$

۶۴- چند تا از مجموعه‌های زیر متناهی نیست؟

**الف)** مجموعه‌ی اعداد طبیعی که مضرب ۴ باشند و لی مضرب ۲ نباشند.

**ب)** مجموعه‌ی اعداد صحیح مثبتی که در تقسیم بر ۳ باقی‌مانده‌ی ۱ دارند.

**پ)** مجموعه‌ی کوچکترین عدد صحیح بزرگ‌تر از  $-1$

**ت)** مجموعه‌ی اعداد گویایی که مربعشان با خودشان برابر است.

(۴) چهار

(۳) سه

(۲) دو

(۱) یک

۶۵- اگر  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  مجموعه مرجع،  $A = \{4, 5, 6\}$  و  $B' = \{1, 2, 3, 4\}$  باشند، آنگاه مجموعه‌ی  $A - B$  چند عضو دارد؟

- (۱) ۱ عضو      (۲) ۲ عضو      (۳) ۳ عضو      (۴) ۴ عضو

۶۶- اگر  $n(A \cup B) = ۲۰$  و  $n(A' \cup B') = ۳۰$  ،  $n(B) = ۳۵$  ،  $n(U) = ۵۰$  اگر  $n(A')$  کدام است؟

- (۱) ۳۵      (۲) ۴۰      (۳) ۴۵      (۴) ۲۰

۶۷- در دنباله‌ی درجه‌ی دوم ...  
۱۰, ۶, ۳, ۱، اگر هر جمله را با جمله‌ی قبل از خودش جمع کنیم، جمله‌ی بیست و پنجم دنباله‌ی جدید کدام است؟

- (۱) ۶۷۶      (۲) ۶۲۵      (۳) ۵۷۶      (۴) ۴۰۰


۶۸- در دو دنباله‌ی حسابی به صورت‌های ...  
۱۲, ۷, ۲ و ...  
۱۴, ۱۱, ۸، چند عدد سه رقمی مشترک وجود دارد؟

- (۱) ۵۸      (۲) ۵۹      (۳) ۶۰      (۴) ۶۱

۶۹- در مثلث قائم‌الزاویه‌ی  $ABC$ ، اگر  $\widehat{A} = ۹۰^\circ$  باشد، حاصل  $\sin^r B + \sin^r C = ۱ +$  کدام است؟

- (۱) ۱      (۲) ۲      (۳) ۳      (۴) ۴

۷۰- یک بالن مستقیماً بالای سر یک مشاهده‌کننده در ارتفاع ۵۰۰ متری قرار دارد. بعد از ۱۵ دقیقه، ارتفاع بالن ۴۰۰ متر افزایش یافته و زاویه‌ی آن با مشاهده‌کننده  $45^\circ$  می‌شود. سرعت افقی متوسط این بالن (در امتداد زمین) چند متر بر ثانیه است؟



# ایران توشه

توشه‌ای برای موفقیت

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۵)

وقت پیشنهادی: ۱۰ دقیقه

زیست‌شناسی ۲: صفحه‌های ۱ تا ۱۵

۷۱- بزرگترین لوب مخ و لوبي از مخ که از نمای بالا دیده نمی‌شود، به ترتیب با ..... و ..... شیار عمیق در تماس‌اند.

۱-۲ (۴)

۳-۲ (۳)

۲-۳ (۲)

۳-۳ (۱)

۷۲- کدام گزینه در مورد دستگاه عصبی مرکزی و عوامل حفاظت از آن به درستی بیان شده است؟

(۱) لایه‌ای از پرده‌های منژ از که از هر دو طرف با مایع ضربه‌گیر در تماس است دارای زوائدی به سمت نازک‌ترین پرده منژ است.

(۲) درون نخاع برخلاف درون مغز، قسمت‌های حاوی جسم یاخته‌های عصبی مشاهده می‌شود.

(۳) رگ‌های بین پرده‌های منژ با ضخیم‌ترین پرده منژ مستقیماً در تماس هستند.

(۴) پرده‌ای از منژ که به‌طور مستقیم با مغز در تماس است برخلاف ضخیم‌ترین پرده در مجاورت عروق خونی قرار ندارد.

(مشابه سوال ۱ کتاب پرکار)

۷۳- بدنبال ثبت اختلاف پتانسیل ۱۵+ میلیولت در منحنی پتانسیل عمل قطعاً .....

(۱) پتانسیم در جهت خلاف شب غلظت از فضای بین یاخته‌ای خارج می‌شود.

(۲) سدیم از طریق دو نوع کاتال وارد یاخته عصبی می‌شود.

(۳) دریچه کanal دریچه‌دار پتانسیمی به سمت داخل یاخته باز است.

(۴) فعالیت نوعی پروتئین غشایی با توانایی مصرف ATP افزایش می‌یابد.

۷۴- کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«توار مغزی جریان الکتریکی ثبت شده یاخته‌هایی است که .....»

(۱) تنها یاخته‌های تشکیل‌دهنده بافت عصبی هستند.

(۲) با ساخت غلاف میلین، سبب افزایش سرعت هدایت پیام عصبی می‌شوند.

(۳) همواره پیام‌ها را از اندام‌ها به‌سوی بخش مرکزی دستگاه عصبی می‌آورند.

(۴) دارای بخشی می‌باشند که علاوه بر داشتن هسته می‌تواند پیام نیز دریافت کند.

۷۵- در دستگاه عصبی انسان در ارتباط با فراوان ترین یاخته‌های بافت عصبی، چند مورد زیر نادرست است؟

الف) فاقد جابه‌جایی یون در عرض غشا خود نمی‌باشند.

ب) به‌طور مستقیم در حفظ همایستایی سیتوپلاسم یاخته‌های عصبی نقش دارند.

ج) برخی از آنها در برابر تغییر اختلاف پتانسیل نورون‌ها، مانع را ایجاد می‌کنند.

د) به دور هر رشته عصبی می‌پیچند و غلاف میلین را ایجاد می‌کنند.

۱ (۴) ۲ (۳) ۳ (۲) ۴ (۱)

۷۶- کدام گزینه در ارتباط با سیناپس‌ها به نادرستی بیان شده است؟

(۱) در هر سیناپس تحریکی، نفوذ‌پذیری غشای یاخته پس‌سیناپسی تغییر می‌کند.

(۲) در هر سیناپس فعال، تغییر پتانسیل الکتریکی در یاخته پس‌سیناپسی دیده می‌شود.

(۳) در هر سیناپس مهاری، میزان مولکول‌های ناقل درون فضای سیناپسی با مصرف ATP تغییر می‌کند.

(۴) در هر سیناپس ناقل عصبی سبب تغییر شکل مولکول‌های گیرنده می‌شود.

۷۷- هنگام بررسی مغز انسان و گوسفند \_\_\_\_\_، قطعاً نمی‌تواند ....

- (۱) لوبی از مخ که از سایر لوب‌ها کوچکتر است – با مخچه در تماس باشد.
- (۲) لوبی از مخ که از بالا دیده نمی‌شود – با سه نوع لوب دیگر مغز مرز مشترک داشته باشد.
- (۳) بخشی که در تنظیم دمای بدن، تشنجی و گرسنگی نقش دارد – پایین‌تر از مرکز ترشح بzac و اشک قرار داشته باشد.
- (۴) هر بخشی که نیمه‌های مشابه آن توسط رابط یا رابطه‌ایی به یکدیگر متصل شده است – پردازش نهایی را در قشر خود انجام دهد.

(مشابه فعالیت صفحه ۳ کتاب درسی)

۷۸- با توجه به مطالب کتاب درسی، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر صحیح می‌باشد؟

«نوعی نورون که ..... می‌تواند ..... »

- (۱) جسم سلولی گلابی شکل دارد – از طریق دارینه با نورون رابط سیناپس دهد.
- (۲) محل خروج آکسون و دندریت آن از جسم سلولی از یک نقطه است – تنها در جسم سلولی آن اندامک تولیدکننده ATP مشاهده شود.
- (۳) تعداد میلیون‌های آکسون آن می‌تواند از دندریت کمتر باشد – دارای هسته یاخته در اطراف رشته‌های خود باشد.
- (۴) کوچکترین اندازه را در میان نورون‌ها دارد – همواره فاقد میلیون باشد.

۷۹- در حالت پنتسیل عمل وقی منحنی پنتسیل درون سلول رو به بالا حرکت می‌کند جله‌جاشدن یون‌ها با چه روش‌های انجام می‌شود؟

(مشابه سوال ۵ کتاب پرکار)

- |             |                |                     |                |
|-------------|----------------|---------------------|----------------|
| الف) اسمز   | ب) انتقال فعال | ج) انتشار تسهیل شده | د) درون‌بری    |
| (۱) الف و ب | (۲) ب و ج      | (۳) ب، ج و د        | (۴) الف، ب و ج |

۸۰- چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«مطابق با اطلاعات کتاب درسی، هر ساختاری از مغز انسان که در ..... نقش دارد، به طور حتم .....»

الف) تنظیم فشار خون – با سامانه کناره‌ای ارتباط مستقیم دارد.

ب) حرکت بدن – نسبت به پل‌مغزی اندازه بزرگ‌تری دارد.

ج) تنظیم تنفس – جلوی ساختاری که بخشی به نام کرمینه دارد، قرار دارد.

د) پردازش اطلاعات – دارای اتصالات سیناپسی میان نورون‌های خود است.

۱ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)



بیانیه

آموزشی

گلستان

فنا

وقت پیشنهادی: ۱۵ دقیقه

فیزیک ۲: صفحه‌های ۱۰ تا ۱۱

۸۱- در اثر مالش، بار الکتریکی خالص جسمی نارسانا  $2\mu C$  می‌شود کدام گزینه درباره این جسم درست است؟ ( $e = 1/6 \times 10^{-19} C$ ) (مشابه سوال ۷ کتاب پرکندر)(۱) این جسم دارای  $12/5 \times 10^{12}$  پروتون است.(۲) این جسم در اثر مالش  $2 \times 10^6$  پروتون دریافت کرده است.(۳) تعداد پروتون‌های این جسم،  $12/5 \times 10^{12}$  تا بیشتر از تعداد الکترون‌های آن است.(۴) این جسم در اثر مالش  $2 \times 10^6$  الکترون از دست داده است.۸۲- بارهای الکتریکی نقطه‌ای  $q_1$  و  $q_2$  در فاصله  $d$  از یکدیگر قرار دارند و بردار نیروی الکتریکی که بار  $q_1$  به بار  $q_2$  وارد می‌کند، در SI به صورت

$$\vec{F}_{12} = \frac{4}{\pi} \frac{\vec{i}}{5j} - \frac{4}{\pi} \frac{\vec{j}}{5i}$$


مطابق با کدام گزینه می‌شود؟

$$7/5\vec{i} - 2/5\vec{j}$$

$$-4/8\vec{i} + 1/6\vec{j}$$

$$-6/4\vec{i} - 2/5\vec{j}$$

$$-7/5\vec{i} + 2/5\vec{j}$$

۸۳- در شکل زیر،  $F$  نیروی خالص وارد بر بار  $q_3$  از طرف بارهای  $q_1$  و  $q_2$  است. اگر بردار  $F$  موازی خط واصل بین دو بار  $q_1$  و  $q_2$  باشد، بار  $q_1$  چند میکروکولن است؟

$$2 \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$-2 \quad (3)$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

۸۴- یکبار پارچه ابریشمی را با میله‌ای چوبی مالش می‌دهیم و در مرحله بعد میله‌ای شیشه‌ای را با پارچه کتان مالش می‌دهیم در مرحله اول بار کدام



جسم مثبت و در مرحله دوم بار کدام جسم منفی می‌باشد؟ (مشابه سوال ۶ کتاب پرکندر)

۱) پارچه ابریشمی، میله شیشه‌ای

۲) میله چوبی، میله شیشه‌ای

۳) پارچه ابریشمی، پارچه کتان

۴) میله چوبی، پارچه کتان

انتهای مثبت سری
شیشه
ابریشم
چوب
پارچه کتان
انتهای منفی سری

-۸۵- کره رسانای کوچکی دارای بار الکتریکی مشتث است. اگر بار این کره در اثر از دست دادن تعداد  $5 \times 10^{-5}$  کلtron، ۴ برابر شود، بار اولیه آن چند

$$\text{میکروکولن بوده است؟} \quad (e = 1/6 \times 10^{-13} \mu\text{C})$$


۳ (۴)

۹ (۳)

۴ (۲)

۱۲ (۱)

-۸۶- چهار ذره باردار، مطابق شکل قرار دارند. اگر نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار  $q_4$  برابر  $\vec{F}_T = [(\sqrt{7} - 2)N] \vec{i}$  باشد،  $q_2$  چند میکروکولن است؟



$$(k = 9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2})$$

-۱۰ (۱)

-۵ (۲)

۵ (۳)

۱۰ (۴)

-۸۷- دو بار ناهم‌نام و هماندازه در فاصله  $r$  از یکدیگر ثابت شده‌اند. چند برابر بار مشتث را به هر دو بار اضافه کنیم تا با دو برابر کردن فاصله بین دو بار،



اندازه نیروی الکتریکی بین آن‌ها ۲ برابر شود؟

 $\sqrt{2}$  (۴) $\sqrt{3}$  (۳)

۹ (۲)

۳ (۱)

-۸۸- ۵ بار الکتریکی نقطه‌ای هماندازه هماندازه شکل زیر بر روی رئوس و مرکز یک مریع قرار دارند. جهت برایند نیروهای الکتریکی وارد به باری که در


مرکز مریع قرار دارد، به کدام سمت است؟

↖ (۱)


↘ (۲)

← (۳)

→ (۴)



-۸۹- مطابق شکل زیر، چهار ذره باردار بر روی محیط دایره‌ای به شعاع ۲۰cm ثابت شده‌اند. نیروی الکتریکی خالص وارد بر ذره بارداری که در مرکز دایره



$$\text{قرار گرفته در SI کدام است؟} \quad (k = 9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2})$$

-۱۵/۷۵\vec{i} + ۱۵/۷۵\vec{j} (۱)

۹\vec{i} - ۹\vec{j} (۲)

۱۱/۲۵\vec{i} - ۱۱/۲۵\vec{j} (۳)

-۶/۷۵\vec{i} + ۶/۷۵\vec{j} (۴)

-۹۰- کدامیک از گزینه‌های زیر می‌تواند بیانگر بار الکتریکی یک جسم باشد؟  $(e = 1/6 \times 10^{-19} \text{C})$

 $5/2n\text{C}$  (۴) $\sqrt{3}\mu\text{C}$  (۳) $\frac{5}{9}\mu\text{C}$  (۲) $8 \times 10^{-20} \text{C}$  (۱)

وقت پیشنهادی: ۲۰ دقیقه

شیوه ۲: صفحه‌های ۱ تا ۱۰

(ترکیب سوال‌های ۱، ۳ و ۶ کتاب پر تکرار)

۹۱- کدام گزینه نادرست است؟ 

۱) میزان تغییرات استخراج و مصرف مواد معدنی نسبت به سوخت‌های فسیلی، با گذشت زمان، شیب بیشتری داشته است.

۲) پیشرفت صنعت الکترونیک مبتنی بر اجزایی است که از مواد نیمه‌رسانا ساخته می‌شوند.

۳) در پنج سال آینده، میزان استخراج و مصرف سوخت‌های فسیلی بیشتر از فلزها پیش‌بینی می‌شود.

۴) برخی مواد استفاده شده در ساخت دوچرخه، طبیعی نیستند و از کره زمین به دست نمی‌آیند.

۹۲- کدام گزینه نادرست است؟ 

۱) با گسترش فناوری به رابطه میان خواص مواد با عنصرهای سازنده آن‌ها پی بردہ شد.

۲) فولاد نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش صنعت خودرو داشته است.

۳) جرم کل مواد در کره زمین به تقریب ثابت است.

۴) رشد و گسترش تمدن بشری در گرو کشف و شناخت مواد جدید است.

۹۳- اگر عدد اتمی عناصر A، C و D به ترتیب ۱۹، ۳۲ و ۳۵ باشد، عبارت کدام گزینه نادرست است؟ (نماد عنصرها فرضی است.) 

۱) هر دو عنصر A و C رسانای جریان الکتریسیته هستند، اما عنصر C برخلاف عنصر A شکننده است.

۲) عنصر A ضمن واکنش با عنصر D، الکترون از دست داده و پیوند یونی برقرار می‌کند.

۳) بیشترین خصلت فلزی و نافلزی به ترتیب متعلق به عناصر D و A است.

۴) عنصر C از نظر خواص فیزیکی بیشتر شبیه عنصر A و از نظر رفتار شیمیایی مانند عنصر D است.

(با هم بیندیشید صفحه‌های ۷۵۷)

۹۴- کدام گزینه نادرست است؟ 

۱) خصلت فلزی و تعداد زیرلایه‌های الکترونی عنصر سدیم از عنصر لیتیم بیشتر است.

۲) عنصرهای پتاسیم، منیزیم، قلع و سرب، رسانایی الکتریکی و گرمایی بالای دارند.

۳) عنصرهای اکسیژن، نیتروژن و فلورور در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون می‌گیرند یا به اشتراک می‌گذارند.

۴) عنصرهای شبه‌فلزی در جدول دوره‌ای، در واکنش با دیگر اتم‌ها، الکترون از دست می‌دهند.

۹۵- عبارت کدام گزینه درست است؟

(۱) هلیم در گروه ۱۸ جدول تناوبی جای دارد و عنصری از دسته S است که آرایش لایه ظرفیت آن به صورت هشت‌تایی پایدار است.

(۲) عنصر با نماد فرضی  $X_{14}$  در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون به اشتراک می‌گذارد و در اثر ضربه خرد می‌شود.

(۳) در گروه ۱۴ جدول دوره‌ای عناصر، با افزایش مجموع  $n$  الکترون‌های لایه ظرفیت اتم‌ها، خصلت فلزی آن‌ها کاهش می‌یابد.

(۴) شمار عناصر شبه‌فلزی گروه ۱۴ جدول دوره‌ای عناصر، برابر با شمار عناصر نافلزی آن است.

۹۶- با توجه به جدول زیر برای عناصر A, B, C, D و E، به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه، تنها سه عنصر با ویژگی‌های داده شده

هم‌خوانی دارند؟

عنصر	رسانایی الکتریکی	رسانایی گرمایی	سطح صیقلی	چکش خواری	ویژگی شیمیایی	حالت فیزیکی ( $25^{\circ}\text{C}$ )
A	بالا	بالا	دارد	دارد	از دست دادن الکترون	جامد
B	پایین	بالا	دارد	ندارد	اشتراک الکترون	جامد
C	بالا	ندارد	ندارد	ندارد	اشتراک الکترون	جامد
D	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	اشتراک و گرفتن الکترون	جامد
E	ندارد	ندارد	ندارد	-	اشتراک و گرفتن الکترون	گاز

(۱) سدیم - قلع - کربن - گوگرد - فلورور

(۲) سرب - سیلیسیم - کربن - فسفر - برم

(۳) آلومینیم - اکسیژن - کربن - ژرمانیم - کلر

(۴) کربن - سیلیسیم - گوگرد - فسفر - سدیم

۹۷- عبارت کدام گزینه نادرست است؟

(۱) دانش شیمی به ما کمک می‌کند تا ساختار دقیق ترکیبات گوناگون را شناسایی کنیم، به رفتار آن‌ها پی‌بریم و بهره‌برداری درست از آن‌ها را بیاموزیم.

(۲) گسترش فناوری به میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته است، به طوری که پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از موادی مانند Si و ... ساخته می‌شوند.

(۳) انسان‌های پیشین از برخی مواد طبیعی مانند چوب، سفال، سنگ و پوست بهره می‌بردند، اما با گذشت زمان توانستند موادی مانند

برخی فلزها را نیز استخراج کنند.

(۴) با گسترش دانش تجربی، شیمی‌دان‌ها دریافتند که گرما دادن به مواد و افزودن آنها به یکدیگر سبب تغییر و گاهی بهبود خواص می‌شود.

۹۸- با توجه به میزان تولید یا مصرف نسبی برخی مواد (مواد معدنی، فلزها و سوخت‌های فسیلی) در جهان، کدام گزینه نادرست است؟

۱) در سال ۲۰۱۵ به تقریب ۷ میلیارد تن فلز در جهان استخراج و مصرف شده است.

۲) هر چه میزان استخراج از منابع یک کشور بیشتر باشد، آن کشور توسعه یافته‌تر است.

۳) سرعت رشد مصرف سوخت‌های فسیلی نسبت به فلزها کمتر است.

۴) پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۳۰ به تقریب در مجموع ۷۲ میلیارد تن از این مواد استخراج و مصرف شوند.

۹۹- کدام گزینه درست است؟

۱) با بررسی توزیع برخی عنصرها در جهان می‌توان پی بردن که پراکندگی منابع نمی‌تواند دلیلی بر پیدایش تجارت جهانی باشد.

۲) علم شیمی را می‌توان مطالعه هدف‌دار، منظم و هوشمندانه رفتار عنصرها و مواد برای یافتن روندها، الگوهای رفتار فیزیکی و شیمیایی آنها دانست.

۳) عنصرهای جدول دوره‌ای که شامل ۱۸ دوره و ۷ گروه است، بر اساس رفتارشان در سه دسته شامل فلز، نافلز و شبیه‌فلز جای دارند.

۴) هلیم در گروه ۱۸ جدول دوره‌ای عنصرها جای دارد و همانند سایر گازهای نجیب متعلق به دسته عناصر p است.

۱۰۰- عنصر دارای ویژگی ذکر شده در هر یک از عبارت‌های (الف) تا (پ) به ترتیب از راست به چپ، در کدام گزینه آمده است؟

(با هم پیندیشید صفحه‌های ۷ تا ۹) الف) رسانایی الکتریکی کمی دارد.

ب) جامدی شکل‌پذیر است.

پ) رسانای خوب گرماست.

C ، Pb ، Si ، (گرافیت) ۲

C ، Si ، Ge ، (گرافیت) ۱

Pb ، Sn ، Ge ۴

C ، Si ، (گرافیت) ۳

شیمی (۲) – سوالات آشنا

۱۰۱- کدام عبارت درست است؟

۱) منابع شیمیایی در سرتاسر جهان به صورت یکسان پخش شده‌اند.

۲) مواد طبیعی برخلاف مواد مصنوعی از کره زمین به دست می‌آیند.

۳) گسترش صنعت خودرو، مدیون شناخت و دسترسی به فولاد است.

۴) با استخراج منابع از کره زمین، جرم کل مواد کره زمین کاهش می‌یابد.

## ۱۰۲- کدام مطلب همواره درست است؟

- ۱) برای ساخت اجزاء مختلف دوچرخه تنها از فراوری نفت استفاده می‌شود.
- ۲) آهن و آلومینیم چون به طور مستقیم از طبیعت به دست می‌آیند، جزو مواد طبیعی می‌باشند.
- ۳) صرفاً هرچه میزان استخراج از منابع یک کشور بیشتر باشد، آن کشور توسعه یافته‌تر است.
- ۴) پراکندگی منابع در جهان می‌تواند دلیل پیدایش تجارت جهانی باشد.

۱۰۳- کدام گزینه در مورد جدول دوره‌ای عناصرها نادرست می‌باشد؟

- ۱) به شیمی‌دان‌ها کمک می‌کند تا حجم انبوهی از مشاهده‌ها را سازمان‌دهی و تجزیه و تحلیل کنند.
- ۲) جدول دوره‌ای شامل ۷ دوره و ۸ گروه می‌باشد.
- ۳) تعیین موقعیت یک عنصر در این جدول به معنی تعیین دوره و گروه آن نیز می‌باشد.
- ۴) در این جدول، اتم‌ها بر اساس عدد اتمی چیده شده‌اند.

۱۰۴- کدام موارد از مطالبات زیر نادرست است؟ (کامل‌ترین گزینه را انتخاب کنید)

- آ) عناصرهای جدول براساس بنیادی‌ترین ویژگی آن‌ها یعنی عدد اتمی (A) چیده شده‌اند.
- ب) بین فلزها، سوخت‌های فسیلی و مواد معدنی میزان تولید یا مصرف نسبی فلزها از همه کمتر است.
- پ) گازهای نجیب عناصری از دسته p هستند که در گروه ۱۸ قرار دارند.
- ت) اختلاف عدد اتمی اولین و سومین فلز قلیایی با عدد اتمی عنصری از گروه پانزدهم جدول دوره‌ای برابر است.

(۱) آ، پ، ت      (۲) ب، پ، ت      (۳) آ، ت      (۴) آ، ب

۱۰۵- کدام گزینه در رابطه با دومین شبکه فلز گروه چهاردهم جدول تناوبی نادرست است؟

- ۱) همانند شبکه فلز دیگر این گروه، رسانایی الکترونیکی کمی دارد.
- ۲) در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون به اشتراک می‌گذارد.
- ۳) تفاوت عدد اتمی آن با دیگر شبکه فلز این گروه، برابر ۱۷ است.
- ۴) چکش خوار نیست و در اثر ضربه خرد می‌شود.

۱۰۶- از بین پنج عنصر اول گروه چهاردهم ... عنصر سطح درخشان و صیقلی و ... عنصر رسانایی الکتریکی کمی دارند و ... عنصر بر اثر ضربه خرد

می‌شوند. (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید).

(۲) ۳-۲-۴

(۱) ۳-۱-۴

(۴) ۱-۱-۳

(۳) ۱-۲-۳

۱۰۷- در کدام مورد، ویژگی نسبت داده شده به عنصر مورد نظر همواره صحیح است؟

(۱) ژرمانیم توانایی ایجاد پیوند اشتراکی را دارد و از لحاظ رسانایی الکتریکی نارسانا است.

(۲) کربن نافلزی است که در اثر ضربه خرد می‌شود و رسانای جریان برق نیست.

(۳) قلع برخلاف فسفر درخشان است و در اثر ضربه خرد نمی‌شود.

(۴) آلومینیم با از دست دادن الکترون به آرایش گاز نجیب آرگون می‌رسد.

۱۰۸- عبارت کدام گزینه درست است؟

(۱) از بین عناصر گروه چهاردهم جدول دوره‌ای دو عنصر شکننده هستند.

(۲) خصلت نافلزی عنصر Cl<sub>۱۷</sub> از خصلت نافلزی عنصر Br<sub>۳۵</sub> کمتر است.

(۳) خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر به صورت دوره‌ای تکرار می‌شوند که به قانون دوره‌ای عناصرها معروف است.

(۴) خواص فیزیکی Si و Ge بیشتر به نافلزات شبیه است اما رفتار شیمیایی آن‌ها همانند فلزات است.

۱۰۹- در چند مورد از موارد زیر، ویژگی بیان شده با آرایش الکترونی آخرین زیرلایه اتم عنصر مربوطه مطابقت دارد؟

- فاقد رسانایی الکتریکی می‌باشد. (۳p<sup>۳</sup>) - دارای سطحی تیره است. (۲p<sup>۲</sup>)

- خواص فیزیکی آن کاملاً مانند فلزات است. (۴p<sup>۳</sup>) - دارای رسانایی گرمایی می‌باشد. (۳p<sup>۲</sup>)

- چکش خوار می‌باشد. (۴p<sup>۲</sup>)

۱۱۰- ویژگی‌های سه عنصر از جدول تناوبی به شرح زیر است. به ترتیب از راست به چپ، هر یک از این عناصر براساس رفتارشان در کدام دسته قرار می‌گیرند؟

الف) عنصری از دوره سوم جدول تناوبی که شمار الکترون‌های زیرلایه p لایه آخر آن نصف زیرلایه s همان لایه می‌باشد.

ب) عنصری از دوره دوم جدول تناوبی که رسانایی الکتریکی دارد اما رسانایی گرمایی ندارد و تنها توانایی به اشتراک گذاشتن الکترون را در واکنش با سایر عناصر دارد.

پ) عنصری که رسانایی الکتریکی کمی دارد، در اثر ضربه خرد می‌شود و در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون به اشتراک می‌گذارد.

(۱) فلز- فلز- شبهفلز  
(۲) نافلز- شبهفلز- فلز

(۳) فلز- نافلز- شبهفلز  
(۴) فلز- نافلز- فلز

وقت پیشنهادی: ۳۰ دقیقه

ریاضی ۲ : صفحه‌های ۱ تا ۱۸



(مشابه سوال ۴ کتاب ییر تکرار)

$$111 - \text{دو خط } 2y + 2x = 3 \quad \text{و } 6y + 6x = 10 \quad \text{و } 3x - 2y = 1 \quad \text{و دو خط } 3y + 2x = 1 \quad \text{و هستند.}$$

- (١) موازى و غيرمنطبق - متقطع و غيرعمود برهم
  - (٢) موازى و منطبق - متقطع و غيرعمود برهم
  - (٣) موازى و غيرمنطبق - متقطع و عمود برهم
  - (٤) موازى و منطبق - متقطع و عمود برهم


۱۱۲- یک قطر مریع منطبقه، بر خط  $y = x + 3$  بوده و مختصات یک، از دوسر، این مریع  $A(-2, 1)$  است. مساحت مریع کدام است؟



- ۳۲ (۱)

- ۱۸ (۵)

۱۱۳- فاصله نقطه وسط پاره خط AB که  $(A, 5)$  و  $(B, 1)$  است، از نقطهای به طوی ۲ روی خط  $= -3x + 1$  کدام است؟ (مشاه سوال ۱۴ کتاب پر تکرار)



- $\sqrt{6}$  (1)

- 13


(مشابه سوال ۱۲ کتاب، به تکان)

١١٦ - فاصله نقطه A(٣,٥) از خط  $3x - 4y = 2$  کدام است؟



$$116 - \text{معادله درجه دوم} = 0 \quad \text{، دارای دو ریشه حقیقی، متمایز است. اگر مجموع ریشه‌ها با قرینه حاصل ضرب آن دو}$$

دشنه بار باشد، کدام است؟



- 10

۱۱۷-اگر صفرهای تابع  $f(x) = m^2x^2 + 3mx + 2m$  کمترین مقدار تابع  $f$  کدام است؟



۱۱۸- اگر  $\alpha$  و  $\beta$  جواب‌های معادله  $5x^3 - 1 = 5x$  باشند، جواب‌های کدام معادله  $\frac{\beta}{\alpha^2 - 1}$  و  $\frac{\alpha}{\beta^2 - 1}$  است؟

$$25x^3 = 135x + 1 \quad (1)$$

$$25x^3 + 135x = 1 \quad (2)$$

$$25x^3 + 135x + 1 = 0 \quad (3)$$

$$25x^3 + 1 = 135x \quad (4)$$

۱۱۹- اگر  $\alpha$  و  $\beta$  جواب‌های معادله  $x^3 + 3x = 1$  باشند، حاصل  $(\alpha^2 + \alpha)(\beta^2 + \beta)$  کدام است؟

$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\frac{3}{2} \quad (1)$$

$$-\frac{3}{2} \quad (4)$$

$$-\frac{1}{2} \quad (3)$$

۱۲۰- محل برخورد ارتفاع‌های مثلث ABC با رئوس A(1, 4), B(4, 1) و C(4, 5)، کدام است؟

$$\left(\frac{5}{2}, 4\right) \quad (2)$$

$$(2, 4) \quad (1)$$

$$(3, 4) \quad (4)$$

$$(2, 3) \quad (3)$$

### ریاضی (۲) – آشنا

۱۲۱- معادله خطی که محور طول‌ها را در نقطه‌ای به طول ۳- قطع کرده و بر خط  $2x + 3y = -1$  عمود باشد، کدام است؟

$$2y = 3x + 9 \quad (1)$$

$$2y + 3x = 9 \quad (2)$$

$$3y = 2x + 6 \quad (3)$$

$$y - 3x = 2 \quad (4)$$


۱۲۲- نقطه M روی عمود منصف پاره خط AB قراردارد، مقدار x کدام است؟

$$4 \quad (1)$$

$$2 \quad (2)$$

$$\frac{3}{2} \quad (3)$$

$$\frac{5}{2} \quad (4)$$



۱۲۳- فاصله نقطه برخورد دو خط  $y = 3x + 5$  و  $2x + y = -10$  از مبدأ مختصات کدام است؟

$$5 \quad (2)$$

$$25 \quad (1)$$

$$2\sqrt{5} \quad (4)$$

$$\sqrt{5} \quad (3)$$

۱۲۴-اگر  $A(3, 7)$  و  $B(0, 3)$  دو سر یک قطر دایره‌ای باشند، مساحت این دایره کدام است؟

۲۵π (۲)

 $\frac{25\pi}{4}$  (۱)

۴۹π (۴)

 $\frac{49\pi}{4}$  (۳)

۱۲۵-نقاط  $(m-n, 2m+3)$  و  $(m+n, 2n-3)$  نسبت به نقطه  $C(-2, 2)$  قرینه یکدیگرند. در این صورت  $3m - 2n$  کدام است؟

-۱۴ (۲)

-۶ (۱)

۴ (۴)

-۲ (۳)

۱۲۶-اگر  $A(0, -2)$ ،  $B(1, 3)$  و  $C(2, 1)$  سه رأس متوازی‌الاضلاع  $ABCD$  باشند، آنگاه خط  $AD$  محور  $x$  ها را با چه طولی قطع می‌کند؟

-۱ (۲)

۲ (۱)

-۴ (۴)

۴ (۳)

۱۲۷-فاصله دو خط موازی  $x + 2y + m = 0$  و  $2x + 4y + 8 = 0$  برابر با  $4\sqrt{5}$  است. مقدار  $m$  کدام می‌تواند باشد؟


۸ (۲)

۱۶ (۱)

۳۲ (۴)

۲۴ (۳)

۱۲۸-اگر  $x = 1$  یکی از ریشه‌های معادله  $2x^2 - 5x + k - 1 = 0$  باشد، آنگاه حاصل ضرب دو ریشه این معادله کدام است؟

 $-\frac{7}{2}$  (۲) $\frac{3}{2}$  (۱) $-\frac{1}{2}$  (۴) $\frac{7}{2}$  (۳)

۱۲۹-بیشترین مقدار سهمی مقابل کدام است؟

۷ (۱)

۵ (۲)





۶ (۳)

۴ (۴)

# ایران توشه

برگزاری انتخابات

برگزاری انتخابات



۱۳۰-در سهمی  $y = ax^2 + bx - c$  اگر  $a > 0$ ،  $b < 0$  و  $c > 0$  باشد، نمودار به کدام صورت می‌تواند باشد؟

# دفترچه سؤال

آزمون هوش و استعداد

(دوره دوم)

۳ مرداد

تعداد کل سؤالات آزمون: ۲۰

زمان پاسخ‌گویی: ۳۰ دقیقه

گروه فنی تولید

مسئول آزمون	حمید لنجانزاده اصفهانی
ویراستار	فاطمه راسخ
مدیر گروه مستندسازی	محیا اصغری
مسئول درس مستندسازی	علیرضا همایون خواه
طراحان	حمید اصفهانی، فاطمه راسخ، حمید گنجی، حامد کریمی، سپهر حسن‌خان‌پور، فرزاد شیرمحمدی
حروف‌چینی و صفحه‌آرایی	معصومه روحانیان
ناظر چاپ	حمید عباسی

برای مشاهده پاسخ‌ها، به صفحه شخصی خود در سایت کانون مراجعه کنید.

۳۰ دقیقه

استعداد تحلیلی

۲۵۱ - کدام وسیله متفاوت است؟

- (۱) کورنومتر  
 (۲) فشارستج  
 (۳) ذرهبین  
 (۴) ترازو

۲۵۲ - نسبت تخته‌سیاه به وايتبورد، شبیه است به نسبت میان دو واژه‌ی کدام گزینه؟

- (۱) مداد، پاک‌کن  
 (۲) کتاب، دفتر  
 (۳) گچ، ماژیک  
 (۴) پاک‌کن، تراش

۲۵۳ - مفهوم عبارت زیر کدام است؟

«فراء نحوی»، معلم دو فرزند مأمون بود. و هر زمان که برمی‌خاست، هر یک از آن دو به سرعت یک لنگ کفش وی را می‌نهاد. مأمونشان چنین دستور داده بود.»

- (۱) احترام‌گذاشتن به معلم  
 (۲) سخت‌گیری معلم بر دانش‌آموزان  
 (۳) ترس دانش‌آموز از معلم  
 (۴) دوستی معلم با دانش‌آموزان

۲۵۴ - طبق متن زیر معنای واژه‌ی «دعوی» به کدام گزینه نزدیکتر است؟

«آدمی باید اخذ علم از حضرت استاد کند، بعد از آن دعوی تعلیم و ارشاد، نه آن که استاد ندیده خود را استاد بیند و از کس نیاموخته آموزگار کسان گردد.»

- (۱) ادعای  
 (۲) آموخته  
 (۳) نبرد  
 (۴) خیرخواهی

\* بر اساس متن زیر - برگرفته از کتاب اصول و مبانی سیاست، نوشته‌ی علیرضا حیدری و سمیه ذوالفقاری، به سه پرسش بعدی پاسخ دهید.

مشروعیت یکی از مهمترین مفاهیم در علم سیاست و به معنای پذیرش و مقبولیت از سوی مردم است. ماکس ویر سه نوع مشروعیت را مطرح می‌کند: مشروعیت سنتی که بر پایه‌ی هنجارها و سنت‌های تاریخی استوار است، مشروعیت کاریزماتیک که از نفوذ و ویژگی‌های استثنایی شخصیتی یک رهبر ناشی می‌شود، و مشروعیت قانونی‌عقلانی که به ساختارهای حقوقی و نهادهای دموکراتیک وابسته است. در جوامع مدرن، مشروعیت قانونی‌عقلانی بیشترین اهمیت را دارند زیرا قوانین و نهادهای سیاسی تعیین‌کننده‌ی قدرت هستند. اما در دوران بحران، مشروعیت کاریزماتیک می‌تواند نقش بیشتری پیدا کند، زیرا مردم در این دوران به دنبال رهبری مقتدر برای خروج از بحران هستند. هایز و لاک نیز نظرات متفاوتی درباره مشروعیت دارند. هایز معتقد بود که برای جلوگیری از هرج و مرج، مردم باید قدرت مطلق را به حاکم واگذار کنند. در مقابل جان لاک بر این تصور بود که اگر حکومت حقوق طبیعی مردم را نقض کند، مشروعیت خود را از دست می‌دهد و مردم حق تغییر آن را دارند. بحران مشروعیت زمانی رخ می‌دهد که حاکمیت نتواند رضایت عمومی را حفظ کند. این بحران می‌تواند ناشی از فساد، ناکارآمدی، سرکوب و یا نارضایتی اجتماعی باشد و در صورت شدت یافتن ممکن است به سقوط بینجامد.

۲۵۵ - کدام مورد از نظریات ماکس ویر در متن بالا برمی‌آید؟

- (۱) مشروعیت کاریزماتیک یک رهبر، آینده‌ی آرمانی تری را برای آن حاکمیت نوید می‌دهد.  
 (۲) در تعیین مشروعیت سنتی حاکمان در گذشته‌های دور، کاریزما رهبران عامل مؤثری محسوب نمی‌شود.  
 (۳) تعیین‌کننده‌بودن قوانین و نهادهای سیاسی در جوامع مدرن، به تأثیر مشروعیت قانونی‌عقلانی در مشروعیت حاکم می‌افزاید.  
 (۴) در جوامع مدرن، برتری کاریزماتیک یک شخص بر شخص دیگر، عامل تأثیرگذاری در مشروعیت او نخواهد بود.

- ۲۵۶- بر اساس دیدگاه جان لاک، مردم چه زمانی حق تغییر حکومت را دارند؟

۱) زمانی که حکومت مشروعیت کاریزماتیک خود را از دست بدهد.

۲) هنگامی که حکومت حقوق طبیعی مردم را نقض کند.

۳) وقتی که حکومت در اجرای قوانین دچار مشکل شود.

۴) اگر بحران‌های امنیتی و مشکلات اقتصادی فراوان باشد.

- ۲۵۷- متن برای پاسخگویی به کدام پرسش(ها) اطلاعات کافی را در اختیار مخاطب می‌گذارد؟

الف) کاریزما می‌یک رهبر، چگونه بر قدرت او در عبور از بحران‌های اجتماعی و سیاسی می‌افزاید؟

ب) چه نمونه رفتارهایی ممکن است عامل کاهش رضایت عمومی و بحران مشروعیت یک حکومت باشد؟

ج) ماکس وبر چه ارزشی برای نقش هنجارها و سنت‌های تاریخی در مشروعیت یک حاکم امروزی برمی‌شمارد؟

(۱) فقط الف

(۲) ب، ج

فقط ب

\* بر اساس متن زیر به سه پرسش بعدی پاسخ دهید. حالت‌های خاص جدایی، چندهمسری، و ... را در نظر نگیرید و بهترین گزینه را انتخاب کنید.

در روزگار ملکشاه سلجوقی، کردی بازرگان و فاضل می‌زیست که نام وی «ظهیرالدین رازی» بود و ۵ فرزند داشت، سه پسر و دو دختر با نام‌های حسن، یعقوب، سلمان، زهره و مهپاره. حسن زنی از مردم بلخ را به همسری گرفت و صاحب دو پسر شد. سلمان دختری از طبرستان را به همسری گرفت و صاحب دختری شد. یعقوب نیز با خواهر زن سلمان وصلت نمود. زهره را به همسری، به پسر دایی مادرش دادند. مهپاره نیز با برادر زن حسن وصلت کرد و مادر دو دختر شد.

- ۲۵۸- نسبت پسر بزرگ حسن با فرزند یعقوب چیست؟

(۱) پسر عمومی اوست.

(۲) هم پسرعممه و هم پسردایی اوست.

(۳) پسرعممه اوست.

(۴) هم پسرعممو و هم پسرخاله‌ی اوست.

- ۲۵۹- پسر کوچک حسن چه نسبتی با دختر بزرگ مهپاره دارد؟

(۱) پسر دایی اوست.

(۲) هم پسردایی و هم پسرعممه اوست.

(۳) پسر خاله‌ی اوست.

(۴) هم پسرعممو و هم پسرخاله‌ی اوست.

- ۲۶۰- اگر پسر بزرگ حسن، با دختر برادر زن سلمان ازدواج کند، زن یعقوب چه نسبت جدیدی با او خواهد یافت؟

(۱) زن دایی همسر اوست.

(۲) خاله‌ی همسر اوست.

(۳) زن عمومی همسر اوست.

(۴) عمه‌ی همسر اوست.

\* بر اساس اطلاعات زیر، به چهار پرسش بعدی پاسخ دهید.

اصغر، اکبر، امیر و امین، چهار برادر یک خانواده‌اند که اسامی آنان به ترتیب الفبا نوشته شده است. بزرگترین فرزند ۲۲ سال دارد و سه فرزند دیگر به ترتیب

۱۷، ۲۰ و ۱۴ سال دارند و هر کدام پیراهنی به یکی از رنگ‌های زرد، سبز، قرمز و آبی به تن کرده است. یکی از این افراد یک کمریند، یکی دیگر یک

کراوات و یک نفر دیگر یک پاپیون نیز دارد. می‌دانیم:

امیر که کراوات ندارد، بزرگترین فرزند نیست و زرد نیز نپوشیده است.

آن که پاپیون دارد، پیراهنش آبی است و کوچکترین فرزند نیست.

فقط یک نفر از آن که کراوات دارد بزرگتر است که او هم قرمز نپوشیده است.

امین کوچکترین فرزند است. بزرگترین فرزند که اصغر نیست، کمریند دارد.

آن که نه کمریند دارد، نه کراوات و نه پاپیون، قرمز پوشیده است.

۲۶۱ - چه کسی کراوات زده است؟

(۱) اصغر

(۲) اکبر

(۳) امیر

(۴) امین

۲۶۲ - آن که پاپیون زده است، پیراهنی به چه رنگ دارد؟

(۱) زرد

(۲) سبز

(۳) آبی

(۴) قرمز

۲۶۳ - آن که کمریند دارد چند سال دارد؟

(۱) ۱۶

(۲) ۱۷

(۳) ۲۰

(۴) ۲۲

۲۶۴ - با داده‌های بالا، کدام مورد به طور قطع معلوم نمی‌شود؟

(۱) سن امیر


(۲) رنگ پیراهن اکبر

(۳) سن اصغر

(۴) رنگ پیراهن امین

- ۲۶۵- میانگین وزنی قیمت تمام شده محصولات کارخانه را «الف» و میانگین وزنی قیمت فروش محصولات آن را «ب» می‌نامیم. کدام گزینه

درباره محصولات این کارخانه نادرست است؟ نمودار بر اساس پایان نه ماه نخست سال رسم شده است.




۱) در دو ماهه نخست فصل تابستان، کارخانه در ضرر بوده است.

۲) پرسودترین فصل سال برای کارخانه، فصل بهار بوده است.


۳) در اوایل فصل زمستان، کارخانه تدریجی زیان ده شده است.

۴) در فصل پاییز، کارخانه سوددهی داشته است.

- ۲۶۶- موقعیت نقطه‌ها نسبت به دیگر شکل‌ها، در کدام گزینه متفاوت است؟




(۲)



(۱)




(۴)




(۳)

\* در دو سؤال پرسش بعدی تعیین کنید کدام گزینه با شکل‌های صورت سؤال تفاوت بیشتری دارد.

- ۲۶۷-




(۲)








(۱)








(۴)








(۳)



\* در دو پرسش بعدی، تعیین کنید کدام گزینه تقارن متنظر را نسبت به خط یا نقطه معلوم شده، بهتر کامل می‌کند.





# ایران توشه

توشه‌ای برای موفقیت

# منابع مناسب هوش و استعداد

۱۴۰۵

